

# GEOMORPHOLOGIE IM MITTELLÄNDISCHEN REUSSGLETSCHERGEBIET

INAUGURAL-DISSERTATION

zur  
Erlangung der Philosophischen Doktorwürde  
vorgelegt der  
PHILOSOPHISCHEN FAKULTÄT II  
der  
UNIVERSITÄT ZÜRICH

von  
ULRICH FELIX LÄUPPI  
von Gränichen  
(Kt. Aargau)


Begutachtet von den Herren  
Prof. Dr. A. Bögli  
Prof. Dr. G. Furrer

Zürich 1983









Digitized by the Internet Archive  
in 2026

[https://archive.org/details/IA41507201\\_0054](https://archive.org/details/IA41507201_0054)

# GEOMORPHOLOGIE IM MITTELLÄNDISCHEN REUSSGLETSCHERGEBIET

INAUGURAL-DISSERTATION

zur  
Erlangung der Philosophischen Doktorwürde  
vorgelegt der  
PHILOSOPHISCHEN FAKULTÄT II  
der  
UNIVERSITÄT ZÜRICH

von  
ULRICH FELIX LÄUPPI  
von Gränichen  
(Kt. Aargau)

Begutachtet von den Herren  
Prof. Dr. A. Bögli  
Prof. Dr. G. Furrer

Zürich 1983





## Inhaltsverzeichnis

|                                                                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Vorwort . . . . .                                                                                               | 1  |
| 1. Einleitung . . . . .                                                                                         | 4  |
| Abschnitt 1 - ARBEITSGRUNDLAGEN UND VERFAHREN                                                                   |    |
| 2. Arbeitsgebiet                                                                                                |    |
| 2.1 Topographischer Ueberblick . . . . .                                                                        | 4  |
| 2.2 Geologischer Ueberblick . . . . .                                                                           | 6  |
| 3. Vorhandene Grundlagen                                                                                        |    |
| 3.1 Vorangehende Literatur . . . . .                                                                            | 8  |
| 3.2 Geologische Karten . . . . .                                                                                | 11 |
| 3.3 Luftbilder . . . . .                                                                                        | 12 |
| 3.4 Bohrungen . . . . .                                                                                         | 12 |
| 3.5 Schweremessungen . . . . .                                                                                  | 13 |
| 4. Vorgehen                                                                                                     |    |
| 4.1 Höhenkarte der Felsoberfläche des Anstehenden .                                                             | 15 |
| 4.2 Bodensondierungen . . . . .                                                                                 | 17 |
| 4.2.1 Bohrverfahren . . . . .                                                                                   | 17 |
| 4.2.2 Uebertragung der Bohrergergebnisse in die topographische Karte 1 : 25.000 . . . . .                       | 20 |
| 4.3 Grundwasserhöhenkarte mit Eintragung des Chemismus                                                          | 21 |
| 4.4 Gravimetrie                                                                                                 |    |
| 4.4.1 Das Untersuchungsprogramm . . . . .                                                                       | 23 |
| 4.4.2 Apparate . . . . .                                                                                        | 26 |
| 4.4.3 Feldarbeit . . . . .                                                                                      | 27 |
| 4.4.4 Theoretische Auswertung . . . . .                                                                         | 28 |
| 4.4.5 Praktische Auswertung am Beispiel Profil Nr. 56, Boswil . . . . .                                         | 33 |
| 4.4.6 Ergebnisse der Gravimetriemessungen . . .                                                                 | 48 |
| 4.5 Talprofile und Blockdiagramme                                                                               | 54 |
| Abschnitt 2 - GEOMORPHOLOGISCHE TALBESCHRIEBE                                                                   |    |
| 5. Region Luzern - Schlüsselpunkt für die Mittelland-Quertäler vom Wigger- bis zum Seetal                       | 58 |
| 6. Westliche Randzone der würmeiszeitlichen Vergletscherung des Luzerner Alpenvorlandes und deren Abflussrinnen | 71 |

|      |                                                                                                  |     |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 7.   | Das Suhrental, incl. Wauwilermoos, Uffikermoos und die<br>Region Sursee bis Rickenbach . . . . . | 80  |
| 8.   | Das Wynental, incl. der Transfluenz bei Reinach aus<br>dem Seetal . . . . .                      | 92  |
| 9.   | Das Seetal . . . . .                                                                             | 101 |
| 10.  | Der Reusseisvorstoss über das Zugerseegebiet                                                     | 111 |
| 10.1 | Das Zugerseegebiet . . . . .                                                                     | 119 |
| 10.2 | Das Reuss- und Bünzthal und die östlichen Randgebiete<br>des Reussgletschers . . . . .           | 129 |
| 11.  | Zusammenfassung . . . . .                                                                        | 155 |
| 12.  | Anhang                                                                                           |     |
|      | Literaturverzeichnis . . . . .                                                                   | 160 |
|      | Lebenslauf . . . . .                                                                             | 165 |

## Vorwort

Die Grundidee, Bohrresultate und Ergebnisse von technischen und physikalischen Untersuchungen des Untergrundes für das Verständnis der Geomorphologie, Geologie und Hydrologie zuzuziehen, ist mir während meiner Jahre als Tiefbauingenieur bei der Firma SWISSBORING in Zürich gekommen. Ich war in den Jahren 1968-72 auch Leiter der Abteilung Sondierungen und Filterbrunnen dieser Firma. Damals beeindruckte mich, wie sich in nur wenigen Jahren aus den verschiedenen Regionen viele Bohrinformationen - mit grossen Anstrengungen und Kostenaufwand - ansammelten.

Durch Erfassung möglichst vieler punktwieser Sondier- und Messresultate versuchte ich das Verständnis über eine Region zu vertiefen. Dabei richtete ich mein Hauptaugenmerk auf die Geomorphologie.

Als Region wählte ich die Gegend nahe meinem jetzigen Wohn- und Arbeitsort, das Gebiet, das ehemals vom Reussgletscher und Brüniglappen des Aaregletschers bedeckt war. Dies, damit ich einerseits während meiner jetzigen Lehrtätigkeit schnell im Feld sein konnte und andererseits, da noch keine analoge wissenschaftliche Arbeit in dem Gebiet durchgeführt wurde.

Während den Jahren 1976 - 1982, in denen ich die verschiedenen Unterlagen sammelte, Feldarbeiten durchführte und die Ergebnisse auswertete, wurde ich freundlicherweise bestens unterstützt. Ich danke an dieser Stelle allen Gemeinde-Vertretern, bei denen ich in den Archiven nach Akten suchen konnte, resp. die mir die gewünschten Unterlagen herausuchten und zur Verfügung stellten.

Speziellen Dank richte ich an Herrn P. Baumann, dipl. Ing. ETH, Chef des Kant. Gewässerschutzamtes Luzern, Herrn G. Weilenmann, dipl. Ing. ETH, Kant. Tiefbauamt Zug und Herrn R. Baumann, Ing. ETH, Mitarbeiter im Kantonalen Tiefbauamt Aargau, die diese Arbeit ausserordentlich unterstützten.

Weiter gilt mein Dank den verschiedenen Abteilungsleitern der drei Kantone, in denen die gravimetrischen Profile liegen, die grünes Licht gaben, dass sämtliche erforderlichen Nivellierungsarbeiten kostenlos ausgeführt wurden.

Ohne Unterstützung des Institutes für Geophysik der ETH, Zürich wären die Gravimetrieprofile nicht zustande gekommen. Ich danke den Herren Dr. E. Kissling und H. Schwendener für ihre Mitwirkung bei den Schweremessungen und der Datenaufbereitung bis zu den Bouguer-Anomalien.

Herrn Prof. Dr. R. Hantke vom geologischen Institut der ETHZ danke ich für seine wertvollen Hinweise und Anregungen. Speziellen Dank möchte ich auch an Herrn Dr. H. Lorenz, Geologe, Luzern richten, der mir während den Arbeiten mit Rat beistand.



Herr Dr. M. Küttel, Universität Hohenheim, bearbeitet z.Z. im Gebiet ehemaliger Reussgletscher Bohrkernproben pollenanalytisch. Ich konnte ihn auf interessante Bohrkampagnen aufmerksam machen und ihm von einigen Bohrkernen Proben überreichen, die er präzise analysierte. Besten Dank!

Hölzer oder Ueberreste organischer Substanzen, aus Bohrungen gefunden, wurden freundlicherweise im  $^{14}\text{C}$ -Labor der Universität Zürich auf ihr absolutes Alter bestimmt. Besten Dank den Herren Dr. W. Keller und R. Erne für ihre Arbeit.

Bei den photographischen und graphischen Arbeiten unterstützten mich Herr U. Bütler, Photograph, Luzern und Herr W. Vollak, Graphiker, Adligenswil.

Für das finanzielle Entgegenkommen und für die saubere Erstellung der Vierfarbenlithos danke ich Herrn E. Kreienbühl, Clichés, Luzern herzlich.

Damit die Längs- und Querprofile möglichst genau gezeichnet werden konnten, mussten sie im Masstab 1 : 25.000 erstellt werden. Die präzise Verkleinerungsarbeit von den grossen Plänen auf Buchformat M 1 : 100.000 wurde von der Firma MULTIREFLEX, Luzern entgegenkommenderweise zu einem Spezialpreis übernommen.

Dazu meinen besten Dank an die Damen und Herren, die mir in den folgenden Sparten sehr halfen:

a) Sammeln von Bohrunterlagen:

- Herr Dr. E. Merki, Chef Abteilung Gewässerschutz, Aarau
- Herr H. Rey, Abt. Gewässerschutz, Aarau
- Herr Dr. P. Stadelmann, Kant. Gewässerschutzamt Luzern
- Herr H. Troxler, Kant. Gewässerschutzamt Luzern
- Herr L. Claassen, Abt. Wasserbau, Schwyz
- Herr B. Schmid, Abteilungsleiter Kant. Gewässerschutzamt, ZH
- Herr K. Fehr, Kant. Gewässerschutzamt Zürich
- Herr P. Villiger, Stabstelle Wasser, Wasserwerke Zug AG
- Herr W. Käslin, Chef Tiefbau SBB Kreis II, Luzern
- Herr P. Wolf, Chef Nationalstrassen, Baudepartement, Schwyz
- Herr J. Gasser, Baudepartement, Schwyz
- Herr H. Schwegler, dipl. Ing. ETH, Kantonsingenieur, Zug
- Herr U. Schuler, Nationalstrassenbüro Kt. Zug
- Herr E. Meiszterics, Tiefbauamt Kt. Zug
- Herr St. Kopp, dipl. Ing. ETH, Kant. Tiefbauamt Luzern
- Herr Dr. G. Torricelli, Leiter der Schweizerischen Geologischen Dokumentationsstelle, SGD, Bern
- Herr Dr. E. Blumer, Geologe, SGD, Bern
- Frau M. Falke, SGD, Bern
- Herr C. Racine, Rodio Grundbau-Technik AG, Zürich
- Herr P. Stalder, Geographie, Winterthur
- Herr Dr. M. Freimoser, Geotech. Büro Dr. von Moos, Zürich
- Herr Dr. Th. Kempf, Geotech. Büro Dr. Jäckli, Zürich
- Herr Dr. R. Moser, Geologe, Zürich
- Herr E. Müller, Büchi und Müller AG, Frauenfeld
- Herr Dr. U. Schär, Geologisches Büro, Zürich
- Herr Dr. L. Wyssling, Geologe ETH, Pfaffhausen
- Herr R. Mengis, Büro Mengis und Schmidt, Luzern
- Herr Dr. H.G. Lorenz, Büro Mengis und Schmidt, Luzern
- Herr H.E. Schmid, Ing. Büro, Zürich
- Herr E. Plüss, Ing. Büro Plüss und Meier, Luzern
- Herr Dr. P. Crettaz, Fa. Swissboring AG, Volketswil
- Herr R. Luthiger, Fa. Dicht AG, Luzern

## b) Chemismus des Grundwassers:

- Herr Dr. J. Wicky, Kantonschemiker, Luzern
- Herr A. Gassmann, Chem. Laboratorium Kt. Luzern
- Herr Dr. H.R. Weilenmann, Kantonschemiker, Aarau
- Herr Dr. M. Stähelin, Chem Laboratorium, Aarau
- Herr Dr. T. Burki, Chem. Laboratorium, Aarau
- Herr H.R. Mächler, Laboratorium der Urkantone, Brunnen
- Herr R. Beck, Kant. Laboratorium Zug, Steinhausen
- Herr P. Schwyter, stud. Ing. ETH, Luzern

## c) Vermessung:

- Herr H. Schild, Abt. Tiefbau, Vermessungsbüro, Aarau
- Herr P. Walter, Abt. Tiefbau, Vermessungsbüro, Aarau
- Herr G. Hasselbach, Tiefbauamt Kt. Zug, Zug
- Herr J. Estermann, Vermessungsbüro A. Aregger, Beromünster

## d) Geophysik:

- Herr Prof. Dr. St. Müller, Vorsteher Institut für Geophysik  
ETH, Zürich
- Herr Dr. N. Pavoni, Institut für Geophysik, ETH, Zürich
- Frl. Ch. Gerber, Stud. Natw. ETH, Aegeri
- Herr U. Gernet, Kant. Gewässerschutzamt Luzern
- Herr St. Läubli, Kriens
- Herr D. Britschgi, Stud., Kriens
- Herr J.F. Clemence, Stud., Luzern
- Frl. M. Clerici, Stud., Luzern
- Herr R. Kupper, Stud., Kriens

Dem Erziehungsrat des Kantons Luzern und den Schulleitern der Abteilungen, an denen ich an der Kantonsschule Luzern unterrichtete, Herrn Rektor R. Fischer und Herrn Rektor K. Schönbächler danke ich für ihr Entgegenkommen während der Arbeit.

Den verehrten Professoren am Geographischen Institut der Universität Zürich spreche ich hier meinen besonderen Dank aus für ihre persönliche Anteilnahme an diesen Untersuchungen. Ich gedenke Herrn Prof. Dr. H. Boesch, der mich im Jahre 1976 ermunterte, die Arbeit anzupacken. Herrn Prof. Dr. G. Furrer danke ich für sein Interesse und seine Unterstützung. Besonders herzlichen Dank spreche ich Herrn Prof. Dr. Alfred Bögli aus, unter dessen Leitung diese Dissertation zustande kam, für seine Anregungen, seine lehrreichen Diskussionen und für seine zahlreichen Ratschläge.

Mein grösster Dank aber gilt meiner Familie. Ohne das grosse Verständnis und die unermüdliche Unterstützung meiner Frau, wäre die Arbeit nie zustande gekommen.

## 1. Einleitung

Die Hauptzielsetzung dieser Arbeit bestand darin, die Lage der Felsoberfläche in den Tälern zwischen Wigger und Reuss, resp. Reppisch mit Hilfe verschiedener Arbeitsmethoden zu eruieren. Dazu sollte eine Korrelierung der hochwürmzeitlichen Gletscherstände mit ihren Akkumulationen gefunden werden. Prähochwürmzeitliche Ablagerungen in den Tälern, (die von den hochwürmzeitlichen Gletschern nicht ausgeräumt wurden) sollten lokalisiert werden, ohne dieselben chronostratigraphisch zu gliedern. Präwürmzeitliche Akkumulationen an den Talhängen werden in der Arbeit nicht untersucht und in den Graphiken nicht eingezeichnet.

Als Studiengrundlagen dienten mir geologische Karten, um Gebiete mit anstehendem Fels zu lokalisieren, Felsbeschaffenheit, Strati-graphie, tektonisch bedingte Strukturen, etc. zu verstehen. Vor allem aber sollten Informationen von ausgeführten Sondierbohrungen die Hauptaufgabe lösen.

Bei der systematischen Sammlung von Unterlagen kam ein umfangreiches Datenmaterial zusammen. Es zeigte sich im Verlauf der Arbeit, dass die Bohrresultate allein für die Lösung der Hauptaufgabe nicht genügten, so dass weitere Arbeitsmethoden herangezogen werden mussten. Für die Eruierung der Quartärbasis führte ich deshalb geophysikalische Felssondierungen durch.

Bei der Beschreibung der Eisstände im Spätwürm übernahm ich die Nomenklatur des Limmattales. Das erste Rückzugsstadium aus dem Würmmaximalstand nenne ich durchwegs "Schlieren-", das zweite "Zürich-" und das dritte "Hurdenstadium".

## Abschnitt 1 - ARBEITSGRUNDLAGEN UND VERFAHREN

### 2. Arbeitsgebiet

#### 2.1 Topographischer Ueberblick

Das in der vorliegenden Arbeit untersuchte Gebiet liegt in den Kantonen Luzern, Schwyz, Zug, Zürich und Aargau. Die Abgrenzungen bilden

auf der Südseite der Vierwaldstättersee ab Brunnen und der Nordhang der Randkette des Pilatus

auf der Westseite das Napfbergland und das Luthern-Wigger-tal bis zur Einmündung des Aaretals

auf der Nordseite die Jurahänge nördlich der Aare

und auf der Ostseite die Einmündung der Limmat in die Aare, Baregg, Heitersberg, Albiskette, Hochplateau von Menzingen bis zum Aegerisee.

Die in die Gewässernetzkarte (vgl. nächste Seite) eingezeichneten Profillinien markieren das Arbeitsgebiet.



## 2.2 Geologischer Ueberblick

Im untersuchten Raum findet man Felsformationen von folgenden geologischen Zeitaltern:

### Jura und Trias

Die Nordbegrenzung des Arbeitsgebietes bildet der Faltenjura. Nördlich wird das Wiggertal begrenzt (bei der Einmündung der Wigger in die Aare) durch die Antiklinale des Born und des Engelberges mit dem markanten Aaredurchbruch zwischen Aarburg und Olten.

Nördlich der Aare zwischen Olten, Aarau und Wildegg bilden Dottenberg, Rebenflue, Gugen, Egg, Homberg und Gisliflue 700 - 950 m hohe "Gewölbe". An deren Südflanken sind durchwegs Malmablagerungen anstehend, die meist nach Süden einfallen. In diesem Teil stossen Suhretal, Wynatal und Seetal bis zum Jura vor.

Oestlich des zweiten Juradurchbruches der Aare ist als östlicher Ausläufer des Faltenjuras die Antiklinalstruktur des Chestenberges zu nennen, wo hauptsächlich mächtige Effingerschichten anstehen. Das Bünztal verläuft in Richtung Chestenberg. Die Bünz fliesst nicht von Othmarsingen beim brücken Ostende dieser Jurakette bei Brunegg Richtung Hausen - Brugg, sondern macht einen Knick nach Westen und fliesst bei Wildegg in die Aare.

Oestlich davon befindet sich eine weitere Antiklinalstruktur, die der Lägern. Im Untersuchungsgebiet erscheint der Triaskern der Antiklinale nach oben geöffnet, sodass zudem von innen nach aussen auch Lias, Dogger und dann wiederum Malm anstehen. Im unteren Reusstal durchbricht die Reuss bei Müligen-Birmenstorf bis Gebenstorf diese Trias-Juraformationen.

### Kreide

Am Südrand des Untersuchungsgebietes wird die Randkette der helvetischen Decken mit ihren Kreideserien auf den subalpinen Flysch überschoben. Dazu gehören Pilatuskette, Bürgenstock, Vitznauer- oder Gersauerstock, Hochflue, Urmiberg.

### Tertiär

Zwischen diesen nördlichen und südlichen Formationen des Juras, bzw. der Alpen bilden die Tertiärsedimentgesteine den anstehenden Fels, in der Molassefacies.

Stratigraphisch lassen sich die Molasseablagerungen in eine untere Meeresmolasse, eine untere Süsswassermolasse, obere Meeresmolasse und schliesslich in eine gegen Napf- und Hörnligebiet mächtig werdende obere Süsswassermolasse gliedern.

Generell wird eine subalpine und eine mittelländische Molasse unterschieden.

Am Ende der alpinen Orogenese erfolgte auch nahe dem Alpenrand in der subalpinen Molasse eine Faltung, Aufschichtung und Schuppung der Sedimente des Molassebeckens.

Bei der Gliederung der subalpinen Molasse wird von einer inneren (südlichen) "aufgeschobenen Molasse" und einer äusseren "gefalteten Molasse" gesprochen. Die innere Zone ist sehr stark gefaltet, meist aber geschuppt. Wo grosse Nagelfluhmassen, wie bei Rigi oder Rossberg, vorherrschen, wurden sie en bloc aufgeschoben.

Die Grenze zwischen der inneren und äusseren Zone in der subalpinen Molasse zieht J. KOPP (1955) über Eigental, Dorschnei, Chrienseregg, Grisigen am Pilatusnordhang über Dickewald bei Horw in den Chrüztrichter und Küssnachterarm über Walchwil zum Aegerisee.

Die äussere Zone wurde unter dem Druck der Schuppen in steile Falten gepresst und wie oben beschrieben, teils noch mächtig überfahren. Bei der Zusammen- und Ueberschiebung kam es zur Bildung von Querbrüchen, durch deren Mulden den später vorrückenden Eismassen die Hauptwege vorgezeichnet wurden.

Analog dazu, jedoch viel weniger ausgeprägt, lässt sich am Rand des Kettenjuras subjurassische Molasse beobachten.

Die Grenze zur mittelländischen Molasse geht im Süden über Schwarzenberg, Littau, Luzern, Adligenswil, Udligenswil, Risch, Oberwil, Allenwinden, südlich Menzingen nach Hütten. (J. KOPP, 1955).

Nördlich, zum Jurafuss verläuft sie von Oftringen über Safenwil, Kölliken, Suhr, Niederlenz nach Fislisbach.

Dazwischen liegt das ausgedehnte Gebiet der mittelländischen Molasse. Ganz am Südrand ist sie bis zur Senkrechthstellung aufgebogen (nordwestlich von Luzern sogar leicht gegen Norden überkippt). Meist ist sie aber fast horizontal gelagert. Strukturell zeichnen sich eine Reihe flacher Antiklinalen und Synklinalen ab (R. HANTKE, 1967). Die W-E bis WSW-ENE verlaufenden Faltenachsen werden von Brüchen durchsetzt. U.P. BUECHI (1959) beschreibt im Reuss- und Bünztal grabenbruchartige Senkungsfelder.

Entlang solcher Bruch- resp. Grabenzonen fanden die später vorrückenden Gletscher der zwei letzten Eiszeiten ihre "Hauptstrassen" auf dem Weg gegen Norden. Andererseits bildeten die Kuppen zwischen den Gräben für das vorstossende Eis Hindernisse. Dadurch wurden die Eismassen in Teilzüge aufgespaltet.

## Quartär

Die Sedimente des Quartärs, glazial, fluvial oder limnisch entstanden, bedecken den überwiegenden Teil des Untersuchungsgebietes. Auf die Art und die Mächtigkeiten dieser Ablagerungen soll in den Spezialkapiteln eingegangen werden.

### 3. Vorhandene Grundlagen

#### 3.1 Vorangehende Literatur

- Frey O. (1907): Talbildung und glaziale Ablagerungen zwischen Emme und Reuss

In diesem umfassenden Werk beschrieb der Autor zahlreiche Feldbeobachtungen. Dabei lokalisierte und gliederte er zeitlich in seinem Untersuchungsgebiet von der Luthern bis zur Reuss Moränenzüge, ältere und jüngere Deckenschotter, Hochterrassen- und Niederterrassenschotter. An Hand einer grossen Informationsfülle zog er Rückschlüsse auf die Akkumulationstätigkeit während den Eiszeiten und die Erosionstätigkeiten während den Interglazialzeiten. Frey durchdachte weiter die Entwässerungsverhältnisse in den verschiedenen Bildungsphasen und -zeiten der Molasse, sowie im Pleistozän und Holozän. Er fand dabei, es sei schade, dass die Tiefe der Einschnitte im Fels und die Mächtigkeit der Lockergesteinsauffüllungen nicht bekannt sei. Nach seiner Ansicht hatten die Mindel- und die Rissgletscher in unserem Gebiet ungefähr die gleiche Ausdehnung. Aus der Natur der Gerölle schloss er, dass in der Mindelzeit auch ein alter Reussgletscher das Untersuchungsgebiet bedeckte.

Bei der Frage der Hauptdurchtalung des Molasselandes im Mindel-Riss-Interglazial schrieb er von einem präglazialen alten Tal zwischen Rigi und Rossberg, folgerte, dass die Reuss via Küssnacht nach Norden floss und vermutete einen Durchgang über Steinhausen nach Maschwanden ins heutige Reusstal. Aus der Lagerung der Hochterrassenschotter schloss er, dass zu Beginn ihrer Entstehung das Relief unseres Gebietes vom gegenwärtigen nicht erheblich verschieden war, d.h. dass die Hauptdurchtalungen des Mittellandes zwischen Emme und Reuss prärisseiszeitlich seien.

Nach Einbezug auch der letzten Eiszeit kam er zum Schluss, dass die Gletscher nicht bloss durch Ablagerung ihrer Moränetrümmer, sondern in ungleich höherem Masse durch aktive Abtragung der Molasse umgestaltend auf die präglazialen Terrainoberflächen einwirkten.

Einige regionale Ueberlegungen aus dem Buch seien hier noch zusammengefasst:

Gebiet Kleinemmetal-Wolhusen-Wiggertal: Der Autor nahm an, dass der Reussgletscher sich talaufwärts bis gegen Wertenstein vorschob und dadurch der kleinen Emme den Weg gegen Osten verrammelte, so dass sie durch eine Rinne von Wolhusen über Menznau nach Norden abfloss. Als das Eis den Talweg gegen die Reuss wieder freigab, verliess die kleine Emme ihre glaziale Rinne und diese wurde zum Torso. Hingewiesen wird im Buch auch auf drei Durchbrüche, nämlich den Bilbach, der bei Ruswil einen markanten Knick macht und durch eine Lücke bei Hohrütli abfliesst, und nordwestlich davon, bei Buholz und Stätenbach zwei ähnliche "trockene Lücken", durch die in der Eiszeit Schmelzwasser abfloss.

Suhretal: Der Autor überlegte an Hand von "Ueberresten" des Hauptarms im Suhretal, resp. des Mauenseenebenarmes, wie sich die Gletscher in dem Gebiet "entfalteten" und folgerte, dass bei Sursee eine unter Diluvialschutt begrabene Molasseschwelle - die dem Eis einen ungehemmten Eintritt ins Tal des Mauensees versperrte - vorhanden sein müsse.

Reuss-Bünztal: Der Autor stellte fest, dass die Wasserscheide zwischen Bünz- und Reusstal im Süden auf Moräne, weiter nordwärts auf Molasse liege. Da sich die tiefste Stelle des Moränerrückens zwischen dem Bünzermos und Althäusern nur 15m über das mittlere Niveau des Moores und 70 m über den Reuss-Spiegel bei Jonen erhebt, glaubt er nicht an eine Talbifurkation am Ende der letzten Eiszeit.

Gegend Küssnacht: Frey glaubte an einen Zusammenhang zwischen Zuger- und Vierwaldstättersee bei Küssnacht-Immensee, trotzdem die Seen durch einen minimal 56m über dem Zugerseespiegel gelegenen Rücken getrennt sind. Doch die wasserscheidende Höhe zeige an der Oberfläche nur Glazialschutt und beim Bau der Gotthardbahnlinie sei zwischen Rütihof und dem Weiler Ober-Immensee auf einer 1,6 km langen Strecke nur Gletscherschutt angetroffen worden. Darnach erscheine die Existenz einer während der letzten Eiszeit zugeschütteten Kommunikation zwischen den beiden Seebecken an dieser Stelle nicht ausgeschlossen, würde jedoch eine gewaltige Moränenauffüllung zur Voraussetzung haben.

Frey kam gesamthaft zur Ueberzeugung, dass die ausschleifende und abhobelnde Wirkung des diluvialen Eises das Relief des überfluteten Molasselandes wesentlich beeinflusste, dass die Gletscher zwar keine Täler neu geschaffen hatten, sondern dass die aus den Alpen hervorbrechenden Eismassen in die vorhandenen Talrinnen eindrangen und diese durch Gletschererosion prägten.

- Annaheim H., Bögli A., Moser S. (1958): Die Phasengliederung der Eisrandlagen des würmeiszeitlichen Reussgletschers im zentralen schweizerischen Mittelland.

Die drei Autoren gliederten in meinem Untersuchungsgebiet die würmeiszeitlichen Gletscherstände und teilten sie zeitlich ein.

- Jäckli H. (1956): Talgeschichtliche Probleme im aargauischen Reusstal.

Es wurden quartäre Erosions- und Akkumulationsvorgänge im Reusstal dargestellt und zeitlich gegliedert. Der Autor sprach von einem altpleistozänen Reusslauf über Küssnacht-Zug-Knonau-Maschwanden. Dazu gliederte er die "Mittelterrassenschotter" bei Stetten und zwischen Reuss- und Bünztal ein.

- Gretener P. (1954): Schweremessungen nordwestlich von Zürich und ihre geologische Interpretation.

In dieser Dissertation wurde eine Schwerekarte über ca. 500 km<sup>2</sup> Fläche mittels Schweremessungen von 780 Stationen

erstellt. Die flächenhafte Verteilung der Messpunkte betrug somit ca. 1,5 pro km<sup>2</sup>. Die primäre Aufgabenstellung, ob infolge Dichteunterschied zwischen Kalk- und Molassesedimenten der unterirdische Fortlauf der Lägern-Antiklinale festgestellt werden könne, wurde erfüllt. (Die Dichten dieser Sedimentgesteine liessen sich ziemlich genau berechnen.) Gleichzeitig wurde dabei die sekundäre Frage aufgeworfen, ob an Hand der Schwerekarte neue Erkenntnisse über den geologischen Aufbau des Gebietes gewonnen werden könne. Dabei stiess der Autor auf lokale, negative Schwereanomalien, die er als Folge von Quartärauffüllungen deutete und erstellte eine "Quartärkarte". Da die Dichten des Lockergesteins nicht genau bekannt waren, führte Gretener keine absoluten Angaben über Quartärmächtigkeiten an, sondern belies es bei den negativen Schwereanomalien, die er in die Quartärkarte einzeichnete.

- Gassmann F. (1962): Schweremessungen in der Umgebung von Zürich

In dieser Arbeit wurden vor allem gravimetrische Messungen im nordöstlichen Teil des Kantons Zug durchgeführt. Die Anordnung der Mess-Stationen war - wie in der Arbeit Gretener - flächenhaft verteilt.

Man kam zur Erkenntnis, dass eine direkte Beziehung zwischen den negativen Schwereanomalien und Quartärmächtigkeit bestehe. N. Pavoni schrieb in diesem Werk ein interessantes Kapitel über "Geologische Interpretation der lokalen Bouguerschen Schwereanomalien". Darin wurden die oft mehrere Hundert Meter mächtigen Quartärablagerungen in der Gegend Menzingen-Neuheim mit Isopachenkarten dargestellt.

Die Behauptung, dass die Lorzentobelschotter, die Sihlsprungschotter und die Schotter beim Waisenhaus und Alt-Schloss bei Wädenswil zu einer Ost-West-Talung gehören, und einander entsprechen, sollte durch weitere Gravimetriemessungen im Gebiet Wädenswil-Spitzen-Menzingen-Hütten-Feusisberg-Pfäffikon erhärtet werden.

Dazu wurden negative Anomalien nördlich des Zugersees mit z.T. 100 - 150 m Quartärmächtigkeiten geortet. (Lorzeebene und Blickensdorf-Uerzlikon).

In dieser Arbeit wurden auch Dichteberechnungen des Quartärmaterials durchgeführt.

- Müller E.R. (1978): Aufbau und Zerfall des würmeiszeitlichen Linth- und Reussgletschers im Raume zwischen Zürich-und Zugersee

Im Anschluss einer geologischen Aufnahme des Blattes 1 : 25.000 "Einsiedeln" folgte eine morphologische und quartärgeologische Studie im Raum zwischen dem Zürich- und Zugersee. In der Arbeit wurde eine bis 2 km breite Talung von Richterswil bis Zug erkannt und auch in Form einer Isohypsenkarte der Felsoberfläche dargestellt.

- Kelts K. (1978): Geological and sedimentary evolution of Lakes Zurich and Zug.

Mit seismischen und sog. Kolbenlot-Methoden wurden die quartären und rezenten Sedimentfüllungen und auch die Geo-

morphologie des Felsuntergrundes untersucht. Mit Hilfe von 19 seismischen Profilen (leider fehlen bei den Profilen 4,5,13 und 16 die Angaben) und total 126 Stationen zeigte Kelts in seiner Dissertation, dass sich der Zugersee klar in zwei Teile trennt. Im südlichen Trog sinkt die Molasse bis auf den Meeresspiegel ab! Interessant ist, dass Kelts die "Felsisohypse 100 m unter dem Wasserspiegel", also 300 müM in der Gegend von Immensee nicht uferparallel durchzieht. Da seine Messungen aber nur bis Ufernähe gehen, erforschte er den Raum Küsnacht-Immensee nicht mehr. Im Nordbecken geht der Molassefels ca. bis auf Kote 250 müM hinunter. Gegen das Nordufer sind zwei ungefähr parallel verlaufende Süd-Nord-Rinnen ermittelt worden. Die eine verläuft ca. in der Mitte des Sees, die andere uferparallel bei Zug. Die Felsisohypse bei 50 m Wassertiefe zeichnet Kelts bei Zug nicht uferparallel durch.

Bei einigen seismischen Profilen ist in der Molasse eine markante V-förmige Vertiefung feststellbar, die Kelts als fluviale Erosion bezeichnet - evt. von einer Ur-Reuss, die seiner Meinung nach eher über Arth, als über Immensee floss.

Er nimmt an, dass das Molasse-Relief vor der Würmeiszeit geformt wurde.

Informativ sind auch Kelts Sediment-Analysen (Pollen- Carbonat-Analysen sog. 3.5 kHz Seismik, etc.) Er holte dabei Erkenntnisse über die Sedimentationsgeschwindigkeit der limnischen Sedimente.

- Hantke R. (-1958): Die Gletscherstände des Reuss- und Linthsystems zur ausgehenden Würmeiszeit
  - 1968 Archäologie der Schweiz, Band 1  
Darin sind informativ die "äussersten würmeiszeitlichen Randlagen des Aare/Reussgletschers im Raume Willisau-Dagmersellen" dargestellt.
  - 1978 und 1980 Eiszeitalter 1 und 2  
Diese mit immens viel Detailinformationen versehenen Bände waren immer wieder Nachschlagwerke.

### 3.2 Geologische Karten

Fast über das ganze Arbeitsgebiet stehen geologische Karten zur Verfügung. Nur über die Südwestecke (Landeskarte Wolhusen Blatt 1149) besteht noch keine geologische Detailkarte. Das vom verstorbenen Geologen J. Kopp bearbeitete Blatt 1:25.000 1129 wurde leider nicht fertiggestellt. Das Original konnte bei der geol. Kommission in Basel besichtigt werden. Für die Ost- und Südostseite des Arbeitsgebietes gibt es noch keine geol. Karten 1:25.000, doch konnte da auf die geol. Karte 1:50.000 des Kantons Zürich und seiner Nachbargebiete von R. Hantke zurückgegriffen werden.

Folgende geol. Karten 1:25.000 dienten als Arbeitshilfe:

- Geol. Atlas der Schweiz, Blatt 1150 Luzern, J. Kopp
- Geol. Atlas der Schweiz, Blätter 186 Beromünster, 187 Hochdorf, 188 Sempach, 189 Eschenbach, J. Kopp; Aufnahmen 1935-37 und 1940-41

- Geol. Karte der Umgebung des Hallwilersees und des oberen "Winen- und Surtales", F. Mühlberg, 1900-1908
- Geol. Karte von Zofingen, P. Niggli, 1906 und 1911
- Geol. Atlas der Schweiz, Blatt 1090 Wohlen, H. Jäckli, 1966
- Geol. Karte der Umgebung von Aarau, F. Mühlberg, 1866-1907
- Geol. Karte des unteren Aare-Reuss- und Limmattaues, F. Mühlberg 1904

### 3.3 Luftbilder

Zur stereoskopischen Interpretation standen folgende Luftbilder zur Verfügung:

- Gebiet Kleinemmetal, oberes Suhrental, oberes Seetal und ein Teil des Reusstales (Kant. Oberforstamt Luzern, Hr. P. Vogel).
- Suhrental: Kirchlerau-Ruedertal, Schöftland-Böler Freiamt: Reuss- und Bünztal-Aufnahmen: Abtwil-Oberrüti, Umgebung Sins, Beinwil-Auw, Buttwil-Muri bis zur Reuss, Bettwil-Kallern-Bünzen (Hr. Dr. P. Koch, Adligenswil).
- Kanton Zug (Kant. Forstamt Zug, Herren Giss u. Heynisch)
- Kanton Aargau (Kant. Raumplanungsamt, Hr. Kottwitz).

### 3.4 Bohrungen

Auf Grund meiner früheren Tätigkeit, unter anderem auch als Leiter der Abteilung Sondierungen in einer Tiefbaufirma, war mir bekannt, dass viele Sondierergebnisse vorhanden sind. Zuerst suchte ich Unterlagen bei den kantonalen Ämtern - Bauämtern, Nationalstrassenbüros, Gewässerschutzämtern, usw. Bei den grossen "Bauherrschaften" wie SBB, PTT, D+B wurde möglichst systematisch und detailliert nach einzelnen Bauobjekten und damit nach evt. Sondierunterlagen gesucht.

Eine wertvolle Hilfe war die schweizerische geologische Dokumentationsstelle Bern. Diese Sammelstelle, die gesamtschweizerisch arbeitet, hat enorm viele Unterlagen sichergestellt und auf Mikrofilm festgehalten. Drei Gegebenheiten waren für meine Arbeit erschwerend:

1. Jede der Sammelstelle gemeldete geologische Untersuchung wird fortlaufend nummeriert, unter der entsprechenden Gemeinde eingetragen und in einer Karte 1:25.000 festgehalten. Beispiel: Ein 2m Baggerschlitz oder eine 3m Rammsondierung werden dem Titel nach nicht unterschieden von einer loom Kernbohrung. Nur die direkte Einsichtnahme in die Kartei und in die Mikrofilme geben Auskunft über die Wichtigkeit der Daten. Für regionale Auskünfte ist dies natürlich sehr wertvoll. Für meine Arbeit war die Trennung von "Spreu und Weizen" jedoch sehr zeitraubend.
2. Urheberrechte: Für jede Arbeit, die die Sammelstelle archiviert, musste via Auftraggeber und Autor abgeklärt werden, ob die Ergebnisse zur Weiterverwendung an Dritte zur Verfügung stehen oder nicht. Fehlt diese Einwilligung, muss die Bewilligung zuerst schriftlich eingeholt werden.

3. Im Untersuchungsgebiet sind noch nicht alle Regionen von der Sammelstelle bearbeitet worden.

Meine zeitaufwendigste Arbeit bestand darin, in möglichst jeder einzelnen Gemeinde in deren Bauabteilungen nach vorhandenen Unterlagen zu forschen. Zusätzlich erkundigte ich mich nach privaten Bauherrschaften, die in den letzten Jahren grössere Bauten realisierten.

Zuletzt wurde ich noch bei den Leitern der Bohrunternehmern, geotechnischen Büros und Kiesgrubenbesitzern vorstellig.

Für die nachfolgende Zusammenstellung ist wichtig, dass ich bei Bohrungen in den Fels, nie die ganzen Felsbohrmeter, sondern nur die obersten 4-5 m im Fels berücksichtigte. Für diese Arbeit ist ja nur die Lage der Felsoberfläche, nicht aber deren Beschaffenheit wesentlich. Für eine Statistik über das Gesamttotal der Bohrmeter, müssten zu meinen Angaben noch etliche Tausend Meter Felsbohrung addiert werden.

Zwischen 1977 und Mai 1982 ortete ich im untersuchten Gebiet folgende Bohrergergebnisse:

|                             |       |               |        |           |
|-----------------------------|-------|---------------|--------|-----------|
| Umgebung Luzern             | 665   | Bohrungen mit | 10.892 | Bohrmeter |
| Luthern-Wiggertal           | 182   | "             | "      | 3.336 "   |
| Gebiet Wolhusen+Suhrental   | 364   | "             | "      | 6.830 "   |
| Gebiet Wynental             | 85    | "             | "      | 2.193 "   |
| Gebiet Seetal               | 214   | "             | "      | 5.189 "   |
| Gebiet Umgebung Zug         | 705   | "             | "      | 16.078 "  |
| Gebiet Reusstal             | 472   | "             | "      | 10.559 "  |
| Gebiet Bünztal mit Birrfeld | 363   | "             | "      | 8.614 "   |
| Total                       | 3.050 | "             | "      | 63.691 "  |
|                             | ===== |               |        | =====     |

Davon sind 337 Lockergesteinsbohrungen tiefer als 40m, und 22 tiefer als 100 m !

Von den gesamten 3050 Bohrungen wurde ca. jede dritte, nämlich 1159 bis in den Fels abgeteuft. Der Rest sind reine Lockergesteinsbohrungen.


### 3.5 Schweremessungen

Die angewandte Gravimetrie beruht auf der Messung der von der Gravitationskraft der irdischen Massen (und der der Himmelskörper) hervorgerufenen Schwerebeschleunigung  $\vec{g}$ . Die Masseinheit beträgt  $\text{cm sec}^{-2}$ , die man in der Gravimetrie zu Ehren von Galilei mit "gal" (resp. Milligal - mgal) bezeichnet. Im Verzeichnis "Schweizerisches Schweregrundnetz" sind im Untersuchungsgebiet einige absolute "Schwerebeschleunigungen in Milligal (mgal)" aufgeführt:

Luzern: Eidg. Nivellementsverzeichnis, Kt. Luzern, Blatt Nr. 3, Ordg. Nr. 20, 01, Höhe über Meer 445,031m, Hofkirche, Turm, Fundamentquader, Bodenhöhe.  
Gravimeter 0,46m vor der Nordfassade des Turmes, unmittelbar vor dem Nivellementsfixpunkt 01.

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Schwere Gravimeterstandort   | 980'614,59 mgal |
| Stativhöhe 0,44m - Reduktion | 0,135 "         |
| Schwere Bodenpunkt           | 980'614,725 "   |
| Abstich 0,00 m               |                 |
| Reduktion auf Niv. Punkt     | 0,00 "          |
| Schwere Nivellementspunkt    | 980'614,725 "   |


Reiden: Eidg. Nivellementsverzeichnis, Kt. Luzern, Blatt Nr. 22, Ordg. Nr. 253, Ⓢ 5, Höhe über Meer 458,748 m, Kirche, Turm, Sockel, 0,90m von der Ecke, 0,17 m unter Oberkante.



Stativhöhe: 0,47 m  
 Abstich : - 0,17 m

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Schwere Gravimeterstandort   | 980'662,975 mgal |
| Stativhöhe 0,47m - Reduktion | 0,145 "          |
| Schwere Bodenpunkt           | 980'663,12 "     |
| Abstich -0,17m               |                  |
| Reduktion auf Niv. Punkt     | -0,05 "          |
| Schwere Nivellementspunkt    | 980'663,07 "     |

Nottwil: Eidg. Nivellementsverzeichnis, Kt. Luzern, Blatt Nr. 19, Ordg. Nr. 207, Ⓢ 24, Höhe über Meer 552,525 m, Kirche, Strebeböfeler, Sockel 0,13m unter Fase



Stativhöhe: 0,42 m  
 Abstich : -0,25 m

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Schwere Gravimeterstandort    | 980'615,90 mgal |
| Stativhöhe 0,42 m - Reduktion | 0,13 "          |
| Schwere Bodenpunkt            | 980'616,03 "    |
| Abstich -0,25m                |                 |
| Reduktion auf Niv. Punkt      | -0,075 "        |
| Schwere Nivellementspunkt     | 980'615,955 "   |

Dazu konnten auch absolute Schwerebeschleunigungen von den im Untersuchungsgebiet liegenden Basisstationen der Arbeit Gassmann "Schweremessungen in der Umgebung von Zürich" verwendet werden.

Basisstation Nr. XVII, Kappel a. Albis; die Station liegt an der Strasse von Kappel nach Hausen, auf dem äusseren Mauerende des Einganges zum Zwingliedenkmal und ist ohne Stativ in der Mauermitte gemessen.

#### 4. Vorgehen

##### 4.1 Höhenkarte der Felsoberfläche des Anstehenden

Schwarz-weiss Abzüge der Karten 1 : 25.000 des gesamten Arbeitsgebietes wurden auf Kartontafeln aufgezo-gen. Der anstehende Fels wurde nicht wie in der geologischen Karte nach Alter und Gesteinsart gegliedert, sondern einzig und allein nach der Höhe in Metern über Meer eingezeichnet.

Es wurden 50m Bänder mit je einer eigenen Farbe gewählt. Die Höhen über 1000 müM wurden nicht mehr gegliedert, sondern mit einer roten Transparentfolie markiert.

So resultierte folgende Farbskala:

| grösser als 1000 müM |   |      |   | rote Transparentfolie |
|----------------------|---|------|---|-----------------------|
| 950                  | - | 1000 | " | blaugrün              |
| 900                  | - | 950  | " | blau                  |
| 850                  | - | 900  | " | hellblau              |
| 800                  | - | 850  | " | hellgelb              |
| 750                  | - | 800  | " | dunkelgelb            |
| 700                  | - | 750  | " | hellviolet            |
| 650                  | - | 700  | " | dunkelviolet          |
| 600                  | - | 650  | " | rosa                  |
| 550                  | - | 600  | " | orange                |
| 500                  | - | 550  | " | rot                   |
| 450                  | - | 500  | " | hellgrün              |
| 400                  | - | 450  | " | olive                 |
| 350                  | - | 400  | " | hellbraun             |
| 300                  | - | 350  | " | dunkelbraun           |
| 250                  | - | 300  | " | hellgrau              |
| 200                  | - | 250  | " | dunkelgrau            |

Optisch traten sehr deutlich die natürlichen Felshindernisse hervor, die das Gletschereis auf dem Weg nach Norden beeinflussten.

Die weissen Zonen auf der Karte sind mit Lockergestein aufgefüllte Gebiete. In diesen Regionen konzentrierte ich die Suche nach Bohrungen. Kreise in diesen weissen Flächen markieren Bohrungen bis auf den Fels.

Einen Ausschnitt aus dieser Karte M 1 : 25.000 ersehen Sie auf nächster Seite. (Region Eschenbach und Reuss-, Rontal zwischen Inwil, Perlen und Dierikon-Root). Aufnahme mit Bewilligung der Eidgenössischen Landestopographie vom 11. September 1979.



## 4.2 Bodensondierungen

### 4.2.1 Bohrverfahren

#### Rotationskernbohrung

Das Kernrohr dient zur Aufnahme einer zylindrischen Bodenprobe, welche beim Bohren mit einem durch Rotationsbewegung angetriebenen Gerät in dieses eindringt. Man nennt diese Probe "Bohrkern".

Das Kernrohr ist an seinem unteren Ende mit einer ringförmigen Vorrichtung - der Krone - versehen; üblicherweise handelt es sich um eine gezahnte Krone aus Hartmetall oder eine Diamantkrone, welche den Bohrkern aus dem Boden herauschneidet. Eine ringförmige, sog. Kernfeder verhindert das Herausfallen des Kerns aus dem Rohr beim Hinaufziehen an die Bodenoberfläche.

Man unterscheidet zwischen einfachem Kernrohr (einwandig), das in der Mehrheit der Fälle verwendet wird und Doppelkernrohr (zwei Rohre ineinander, von denen nur das Äußere rotiert).

Die Rotations-Kernbohrung kann entweder "trocken", d.h. ohne Spülung, oder mit Bohrspülung erfolgen. Das Spülmedium, meist Wasser, wird durch das Bohrgestänge zugeführt.

Der Vorteil dieser Bohrart ist die kontinuierliche Probenentnahme guter (nicht ungestörter) Qualität, sofern die Bohrtechnik dem Boden angepasst wird.

Dass nicht ungestörte Bodenproben entnommen werden können, hat vor allem folgende Ursachen: Beim Trockenbohren entsteht durch Reibungswärme ein Austrocknen der Probe und dadurch ein Verdichten des Kerns durch den Bohrvorgang. Bei der Spülbohrung werden vor allem die Feinanteile weggespült, so dass es zu einem Auswaschen der Kerne kommt. Auf diese beiden Tatsachen ist bei Bestimmung der Kornzusammensetzung von Lockergesteinen



einfaches  
Kernrohr



Doppel-  
Kernrohr

der Lagerungsdichte des Bodens, etc. aus Rotationsbohrkernen zu achten.

Möchte man "möglichst wenig gestörte Proben" aus ausgesuchten Bodenschichten entnehmen, kann dies während der Bohrung mit Hilfe von speziellen Entnahmegeräten erfolgen.

Rotationskernbohrungen durch Lockergesteine bis in grössere Tiefen ( $> 100$  m) sind möglich, werden aber in grossen Tiefen recht arbeitsaufwendig. Muss das Bohrloch beim Durchfahren vor allem von nicht bindigen Böden vor dem Zusammensturz durch Verrohrung gesichert werden, (mit sog. Futterrohren), müssen die Kernrohrdurchmesser laufend verkleinert werden (teleskopieren). Damit entsteht bei Rotationskernbohrungen eine praktische Tiefenlimite, (je nach "Schwierigkeitsgrad" der zu durchfahrenden Bodenschichten ist diese Tiefe verschieden), da der Kernrohrdurchmesser nach mehrmaligem Teleskopieren so klein wird, dass der Bohrfortschritt unverhältnismässig abnimmt.

#### Rotary-Bohrung

Bei dieser Bohrrart, von der Oelbohrtechnik auf den Sondierzweig übernommen, wird der ganze Bohrquerschnitt abgetragen. Unten am Bohrgestänge sind je nach Bodenschicht verschiedenartige "Vollbohrkronen" eingesetzt. Für weiche Böden werden meist Schneidenmeissel, für härtere Böden die Rollenmeissel (rockbits) und für härteste Partien teure Diamantkronen verwendet. Die Böden werden in kleinen Mengen (cuttings) abgetragen, welche durch einen Schlammkreislauf (ausnahmsweise auch durch Wasser oder komprimierte Luft) an die Oberfläche gelangen. Die Probeentnahme erfolgt durch Aussieben des Schlammes.

Auf diese Art können beliebige Böden, einschliesslich Blöcke, verkittete Schichten und Fels durchfahren werden. Das kontinuierliche Verfahren (ohne Ausbau des Bohrwerkzeuges für Bodenprobengewinnung) ermöglicht einen grossen Bohrfortschritt. Es eignet sich vor allem für Sondierungen in grosse Tiefen.

Als Nachteile sind die stark gestörten Proben, Ungenauigkeit in der Abgrenzung der Schichten, Notwendigkeit die cuttings vom Bohrschlamm zu trennen, was bei feinen Böden gewisse Schwierigkeiten mit sich bringt, zu nennen.

Oft wird für tiefere Sondierungen eine Kombination der beiden Bohrarten vorgenommen.

#### Grossdurchmessrige Bohrungen


Werden aus praktischen Gründen (z.B. für Pfähle oder Filterbrunnen) grossdurchmessrige Bohrungen in Lockergestein abgeteuf, sind diese ebenfalls für Sondierzwecke zu gebrauchen.

Die Materialentnahme geschieht mit einer Klappsonde oder einem Greifer. Die Klappsonde ist ein Rohr, an dessen unterem Ende ein Ventil angebracht ist. Das Arbeiten mit diesem Gerät setzt das Vorhandensein oder die Zugabe von Wasser voraus, um die erforderliche Saugwirkung zu erreichen. Beim Schlagen und Ziehen der Sonde dringt der mit Wasser gemischte Boden durch das Ventil in das Rohr ein und wird dort bis zum Ausleeren an die Bodenoberfläche festgehalten. Der Grei-

fer gräbt sich durch den Fall in den Boden ein. Er ist mit einer Schliessvorrichtung versehen und fördert das Bohrgut an die Oberfläche.

Bei beiden Methoden wird - zur Verhinderung des Bohrlocheinsturzes - laufend ein dickwandiges Rohr nachgedreht.

Foto: Equipe bei der Ausführung einer Kernbohrung.  
 Rotationsbohrmaschine Typ Wirth Bo. - Gewicht 2,5 Tonnen. -  
 Antrieb mit 28 PS Motor. - Drehzahl regulierbar von 0-96  
 Touren/Min. - Vorschubkraft 3,0 Tonnen. - Gestänge 50 mm  
 Durchmesser, auf der Foto Kernrohr 145 mm Durchmesser. -  
 Max. Bohrtiefe ca. 100 m.



#### 4.2.2 Uebertragen der Bohrergebnisse in die topographische Karte M. 1 : 25.000

Auf den auf Sperrholzplatten aufgezogenen topographischen Originalkarten M 1 : 25.000 färbte ich die Flächen des anstehenden Felsens rot.

Mit farbigen Nadelköpfen markierte ich in dieser vorbereiteten Karte die Bohrpunkte. Die Bohrungen sind masstäblich - 1 mm auf der Karte entspricht 1 Bohrmeter.

Gestrichelte vertikale Linien nach oben bedeuten Verlängerung zum ehemaligen natürlichen Terrainpunkt, bei Bohrungen von einem künstlichen, tieferen Niveau aus (z.B. bei Kiesgruben, Mülldeponien etc.).

Rote und orange Nadelköpfe zeigen an, dass die Bohrungen den Fels erreichten, gelbe, grüne und weisse Punkte markieren Bohrungen nur im Lockergestein. Blaue Markierungspunkte zeigen Wasserfassungen an. (Die Ziffern daneben geben die konzessionierte Wasserentnahmemenge des Brunnens in Liter/Minute an.)

Die farbigen Markierungspunkte informieren zusätzlich über folgendes:

|           |                                                                         |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| dunkelrot | Fels bereits nach einigen Bohrm Metern erreicht                         |
| orange    | Fels erst in grösserer Tiefe erbohrt                                    |
| grün      | zuoberst markante Moräne, Bohrung nicht bis auf Fels                    |
| weiss     | zuoberst markante feinkörnige Seeablagerung, Bohrung nicht bis auf Fels |
| gelb      | diverse Lockergesteine, Bohrung nicht bis auf Fels                      |

Beim vertikalen Strich (1 mm entspricht 1 Bohrmeter) sagen die Farben etwas über das Bohrgut aus:

|             |                                     |   |   |   |
|-------------|-------------------------------------|---|---|---|
| Gelbe Linie | Ton/Silt im Bohrkern vorherrschend  |   |   |   |
| Orange "    | Sand                                | " | " | " |
| Braune "    | Kies                                | " | " | " |
| Grüne "     | mit horizontaler Schraffur = Moräne |   |   |   |

Rote Linie Fels, aufgelockert

Rote Doppellinie fester Fels als Bohrkern

Mit hellblauem horizontalem Strich ist die Lage des Grundwasserspiegels in der Bohrung eingetragen. Falls in der Bohrung mehrere Grundwasserspiegel angetroffen wurden, sind die tieferen speziell markiert. Artesisch gespanntes Grundwasser ist mit einem hellblauen Pfeil nach oben markiert.

Wichtige Informationen aus der Bohrung sind rechts vom Strich in roter Farbe angegeben. Dabei beschränkte ich mich auf Angabe von Verrucanobohrkern mit V (Leitgestein des Linthgletschers) und rote Ringe bei Pollenanalysen aus dem Bohrkern.

Einen Ausschnitt aus dieser Karte M 1 : 25.000 finden Sie auf nächster Seite (Region analog Karte S. 16).

Die Gesamtkarte ist bei mir zu Hause archiviert und kann eingesehen werden. Zudem ist sie bei der SGD (Sammelstelle geologischer Dokumente in Bern) auf Mikrofilm festgehalten.


Angaben wie Koordinaten, Höhe des Bohrpunktes, Detailbeschreibung des Bohrgutes, der Lagerungsdichten etc., sämtlicher Bohrungen sind bei mir nach geographischer Lage geordnet archiviert.


#### 4.3 Grundwasserhöhenkarte mit Eintragung des Chemismus

In einem weiteren auf Karton aufgezogenen schwarz-Weiss Abzug der Karten M 1 : 25.000 sind Grundwassergebiete eingetragen. Die Grundwasserhöhen wurden dabei speziell markiert mit der gleichen Farbskala wie unter 4.1 beschrieben.

Im Gegensatz zu gebräuchlichen Grundwasserkarten treten bei dieser Darstellungsart die Fliessrichtungen und Zusammenhänge einzelner Grundwassergebiete deutlicher hervor.

In diese Karte wurden zudem Teilergebnisse von chemischen Grundwasseruntersuchungen (Gesamt- und Karbonathärten) eingetragen.





Die Ergebnisse von über tausend Analysen wurden via speziellem Computerprogramm ausgewertet und per Plotter direkt in die Karte übertragen.

Das Resultat dieser Arbeit hat sich leider für eine Interpretierung evt. vorhandener Talzusammenhänge als nicht geeignet erwiesen.

Trotzdem soll hier erwähnt sein, dass die Ergebnisse der chem. Analysen bei mir archiviert sind. Die Karte kann eingesehen werden. Eventuell dient sie für andere Aufgabenstellungen.

#### 4.4 Gravimetrie

##### 4.4.1 Das Untersuchungsprogramm

Aus theoretischen Ueberlegungen und an Hand von empirischen Messungen weiss man, dass die Schwerebeschleunigung  $g$  abhängig ist vom Beobachtungsort. Laut K. Jung (1961) nimmt die Schwere grossräumig gesehen vom Aequator zum Pol um etwa 5,2 Gal zu und hat im Mittel (bei 45° nördlicher Breite) einen Wert von 980,6 Gal. Die Zunahme mit wachsender geographischer Breite erklärt sich infolge der rotationsellipsoiden Form der Erdkugel, und weil die nach aussen gerichtete Zentrifugalbeschleunigung mit wachsender Breite infolge Abnahme des Dreharmes kleiner wird.

Die an der Erdoberfläche gemessene Schwerebeschleunigung wird in der Praxis mit der Normalschwere verglichen. Abweichungen von der Normalschwere bezeichnet man als Schwereanomalien.

Regionale Abweichungen treten dann auf, wenn infolge unterschiedlichen geologischen Gegebenheiten Gesteine mit grösseren Dichtekontrasten vorliegen. Das Schwerefeld der Schweiz ist detailliert bekannt und wurde von Klingelé und Oliver (1979) in der Schwerekarte der Schweiz veröffentlicht.

Ich interessiere mich für die Schwereanomalien, welche durch den Dichteunterschied zwischen dem Quartär und dem Tertiär hervorgerufen werden.

Gretener (1954) und Gassmann (1962) ordneten in ihren Arbeiten die Messstationen flächenhaft an. Im Vordergrund standen für sie nicht geologische Gesichtspunkte, sondern es wurden vielmehr präzise höhenvermessene Punkte gewählt. Gretener schlug vor, bei zukünftigen analogen Arbeiten, die Wahl der Messpunkte vermehrt nach geologischen Gesichtspunkten zu treffen.

Diesem Ratschlag folgend entschloss ich mich, die Messstationen nicht flächenhaft, sondern profilförmig anzulegen. Die Wahl der Profile geschah dabei nach geomorphologischen Gesichtspunkten, d.h. ich legte sie in Talabschnitte, wo über den Verlauf des Felsuntergrundes nichts bekannt war. Wichtig für jedes Profil war, den regionalen Trend der Schwereanomalie aus der Schwerekarte zu eruieren. Um den Schweregradienten möglichst genau zu berücksichtigen, legte ich zudem die Messstationen an beiden Profilenden auf anstehenden Fels.

Der Abstand zwischen den Messstationen wurde relativ klein, nämlich ca. 250-300 m angenommen. Dabei beachtete ich, dass die Messstationen möglichst parallel, oder ungefähr senkrecht zu den aus der Schwerekarte der Schweiz herausgelesenen Linien gleicher Schwerebeschleunigung liegen. Da die zu erwartenden Schwere-Anomalien infolge Dichtedifferenz Quaritär/Tertiär erfahrungsgemäss minimal sind, (max. einige Milligal) war man nicht sicher, ob bei der zweiten (senkrecht stehenden) Anordnung der Messstationen die Anomalien überhaupt noch feststellbar seien. Deshalb stufte ich solche Profile als Profile zweiter Priorität ein.

Für zukünftige analoge Arbeiten sollte darauf geachtet werden, dass gradlinig in der Verlängerung der Achse an beiden Profilenden minimal 3 - 4 Felspunkte liegen. (evt. Abstände zwischen den Messstationen verkleinern, resp. Profil über das Untersuchungsgebiet hinaus verlängern!).

Profile erster Priorität: (Profile möglichst parallel zu den Linien gleicher Bouguer-Anomalien).

Profil Rifferswil Nr. 62: Messstationen: von Sins via Friesencham nach Rifferswil. In der Profilachse befindet sich ein markanter Knick bei Friesencham. Vom linken Profilteil erhoffte man Angaben über Felstiefen im Reusstal bei Sins. Im rechten Profilteil wurden die Messstationen nahe von Tiefbohrungen bis auf den Fels gelegt, um damit Umrechnungsfaktoren von Schwereanomalien auf Felstiefe, (d.h. Mächtigkeit der Lockergesteinsablagerungen) zu erhalten. (Eichstationen).

Profil Mühlau Nr. 54: Dieses Profil quer zum Reusstal soll Auskunft über die Entwicklung dieses Talabschnittes bringen.

Profil Muri Nr. 55: Das Profil geht von Muri über Aristau nach Jönen und sollte Angaben bringen über das Reusstal sowie den Ursprung des Bünztales.

Profil Boswil Nr. 56: Die Messstationen verteilen sich übers Bünztal zwischen Boswil und Besenbüren und über das Reusstal bis Unterlunkhofen und sollen Ergebnisse über beide Täler bringen.

Profil Sursee Nr. 60: Das Profil verläuft quer zum Suhrental auf Höhe Sursee und soll über die Talform bei Sursee Auskunft geben.

Profil Büron Nr. 61: Das Profil verläuft vom Nordende des Dorfes Knutwil quer zum Suhrental bis Büron und soll etwas über diese Talentwicklung aussagen.

Profile zweiter Priorität: (Profile verlaufen ungefähr senkrecht zu den Linien gleicher Bouguer-Anomalien).


Profil Eschenbach Nr. 63: Es verläuft südlich von Eschenbach nach Buchrain. Die Ergebnisse sollen Auskunft geben über die Morphologie dieses Reusstalabschnittes.

Profil Immensee Nr. 51: verläuft von Risch-Oberirisch über dem Chiemen nach Immensee, Oberimmensee zum Vorder Berg am Rigi-fuss. Die Ergebnisse sollen über den Felsverlauf in der Fortsetzung Fänn bei Oberirisch, aber vor allem über den Felsverlauf bei Immensee, orientieren.

Profil Küssnacht Nr. 50: verläuft im Norden vom Hügel Dorf-allmig über Küssnacht nach Hinter Berg am Rigi-fuss und soll eine evt. Verbindung Küssnachtersee-Zugersee aufzeigen.

# Gravimetrieprofile

- Profil erster Priorität  
 --- Profil zweiter Priorität  
 ..... Profil dritter Priorität



Profile dritter Priorität: (Die Messpunkte liegen nicht in einer Profilachse und die Abstände zwischen den Messstationen sind grösser).

Das Profil Sursee wurde nordöstlich bis nach Beromünster weitergezogen (Messstationen 6017 bis 6028). Gesucht wird der Felsverlauf im Chommlermoos und in der Gegend von Beromünster.

#### 4.4.2 Apparate

Um die Anomalien in der Grössenordnung bis  $\frac{1}{10}$  Milligal genau zu eruieren, sind präzise Messgeräte notwendig.

Tatsächlich existieren heute Präzisionsinstrumente, mit denen Beschleunigungsunterschiede von  $\frac{1}{1000}$  Milligal festgestellt werden können. Diese sog. Gravimeter beruhen auf dem Prinzip der Federwaage, wobei die minimalen Dehnungen der Feder gemessen werden.

An einem gegebenen Punkt bleibt die Schwere während eines Tages nicht konstant. Diese Erscheinung bezeichnet man mit "täglichem Gang", verursacht vor allem durch die wechselnde Lage von Mond und Sonne. Mittels Tabellen über Gezeiteneinflüsse lassen sich diese Unterschiede ausgleichen. (Tabellen zur Berechnung der Gezeiteneinflüsse werden jährlich in der Dezemberausgabe der "Geophysical Prospection" publiziert).

Weitere zu berücksichtigende Einflüsse (Drifteinflüsse) sind noch instrumenteneigene Kriecherscheinungen der Tragfeder, Einflüsse von Transport, Temperaturunterschiede, etc. Bei neueren Gravimetern ist die Instrumentendrift auf ein Minimum reduziert.

Das für unsere Messungen vom Institut für Geophysik der ETH zeitweise zur Verfügung stehende Instrument Lacoste und Romberg ist in dieser Beziehung ideal, und sehr gut gegen Erschütterungen geschützt. Mit einer mit Batterie betriebenen Heizung wird die Temperatur konstant auf  $51,5^{\circ}\text{C}$  gehalten. Damit wird die Instrumentendrift auf die Grössenordnung von 1 mgal pro Monat reduziert. Mit diesem Instrument haben freundlicherweise Herr Dr. Kissling vom Institut für Geophysik die Profile Küssnacht und Immensee und Herr Schwendener vom gleichen Institut das Profil Rifferswil gemessen.

Sämtliche Messpunkte des Profils Rifferswil wurden gleichzeitig mit dem Lacoste und Romberg und auch mit dem älteren Worden-Gravimeter durchgemessen, um die Drifteigenschaften des älteren Gerätes zu ermitteln. Die Instrumentendrift des Worden-Gravimeters war recht hoch. Dies bedingte, um brauchbare Resultate zu erhalten, Messabläufe in kurzen Schleifen, (d.h. dass man in kürzeren Zeitabständen wieder auf einen sog. Basispunkt zurückkehrt und annimmt, dass die Drift in der Zwischenzeit linear zu- oder abnimmt).

Auf diese recht zeitraubende Weise wurden von mir die Profile Mühlau, Muri, Eschenbach, Sursee und Büron durchgemessen.

Das Worden-Gravimeter hat eine Ablesegenauigkeit von  $\frac{1}{100}$  mgal. Bei den Messungen wird der Zeiger des Instrumentes stets in Nullage eingespielt. Schweredifferenzen werden durch Betätigung einer Feinschraube gemessen, wobei ein Skalenteil der Feinschraube 0,0972 mgal ausmacht. Nachteilig bei diesem Gerät wirkt sich aus, dass der Messbereich relativ klein ist, so dass bei Profilen mit grösserem Höhenunterschied mit der Grobschraube (Geodetic Dial) der Messbereich verstellt werden musste.

Damit genau die Vertikalkomponente der Schwere gemessen wird, ist es notwendig, dass das Gerät senkrecht auf den Neigungstisch justiert wird.

#### 4.4.3 Feldarbeit

Nach Festlegung der Messstationen nach geomorphologischen Gesichtspunkten in der Karte 1: 25.000 war aus folgenden Gründen eine Begehung jedes einzelnen Punktes im Felde notwendig:

Die Geländegestalt der Umgebung eines Beobachtungsortes beeinflusst den Schwerewert. Bei der Auswertung wird dies genau berücksichtigt. (vgl. Kapitel 4.4.4 Theoretische Auswertung - Gelände- oder topographische Wirkung). Die Schwerkreeinwirkung von Massen um den Beobachtungspunkt ist eine Funktion des Abstandes. Deshalb wird im Feld darauf geachtet, dass die Nächstumgebung um den Beobachtungspunkt eine möglichst einfache Topographie aufweist. Zusätzlich dürfen keine Störfaktoren, wie Massenverlagerungen (Schutthalden etc.) oder Bodenhohlräume (Kanalisationen etc.) in Stationsnähe vorkommen.

Wichtig ist das Versiegeln der Messstationen im Felde. Stationen in Aeckern und Wiesen wurden verpflockt, Strassenpunkte im Asphalt mit Nägeln markiert. Dazu wurde jeder Messpunkt mit einem Situationsbeschrieb und einer Situations-skizze festgehalten. (Diese Detailunterlagen sind im Institut für Geophysik der ETH und bei mir archiviert).

Zeitaufwendiger als die Schweremessungen mit dem Gravimeter waren die Nivellierarbeiten. Um die hohe Genauigkeit der

Gravimeter auszunützen, wurden die Messstationen auf 3 cm genau höhenvermessen, (da die Schwere um ca. 0,03 mgal/dm Höhenunterschied variiert).


Für die Berechnung der sog. topographischen Nächsteinflüsse (vgl. Kap. 4.4.4) wurden um jede Messstation 12 zusätzliche Punkte höhenvermessen. (Die 4 Nächstpunkte auf  $\pm 5$  cm, die 8 entfernten auf  $\pm 10$  cm genau.)

Entgegenkommenderweise übernahmen die Kantone, in denen die Profile liegen, die Nivellierungsarbeiten.

Die Schweremessungen mit dem Lacoste und Romberg erfolgten im Herbst 1980, das Profil Rifferswil zusätzlich noch mit Worden-Gravimeter im Frühjahr 81 und die Mes-

#### Rastersystem

1:500



sungen mit dem Worden im Frühling 1981.

Da mit den Instrumenten nur relative Schwereunterschiede messbar sind, verdichtete ich das Netz der sog. Basispunkte (bei denen die absoluten Schwerewerte bekannt sind), indem an die Punkte erster Ordnung (an Fundamentaltalpunkte angeschlossen) noch etliche Basispunkte zweiter Ordnung (nur an Basispunkte erster Ordnung angehängt) eingeführt wurden.

#### 4.4.4 Theoretische Auswertung

Die Ablesung erfolgt bei den Instrumenten in Skalenteilen, die mit instrumenteneigenen Umrechnungsfaktoren auf Milligal umgerechnet werden.

Durch Berechnung der Schweredifferenzen der Messstationen zu Fundamental- oder Basispunkten erster Ordnung (von denen absolute Schweredaten bekannt sind) werden unkorrigierte Schwerewerte  $g$  beobachtet-unkorrigiert bestimmt.

Im Anschluss wird die Gezeiteneinwirkung für die einzelnen Messzeitpunkte durch Interpolationen aus den Gezeitentabellen ermittelt. Des weiteren werden die Korrektur der Stativhöhen (mit dem Freiluftgradienten  $0,3086 \text{ mgal/m}$ ) und schliesslich die Driftkorrekturen des Messgerätes durchgeführt.

Auf diese Weise erhält man die korrigierten Schwerebeschleunigungen  $g$  beobachtet + korrigiert,  $g_{b+k}$ .

Für jede Messstation werden Koordinatenwerte, Höhenangaben und diese Schwerebeschleunigungen  $g_{b+k}$  via Lochkarten dem Computer eingegeben.

Um vergleichbare Werte zu erhalten, müssen diese Schwerewerte  $g_{b+k}$  auf ein eingeebnetes, gemeinsames Bezugsniveau umgerechnet, d.h. reduziert werden, als ob die Messungen auf einer theoretischen Bezugsfläche (wobei die Gelände- fläche mit der Bezugsfläche identisch wäre) ausgeführt würden.

Diese Rechnungen bezeichnet man als Schwerereduktionen. Folgende Einflüsse müssen bestimmt und von der gemessenen und korrigierten Schwere  $g_{b+k}$  abgezogen werden:


- Einfluss der Geländegestalt (= Gelände- oder topographische Wirkung (49)). Früher hat man diese Arbeit unter dem Begriff Terrainkorrektur durch zeitraubendes Auszählen und Umrechnen von einzelnen höhenbestimmten Sektorenteilen um den Messpunkt erledigt. Dabei musste für jede Messstation die volle Arbeit für die ganze Umgebung durchgeführt werden.

Trotzdem heute Computerprogramme für diesen Reduktionsschritt zur Verfügung stehen, ist der manuelle Arbeitsaufwand (Erfassen der Daten, die dem Computer eingegeben werden) immer noch sehr gross.

Der grösste Vorteil und eine enorme Zeitersparnis liegt darin, dass heute die Daten betr. Terrainhöhen flächenhaft

erfasst werden können und der Computer nach Programm die einzelnen Einflüsse sämtlicher erfasster Punkte (bis 2,5 km Entfernung) auf die jeweilige Messstation bezogen, rechnet. Auf diese Art und Weise kann die Auszählerarbeit aus den Landeskarten M 1 : 25.000 quadratkilometerweise (100 Höhen-Ablesungen pro km<sup>2</sup>) geschehen und die Daten stehen für beliebige zukünftige Messstationen dieses Rayons bereits zur Verfügung.

Damit werden die Terraineinflüsse der sog. Nahtopographie im Radius von 18 m bis 2,5 km um die Messstation berücksichtigt. Auf der Karte angebrochene Quadratkilometer müssen voll ausgezählt werden.



Das Auszählen geschieht, indem eine Transparentfolie nach nebenstehendem Muster auf die Karte 1 : 25.000 aufgelegt und an Hand der Höhenlinien auf 2 m genau die hundert Höhendaten herausgelesen werden.

Diese Daten werden auf Lochkarten übertragen. (Man benötigt 11 voll gelochte Karten pro km<sup>2</sup>).

Die Auswertung geschieht mit dem Computerprogramm Modtop.



Kartenausschnitt 1:25.000, reproduziert mit Bewilligung der Eidgenössischen Landestopographie, vom 11. September 1979.

Diese Methode wurde übernommen von der "Gruppe Gravimetrie" des Institutes für Geophysik der ETHZ (E. Klingelé, E. Kissling und H. Schwendener).

Die detaillierte Abfolge der einzelnen Arbeitsschritte ist im Kapitel 4.4.5 bei Profil Nr. 56 Boswil aufgeführt.

Für jede einzelne Messstation muss noch die Korrektur der sog. Nächstopographie  $\pm 18$  m berücksichtigt werden. Die unter 4.4.3 beschriebenen, auf die Messstationenbezogenen Relativ-Höhenunterschiede werden einzeln auf Lochkarten gestanzt. Ein Computerprogramm (Programm Charibe) berechnet die entsprechenden Schwerebeeinflüsse auf die Messstation.

Die Beeinflussung der Ferntopographie (2,5 - 40 km) ist für die Schweiz programmiert und die Reduktionen erfolgen für die einzelnen Messstationen ohne zusätzliche manuelle Eingaben.

- Wirkung der zwischen dem Stationsniveau und dem Bezugsniveau liegenden Gesteinsplatte (= Bouguer-Platte)  $(\Delta g)_{BP1}$

Das Gelände ist nach der Terrainkorrektur auf die Höhe des Messpunktes abgeflacht, resp. aufgeschüttet zu denken. Die zu reduzierende Bouguermasse besteht aus einer Platte der Dicke  $H$  über der Referenzfläche. Die Anziehung dieser Bouguer-Platte wird abgezogen. Sie beträgt

$$(\Delta g)_{BP1} = 2\pi \cdot k_0 \cdot \rho \cdot H$$

$k_0$  = Gravitationskonstante =  $6,67 \times 10^{-8} \text{ cm}^3 \text{ g}^{-1} \text{ sec}^{-2}$

$\rho$  = mittlere Gesteinsdichte, bei unseren Berechnungen durchwegs mit  $2,5 \text{ g/cm}^3$  angenommen.

Auch diese Reduktion führt der Computer aus.

- Einfluss der Stationshöhe (= Niveau- oder Freiluft-Wirkung)  $(\Delta g)_{Fr}$

$$(\Delta g)_{Fr} = - \frac{2 g_n}{r_E} \times H \approx - 0,3088 \text{ mgal/m bei } \varphi = 45^\circ$$

$\approx - 0,3086 \text{ mgal/m in unseren Breiten}$

$r_E$  = mittlerer Erdradius

$H$  = Höhenunterschied zwischen Messstation und Bezugsniveau

Dies ist ebenfalls eine Computerarbeit.

Nach allen Korrekturen und Reduktionen können die reduzierten Schwerewerte  $g_r$  der Messstationen direkt miteinander verglichen werden. Es gilt:

$$g_r = g_{b+k} - (\Delta g)_T - (\Delta g)_{BP1} - (\Delta g)_{Fr}$$

Dabei ist

- die Geländewirkung  $(\Delta g)_T$  immer positiv

- die Wirkung der Bouguer-Platte  $(\Delta g)_{BP1}$

negativ, wenn sie über dem Bezugsniveau liegt  
positiv, " " unter " " "

- der Freiluftgradient  $(\Delta g)_{Fr}$

positiv, wenn die Station über dem Bezugsniveau liegt  
negativ, " " " unter " " "

Als Bezugsniveau hat sich in der Praxis ein abgeplattetes Rotationsellipsoid, auch Erdellipsoid genannt, eingebürgert. Die theoretischen Schwerebeschleunigungen auf diesem Bezugsniveau bezeichnet man mit Normalschweren  $g_n$ . Diese Normalschweren verändern sich nur nach den geographischen Breiten  $\varphi$  und lassen sich nach folgender Schwereformel berechnen:

$$g_n = g_{\text{Aequ}} (1 + b \cdot \sin^2 \varphi - \beta \cdot \sin^2 2\varphi)$$

Dabei bedeuten:  $g_n$  = Normalschwere in Gal

$g_{\text{Aequ}}$  = Schwere am Äquator = 978,0318 Gal

$b = 5,3024 \cdot 10^{-3}$

$\beta = 5,87 \cdot 10^{-6}$

$\varphi$  = geographische Breite

Die Differenz zwischen  $g_r$  und  $g_n$  bezeichnet man als bouguersche Schwereanomalie.

Diese bouguerschen Schwereanomalien wurden vom Institut für Geophysik mit dem Programm Plouff bestimmt.

Die bouguerschen Schwereanomalien habe ich als  $\gamma$ -Werte in ein Koordinatensystem eingetragen, wobei auf der Abszisse (bei profilförmiger Anordnung der Mess-Stationen möglich) die Mess-Stationen in einem frei gewählten Masstab lage-richtig eingezeichnet werden.

Entspricht die Dichte der Reduktionsmasse der Normdichte von  $2,5 \text{ g/cm}^3$ , liegen bei profilförmiger Anordnung der Messstationen die im Koordinatensystem eingetragenen bouguerschen Anomalien auf einer Geraden.

Wird die Anordnung der **Messstationen** ungefähr parallel zu Linien gleicher bouguerscher Schwerewerte gelegt, ist die Lage der Geraden im Koordinatensystem ungefähr horizontal (Profile erster Priorität). Liegt das Profil jedoch schräg zu Linien gleicher bouguerschen Anomalien, wird die Lage der Geraden im Koordinatensystem steil. (Profile zweiter Priorität). Die Lage der Geraden wird unter dem Begriff "Regionalanomalie des Profils" definiert.

Bei der Profilwahl wird darauf geachtet, dass auf beiden Profilseiten je einige **Messstationen** auf dem anstehenden Fels liegen. Dadurch wird die Regionalanomalie, die man aus der Schwerekarte der Schweiz bestimmen kann, verifiziert.

Die quartären Talauffüllungen mit Lockergestein weisen tiefere Durchschnittsdichten als die Normdichte auf. Die Profile wurden so gewählt, dass **Messstationen** im mittleren Profilteil auf Lockergestein (unbekannter Mächtigkeit) liegen.

Bei solchen **Messstationen** ist nun aber die Dichte der Reduktionsmasse kleiner als die Normdichte. Dadurch erhält man eine negative Anomalie. Diese negative Anomalie bestimmt man praktisch (aus den im Koordinatensystem eingetragenen Werten) aus der Differenz zwischen bouguerschen Anomalie und Regionalanomalie. Sie wird unter dem Begriff Residual-Anomalie geführt.

Wären die Durchschnittsdichten des Lockergesteins genau bekannt, könnte mit der Formel für die Anziehung einer Platte die Lockergesteinsmächtigkeit angenähert ermittelt werden:

$$h_{LG} = \frac{|\Delta g|}{2\pi \cdot k_0 \cdot \Delta \rho}$$

Dabei bedeutet

$$\begin{aligned} h_{LG} &= \text{Mächtigkeit des Lockergesteins in cm} \\ |\Delta g| &= \text{Absolutwert der Residualanomalie in gal} \\ k_0 &= \text{Gravitationskonstante} = 6,67 \times 10^{-8} \text{ cm}^3 \text{ g}^{-1} \text{ sec}^{-2} \\ \Delta \rho &= \text{Dichtedifferenz } (2,5 - \rho_{LG}) \text{ in g/cm}^3 \end{aligned}$$

Die einzige Unbekannte, die abgeschätzt werden muss, ist die Durchschnittsdichte des Lockergesteins. Da die Talauffüllungen heterogen sind, resultieren da gewisse Berechnungsfehler.

N. Pavoni (1962) hat im Kapitel "Geologische Interpretation der lokalen bouguerschen Schwereanomalien" der Arbeit "Schweremessungen in der Umgebung von Zürich" je nach vermutetem Untergrund, mittlere Dichten von 2,1 g/cm<sup>3</sup> für trockene Schotter mit Moränenüberlagerung, 2,26 g/cm<sup>3</sup> für Moränen und Schotter nass und 2,32 g/cm<sup>3</sup> für vorwiegend Moränematerial unterschieden. (Es waren damals noch keine Tiefbohrungen im Lockergestein in der Gegend vorhanden). Vergleiche mit Bohrdaten ergaben, dass die von N. Pavoni berechneten Ergebnisse mit den getroffenen Berechnungsannahmen, den Realitäten recht nahe kommen.

Für die Talabschnitte mit mächtigen Lockergesteinsauffüllungen bringt die Annahme einer mittleren Lockergesteinsdichte von 2,15 g/cm<sup>3</sup> (Grundlage meiner Interpretation) die wahrscheinlichste Genauigkeit.

Die Auflösung obiger Gleichung bringt demnach nachfolgende Beziehung zwischen negativer Anomalie und Lockergesteinsmächtigkeit:

Annahme: Residualanomalie = 1 mgal

$$h_{LG} \approx \frac{0,001}{2\pi \cdot 6,67 \cdot 10^{-8} \cdot 0,35} \approx 6800 \text{ (in cm)}$$

Bei diesen Berechnungsannahmen verursacht ca. 68 m Lockergesteinsmächtigkeit eine negative Anomalie von 1 mgal.

Da man bei dieser Berechnungsart nur zweidimensional arbeitet, räumliche Seiteneinflüsse (z.B. Muldenende) nicht berücksichtigt und mit der theoretischen Annahme der Anziehung einer Platte ebenfalls abstrahiert, resultieren sicher gewisse Fehler.

Von wissenschaftlichem und praktischem Interesse wäre die Bestimmung der negativen Schwereanomalien bei vorhandenen Tiefbohrungen bis auf den Fels. Mit den vorhandenen Angaben der Lockergesteinsarten und der Höhe des Grundwasserspiegels liessen sich perfekte Eichwerte bestimmen.

Die nachfolgenden Tabellen mit den berechneten Schwereanomalien zeigen bei den Stationen sämtlicher drei Anordnungsprioritäten (vgl. Kap. 4.4.1) brauchbare, ja teils sehr informative Resultate. (siehe Kap. 4.4.5 und 4.4.6).

#### 4.4.5 Praktische Auswertung am Beispiel Profil Nr. 56 Boswil

Aus dem Kartenausschnitt auf der nächsten Seite (reproduziert mit Bewilligung der Eidgenössischen Landestopographie, vom 11. September 1979) ist die Lage der Profilpunkte ersichtlich.

An diesem Profil sind die detaillierten Auszüge aus allen Arbeitsvorgängen aufgeführt. Bei allen andern Profilen (vgl. Kapitel 4.4.6) sind nur noch die Schlussergebnisse zusammengefasst.

Boswil Nr. 56 - Höhenvermessung der Messstationen und der "Nächstpunkte".

|      |        |                |        |      |        |      |         |
|------|--------|----------------|--------|------|--------|------|---------|
| 5601 | 579 01 | 5605           | 471 26 | 5609 | 441.12 | 5613 | 434.630 |
| 1    | 576 58 | 1              | 471 09 | 1    | 441 45 | 1    | 434 430 |
| 9    | 574 51 | 9              | 471 45 | 9    | 440 63 | 9    | 434 120 |
| 21   | 577 28 | 21             | 471 13 | 21   | 441 23 | 21   | 434 490 |
| 25   | 577 23 | 25             | 470 58 | 25   | 440 88 | 25   | 434.370 |
| 56   | 578 82 | 56             | 471 59 | 56   | 441 19 | 56   | 434 520 |
| 60   | 579 60 | 60 (HAUS 6.90) | 471 45 | 60   | 440 71 | 60   | 434 540 |
| 72   | 579 42 | 72             | 472 16 | 72   | 441 43 | 72   | 434 540 |
| 80   | 584 13 | 80             | —      | 80   | 440 53 | 80   | 434 360 |
| 81   | 578 87 | 81             | 471 25 | 81   | 441 14 | 81   | 434 550 |
| 82   | 578 80 | 82             | 471 22 | 82   | 441 04 | 82   | 434 650 |
| 83   | 579 04 | 83             | 471 33 | 83   | 441.12 | 83   | 434 580 |
| 84   | 579 17 | 84             | 471 27 | 84   | 441 04 | 84   | 434 660 |
| 5602 | 558 91 | 5606           | 467 27 | 5610 | 437 44 | 5614 | 434 496 |
| 1    | 555 45 | 1              | 463 69 | 1    | 437 05 | 1    | 434 029 |
| 9    | 552 22 | 9              | 465 82 | 9    | 437 03 | 9    | 434 079 |
| 21   | 556 97 | 21             | 466 74 | 21   | 437 11 | 21   | 434 219 |
| 25   | 555 85 | 25             | 467 29 | 25   | 437 28 | 25   | 434 159 |
| 56   | 561 61 | 56             | 466 99 | 56   | 437 17 | 56   | 434 160 |
| 60   | 557 98 | 60             | 467 83 | 60   | 437 02 | 60   | 434 580 |
| 72   | 564 13 | 72             | 466 48 | 72   | 437 10 | 72   | 434 100 |
| 80   | 557 83 | 80             | 468 28 | 80   | 436 82 | 80   | 434 520 |
| 81   | 559 03 | 81             | 467 20 | 81   | 437 46 | 81   | 434 440 |
| 82   | 558 78 | 82             | 467 28 | 82   | 437 44 | 82   | 434 570 |
| 83   | 558 93 | 83             | 467 26 | 83   | 437 44 | 83   | 434 370 |
| 84   | 558 79 | 84             | 467 33 | 84   | 437 38 | 84   | 434 480 |
| 5603 | 521 87 | 5607           | 454 36 | 5611 | 436 75 | 5615 | 434 525 |
| 1    | 521 70 | 1              | 454 46 | 1    | 436 23 | 1    | 431 610 |
| 9    | 517 29 | 9              | 453 85 | 9    | 436 06 | 9    | 434 100 |
| 21   | 521 47 | 21             | 454 35 | 21   | 436 27 | 21   | 434 280 |
| 25   | 519 53 | 25             | 454 10 | 25   | 436 64 | 25   | 433 920 |
| 56   | 524 04 | 56             | 454 69 | 56   | 436 47 | 56   | 434 620 |
| 60   | 522 63 | 60 (HAUS 5.40) | 454 44 | 60   | 435 75 | 60   | 434 890 |
| 72   | 564 13 | 72             | 454 66 | 72   | 436 39 | 72   | 434 670 |
| 80   | 522 34 | 80             | —      | 80   | 435 59 | 80   | 435 010 |
| 81   | 521 77 | 81             | 454 49 | 81   | 436 78 | 81   | 434 510 |
| 82   | 521 79 | 82             | 454 31 | 82   | 436 74 | 82   | 434 610 |
| 83   | 521 87 | 83             | 454 43 | 83   | 436 76 | 83   | 434 520 |
| 84   | 521 97 | 84             | 454 34 | 84   | 436 65 | 84   | 434 700 |
| 5604 | 487 10 | 5608           | 447 42 | 5612 | 435 47 | 5616 | 433 900 |
| 1    | 486 16 | 1              | 447 84 | 1    | 434 87 | 1    | 438 760 |
| 9    | 484 79 | 9              | 447 70 | 9    | 435 26 | 9    | 442 340 |
| 21   | 486 46 | 21             | 447 63 | 21   | 435 10 | 21   | 439 390 |
| 25   | 486 07 | 25             | 447 31 | 25   | 435 38 | 25   | 440 790 |
| 56   | 487 97 | 56             | 447 59 | 56   | 435 08 | 56   | 438 680 |
| 60   | 487 40 | 60             | 447 26 | 60   | 435 54 | 60   | 438 960 |
| 72   | 489 20 | 72             | 447 79 | 72   | 435 43 | 72   | 437 470 |
| 80   | 487 71 | 80             | 447 09 | 80   | 435 59 | 80   | 438 730 |
| 81   | 487 05 | 81             | 447 46 | 81   | 435 42 | 81   | 439 920 |
| 82   | 487 06 | 82             | 447 40 | 82   | 435 39 | 82   | 440 020 |
| 83   | 487 19 | 83             | 447 44 | 83   | 435 49 | 83   | 439 780 |
| 84   | 487 14 | 84             | 447 40 | 84   | 435 50 | 84   | 439 570 |



|                |         |      |         |      |         |
|----------------|---------|------|---------|------|---------|
| 5617           | 449 988 | 5622 | 388 346 | 5627 | 389 650 |
| 1              | 450 540 | 1    | 388 560 | 1    | 389 862 |
| 9              | 451 233 | 9    | 388 160 | 9    | 390 860 |
| 21             | 450 263 | 21   | 388 440 | 21   | 389 740 |
| 25             | 450 663 | 25   | 388 250 | 25   | 390 340 |
| 56             | 449 260 | 56   | 388 920 | 56   | 389 390 |
| 60             | 449 580 | 60   | 388 340 | 60   | 389 970 |
| 72             | 449 300 | 72   | 389 520 | 72   | 388 840 |
| 80 (HAUS 1700) | 449 480 | 80   | 388 210 | 80   | 390 242 |
| 81             | 450 030 | 81   | 388 380 | 81   | 389 770 |
| 82             | 450 030 | 82   | 388 297 | 82   | 389 820 |
| 83             | 449 790 | 83   | 388 410 | 83   | 389 780 |
| 84             | 449 940 | 84   | 388 410 | 84   | 389 830 |
| 5618           | 463 420 | 5623 | 380 792 | 5628 | 408 607 |
| 1              | 464 140 | 1    | 378 970 | 1    | 409 290 |
| 9              | 463 180 | 9    | 379 960 | 9    | 412 410 |
| 21             | 463 690 | 21   | 379 730 | 21   | 408 860 |
| 25             | 463 350 | 25   | 380 640 | 25   | 410 930 |
| 56             | 463 510 | 56   | 380 880 | 56   | 408 040 |
| 60             | 462 960 | 60   | 381 010 | 60   | 408 920 |
| 72             | 463 650 | 72   | 380 770 | 72   | 409 387 |
| 80             | 462 660 | 80   | 380 860 | 80   | 408 820 |
| 81             | 463 520 | 81   | 380 670 | 81   | 408 590 |
| 82             | 463 440 | 82   | 380 790 | 82   | 408 710 |
| 83             | 463 330 | 83   | 380 720 | 83   | 408 480 |
| 84             | 463 290 | 84   | 380 870 | 84   | 408 640 |
| 5619           | 457 340 | 5624 | 379 225 | 5629 | 454 683 |
| 1              | 457 850 | 1    | 378 860 | 1    | 452 900 |
| 9              | 456 230 | 9    | 379 220 | 9    | 458 130 |
| 21             | 457 596 | 21   | 379 070 | 21   | 453 890 |
| 25             | 456 850 | 25   | 379 300 | 25   | 455 980 |
| 56             | 457 630 | 56   | 379 120 | 56   | 449 970 |
| 60             | 456 850 | 60   | 379 250 | 60   | 455 238 |
| 72             | 458 020 | 72   | 379 110 | 72   | 446 130 |
| 80             | 456 750 | 80   | 379 150 | 80   | 455 130 |
| 81             | 457 470 | 81   | 379 200 | 81   | 454 580 |
| 82             | 457 290 | 82   | 379 160 | 82   | 454 650 |
| 83             | 457 350 | 83   | 379 170 | 83   | 454 610 |
| 84             | 457 230 | 84   | 379 150 | 84   | 454 770 |
| 5620           | 430 862 | 5625 | 378 940 | 5630 | 475 930 |
| 1              | 429 420 | 1    | 378 940 | 1    | 476 290 |
| 9              | 430 720 | 9    | 378 960 | 9    | 477 920 |
| 21             | 429 610 | 21   | 379 060 | 21   | 476 840 |
| 25             | 430 580 | 25   | 378 920 | 25   | 476 780 |
| 56             | 429 920 | 56   | 379 020 | 56   | 474 660 |
| 60             | 430 850 | 60   | 378 750 | 60   | 475 130 |
| 72             | 429 910 | 72   | 378 860 | 72   | 473 790 |
| 80             | 432 760 | 80   | 378 860 | 80   | 474 480 |
| 81             | 430 750 | 81   | 378 980 | 81   | 475 970 |
| 82             | 430 870 | 82   | 378 920 | 82   | 475 910 |
| 83             | 430 800 | 83   | 378 940 | 83   | 475 860 |
| 84             | 430 910 | 84   | 378 900 | 84   | 475 910 |
| 5621           | 431 149 | 5626 | 382 790 |      |         |
| 1              | 433 020 | 1    | 381 830 |      |         |
| 9              | 431 050 | 9    | 382 190 |      |         |
| 21             | 432 090 | 21   | 381 890 |      |         |
| 25             | 430 960 | 25   | 383 400 |      |         |
| 56             | 431 550 | 56   | 382 222 |      |         |
| 60             | 430 120 | 60   | 383 162 |      |         |
| 72             | 432 010 | 72   | 382 180 |      |         |
| 80             | 428 980 | 80   | 383 070 |      |         |
| 81             | 431 290 | 81   | 382 722 |      |         |
| 82             | 431 130 | 82   | 382 830 |      |         |
| 83             | 431 080 | 83   | 382 730 |      |         |
| 84             | 431 000 | 84   | 382 860 |      |         |

BOSWIL Nr. 56 - Aufnahme der "Nächst-Topographie" (0-18m) um jede Messstation

Für die Berechnung der "Nächsttopographie-Korrektur" 0-18m um jeden Messpunkt werden die relativen Höhendifferenzen zwischen der Messstation und den 12 "Nächstpunkten" (Anordnung vgl. S. 27 ) bestimmt.

Mess-  
station

"Nächstpunkte" um jede Messstation

Nr.                      Höhendifferenz "Nächstpunkt"-Messstation in m

|       | 1     | 9     | 21    | 25    | 56    | 60    | 72    | 80    | 81    | 82    | 83    | 84    |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 5601* | -2,43 | -4,50 | -1,73 | -1,78 | -0,19 | 0,59  | 0,41  | 5,12  | -0,14 | -0,21 | 0,03  | 0,16  |
| 02    | -3,46 | -6,69 | -1,94 | -3,06 | 2,70  | -0,93 | 5,22  | -1,08 | 0,12  | -0,13 | 0,02  | -0,12 |
| 03    | -0,17 | -4,58 | -0,40 | -2,34 | 2,17  | 0,76  | 42,26 | 0,47  | -0,10 | -0,08 | ±0    | 0,10  |
| 04    | -0,94 | -2,31 | -0,64 | -1,03 | 0,87  | 0,30  | 2,10  | 0,61  | -0,05 | -0,04 | 0,09  | 0,04  |
| 05    | -0,17 | 0,19  | -0,13 | -0,68 | 0,33  | 0,19  | 0,90  | -     | -0,01 | -0,04 | 0,07  | 0,01  |
| 06    | -3,58 | -1,45 | -0,53 | 0,02  | -0,28 | 0,56  | -0,79 | 1,01  | -0,07 | 0,01  | -0,01 | 0,06  |
| 07    | 0,10  | -0,51 | -0,01 | -0,26 | 0,33  | 0,08  | 0,30  | -     | 0,13  | -0,05 | 0,07  | -0,02 |
| 08    | 0,42  | 0,28  | 0,21  | -0,11 | 0,17  | -0,16 | 0,37  | -0,33 | 0,04  | -0,02 | 0,02  | -0,02 |
| 09    | 0,33  | -0,49 | 0,11  | -0,24 | 0,07  | -0,41 | 0,31  | -0,59 | 0,02  | -0,08 | ±0    | -0,08 |
| 10    | -0,39 | -0,41 | -0,33 | -0,16 | -0,27 | -0,42 | -0,34 | -0,62 | 0,02  | ±0    | ±0    | -0,06 |
| 11    | -0,52 | -0,69 | -0,48 | -0,11 | -0,28 | -1,00 | -0,36 | -1,16 | 0,03  | -0,01 | 0,01  | -0,10 |
| 12    | -0,60 | -0,21 | -0,37 | -0,09 | -0,39 | 0,07  | -0,04 | 0,12  | -0,05 | -0,08 | 0,02  | 0,03  |
| 13    | -0,20 | -0,51 | -0,14 | -0,26 | -0,11 | -0,09 | -0,09 | -0,27 | -0,08 | 0,02  | -0,05 | 0,03  |
| 14    | -0,47 | -0,42 | -0,28 | -0,34 | -0,34 | 0,08  | -0,40 | 0,02  | -0,06 | 0,07  | -0,13 | -0,02 |
| 15    | -2,92 | -0,43 | -0,25 | -0,61 | 0,09  | 0,36  | 0,14  | 0,48  | -0,02 | 0,08  | -0,01 | 0,17  |
| 16    | -1,14 | 2,44  | -0,51 | 0,89  | -1,22 | -0,94 | -2,43 | -1,17 | 0,02  | 0,12  | -0,12 | -0,33 |
| 17    | 0,55  | 1,24  | 0,27  | 0,67  | -0,73 | -0,41 | -0,69 | -0,51 | 0,04  | 0,04  | -0,20 | -0,05 |
| 18    | 0,72  | -0,24 | 0,27  | -0,07 | 0,09  | -0,46 | 0,23  | -0,76 | 0,10  | 0,02  | -0,09 | -0,13 |
| 19    | 0,51  | -1,11 | 0,26  | -0,49 | 0,29  | -0,49 | 0,68  | -0,59 | 0,13  | -0,05 | 0,01  | -0,11 |
| 20    | -1,44 | -0,14 | -1,25 | -0,28 | -0,94 | -0,01 | -0,95 | 1,90  | -0,11 | 0,01  | -0,06 | 0,05  |
| 21    | 1,87  | -0,10 | 0,94  | -0,19 | 0,40  | -1,03 | 0,86  | -2,17 | 0,14  | -0,02 | -0,07 | -0,15 |
| 22    | 0,21  | -0,19 | 0,09  | -0,10 | 0,57  | -0,01 | 1,17  | -0,14 | 0,03  | -0,05 | 0,06  | 0,06  |
| 23    | -1,82 | -0,83 | -1,06 | -0,15 | 0,09  | 0,22  | -0,02 | 0,07  | -0,12 | ±0    | -0,07 | 0,08  |
| 24    | -0,37 | -0,01 | -0,16 | 0,07  | -0,11 | 0,02  | -0,12 | -0,08 | -0,03 | -0,07 | -0,06 | -0,08 |
| 25    | ±0    | 0,02  | 0,12  | -0,02 | 0,08  | -0,19 | -0,08 | -0,08 | 0,04  | -0,02 | ±0    | -0,04 |
| 26    | -0,96 | -0,60 | -0,90 | 0,61  | -0,57 | 0,39  | -0,61 | 0,28  | -0,07 | 0,04  | -0,06 | 0,07  |
| 27    | 0,21  | 1,21  | 0,09  | 0,69  | -0,26 | 0,32  | -0,81 | 0,59  | 0,12  | 0,17  | 0,13  | 0,18  |
| 28    | 0,68  | 3,80  | 0,25  | 2,32  | -0,57 | 0,31  | 0,78  | 0,21  | -0,02 | 0,10  | -0,13 | 0,03  |
| 29    | -1,78 | 3,45  | -0,79 | 1,30  | -4,71 | 0,56  | -8,55 | 0,45  | -0,10 | -0,03 | -0,07 | 0,09  |
| 30    | 0,46  | 2,09  | 1,01  | 0,95  | -1,17 | -0,70 | -2,04 | -1,35 | 0,14  | 0,08  | 0,03  | 0,08  |
|       | 1     | 9     | 21    | 25    | 56    | 60    | 72    | 80    | 81    | 82    | 83    | 84    |

\* Beispiel Lochkarte vgl. nächste Seite

Beispiel Lochkartenerfassung der Nächsttopographie 0 - 18 m

5601

6652811.238295. 579.11

Statement  
Number

Identification

FORTRAN  
RZ ETH  
ZÜRICH

RDV-F30 7


[illegible][illegible]

# BOSWIL Nr. 56 - Aufnahme der "Nah-Topographie" (18m - 2500m) um die Messstationen

Die Korrekturberechnungen der sog. Nahtopographieeinflüsse 18m - 2500m erfolgen auf Grund von digitalisierten Höhenangaben der Region um den Messpunkt. Dabei wird das Gebiet bis 2,5 km Abstand vom Messpunkt erfasst.

Die Topographiedaten werden quadratkilometerweise bestimmt (vgl. S. 29 ).

Für die 30 Messpunkte des Profils Boswil Nr. 56 mussten für die Korrektur der Nahtopographie folgende Quadratkilometer höhenmässig erfasst und digitalisiert werden:



Die mittleren Höhen der hundert einzelnen Felder jedes Quadratkilometers werden in ein vom Institut für Geophysik ETH vorbereitetes Blatt eingetragen. Dabei ist die Lage des  $\text{km}^2$  durch eine Koordinatenangabe (linke obere Ecke des  $\text{km}^2$ ) fixiert.

Liegt ein See im Gebiet des Quadratkilometers, wird die Höhe des Seegrundes markiert, dazu aber in der obersten Linie des Auszählblattes die Höhe des Seespiegels angegeben, damit die Wassermassen mit Dichte  $1\text{g}/\text{cm}^3$  ebenfalls für die Korrektur berücksichtigt werden.



669

241

1010

[illegible]

BDV 23

457, 463, 469, 445, 437, 424, 401, 388, 384, 360.

ments

[illegible]

22


400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

4

[illegible]

32 A38

# Höhenmässig ausgezählte Quadratkilometer des gesamten Untersuchungsgebietes




Kartenausschnitt  
 1:200.000,  
 reproduziert mit Bewilligung der Eidg.  
 Landestopographie, vom 28. Juni 1982

Auszug aus dem Feldbuch: Messarbeiten mit dem Worden-Gravimeter  
Profil Boswil Nr. 56

Dienstag, 21. April 1981

| Messstation                  | Skalenteile | Zeit  | Temp.<br>°C | Instr. Höhe<br>cm             |
|------------------------------|-------------|-------|-------------|-------------------------------|
| Amlehn                       | 16.00       | 08.50 | 6           | 9,5                           |
| 6220                         | 62.85       | 09.42 | 7,5         | 8                             |
| Verstellen des Messbereiches |             |       |             |                               |
| 6220                         | 33.66       | 09.48 | 7,5         | 8                             |
| 5505                         | 38.78       | 10.14 | 8           | 9,5                           |
| 5606                         | 46.41       | 10.25 | 8           | 9                             |
| 5604                         | 40.94       | 10.38 | 8           | 8,5                           |
| 5603                         | 33.55       | 10.46 | 8           | 9                             |
| 5602                         | 25.47       | 10.54 | 8,5         | 9,2                           |
| 5601                         | 21.17       | 11.04 | 7,5         | 9                             |
| 5605                         | 45.17       | 11.19 | 10,5        | 9                             |
| 5606                         | 46.46       | 11.25 | 10          | 9,5                           |
| 5607                         | 49.19       | 11.33 | 11          | 9,5                           |
| 5608                         | 50.92       | 11.40 | 11          | 9,5                           |
| 5609                         | 51.66       | 12.02 | 12          | 27,5                          |
| 5610                         | 52.38       | 12.08 | 11,5        | 9,5                           |
| 5606                         | 46.66       | 12.20 | 12,5        | 9,5                           |
| 5610                         | 52.68       | 13.15 | 12,5        | 9                             |
| 5611                         | 52.95       | 13.21 | 13,5        | 9                             |
| 5612                         | 52.77       | 13.30 | 13          | 34,5                          |
| 5613                         | 52.75       | 13.43 | 13          | 26                            |
| 5610                         | 52.77       | 13.52 | 13          | 10                            |
| 5614                         | 53.04       | 14.15 | 14          | 30                            |
| 5615                         | 53.04       | 14.40 | 14          | 31                            |
| 5616                         | 51.92       | 14.50 | 14,5        | 9,5                           |
| 5610                         | 52.99       | 15.00 | 15          | 9,5                           |
| 5617                         | 49.80       | 15.17 | 15          | 8,5                           |
| 5618                         | 47.05       | 15.33 | 13          | 31                            |
| 5619                         | 48.03       | 15.45 | 14          | 33                            |
| 5616                         | 51.91       | 15.53 | 15          | 9,5                           |
| 5620                         | 53.17       | 16.20 | 15          | 9                             |
| 5621                         | 53.32       | 16.30 | 13          | 33                            |
| 5622                         | 62.35       | 16.44 | 12,5        | 27,5                          |
| 5623                         | 63.43       | 16.53 | 14,5        | 32                            |
| 5620                         | 53.04       | 17.03 | 14          | 9,5                           |
| 5624                         | 63.36       | 17.16 | 15          | 34,7                          |
| 5625                         | 63.63       | 17.25 | 14,5        | 24,5                          |
| 5626                         | 63.20       | 17.45 | 15          | 30                            |
| 5620                         | 52.98       | 18.00 | 13,5        | 9,5                           |
| 5627                         | 62.43       | 18.35 | 15,5        | 28                            |
| 5628                         | 60.20       | 18.45 | 14          | 9,5                           |
| 5629                         | 51.02       | 19.00 | 12,5        | 9                             |
| 5630                         | 46.91       | 19.13 | 12          | 9,5                           |
| 5620                         | 52.96       | 19.24 | 9           | 9,5                           |
| 5610                         | 52.74       | 19.36 | 12,5        | 9,5                           |
| 5606 ca.                     | ca. 46.79   | 19.44 | 9           | ca. 13 (Auto auf Messstation) |
| 5505                         | 39.24       | 19.54 | 10,5        | 9,5                           |
| 6220                         | 34.00       | 20.14 | 9           | 8,5                           |

Der Umrechnungsfaktor von "Skalenteilen" auf "mgal" beträgt beim Worden-Gravimeter 0,971.



## Profil Boswil Nr. 56

Gezeiten- und Instrumentendriftkorrektur  
ausgeführt am 6. August 1981, kontrolliert am  
12. Oktober 1981

BOSWIL Nr. 56 - Umrechnung der Relativwerte auf absolute  
Schwerewerte  $g_{b+k}$

Ausgangsstation war der Basispunkt 1. Ordnung 6220, bei dem die absolute Schwerebeschleunigung 980647,91 mgal beträgt.

| Mess-<br>station | rel. Ablesung<br>korrigiert<br>in mgal<br>(vgl. S. 43) | Differenz<br>zur Sta-<br>tion 6220<br>mgal | $g_{b+k}$<br>auf Mess-<br>instrum.<br>höhe in<br>mgal | Korrektur<br>der Sta-<br>tivhöhe<br>mgal | $g_{b+k}$<br>der Mess-<br>station<br>in mgal |
|------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Amlehn           | 15.48-28.34                                            | -45.55                                     | 602.34                                                | 0.03                                     | 602.37                                       |
| 6220             | 32.69                                                  | 0.00                                       | 647.89                                                | 0.02                                     | 647.91                                       |
| 5505             | 37.66                                                  | + 4.97                                     | 652.86                                                | 0.03                                     | 652.89                                       |
| 5601             | 20.52                                                  | -12.16                                     | 635.73                                                | 0.03                                     | 635.76                                       |
| 5602             | 24.72                                                  | - 7.97                                     | 639.92                                                | 0.03                                     | 639.95                                       |
| 5603             | 32.57                                                  | - 0.12                                     | 647.77                                                | 0.03                                     | 647.80                                       |
| 5604             | 39.74                                                  | + 7.05                                     | 654.94                                                | 0.03                                     | 654.97                                       |
| 5605             | 43.82                                                  | +11.13                                     | 659.02                                                | 0.03                                     | 659.05                                       |
| 5606             | 45.07                                                  | +12.38                                     | 660.27                                                | 0.03                                     | 660.30                                       |
| 5607             | 47.69                                                  | +15.00                                     | 662.89                                                | 0.03                                     | 662.92                                       |
| 5608             | 49.36                                                  | +16.67                                     | 664.56                                                | 0.03                                     | 664.59                                       |
| 5609             | 50.01                                                  | +17.32                                     | 665.21                                                | 0.09                                     | 665.30                                       |
| 5610             | 50.67                                                  | +17.98                                     | 665.87                                                | 0.03                                     | 665.90                                       |
| 5611             | 50.91                                                  | +18.22                                     | 666.11                                                | 0.03                                     | 666.14                                       |
| 5612             | 50.70                                                  | +18.01                                     | 665.90                                                | 0.11                                     | 666.01                                       |
| 5613             | 50.65                                                  | +17.96                                     | 665.85                                                | 0.08                                     | 665.93                                       |
| 5614             | 50.86                                                  | +18.17                                     | 666.06                                                | 0.09                                     | 666.15                                       |
| 5615             | 50.78                                                  | +18.09                                     | 665.98                                                | 0.10                                     | 666.08                                       |
| 5616             | 49.66                                                  | +16.97                                     | 664.86                                                | 0.03                                     | 664.89                                       |
| 5617             | 47.56                                                  | +14.87                                     | 662.76                                                | 0.03                                     | 662.79                                       |
| 5618             | 44.89                                                  | +12.20                                     | 660.09                                                | 0.10                                     | 660.19                                       |
| 5619             | 45.87                                                  | +13.18                                     | 661.07                                                | 0.10                                     | 661.17                                       |
| 5620             | 50.97                                                  | +18.28                                     | 666.17                                                | 0.03                                     | 666.20                                       |
| 5621             | 51.17                                                  | +18.48                                     | 666.37                                                | 0.10                                     | 666.47                                       |
| 5622             | 59.95                                                  | +27.26                                     | 675.15                                                | 0.09                                     | 675.24                                       |
| 5623             | 61.02                                                  | +28.33                                     | 676.22                                                | 0.10                                     | 676.32                                       |
| 5624             | 61.00                                                  | +28.31                                     | 676.20                                                | 0.11                                     | 676.31                                       |
| 5625             | 61.28                                                  | +28.59                                     | 676.48                                                | 0.08                                     | 676.56                                       |
| 5626             | 60.88                                                  | +28.19                                     | 676.08                                                | 0.09                                     | 676.17                                       |
| 5627             | 60.15                                                  | +27.46                                     | 675.35                                                | 0.09                                     | 675.44                                       |
| 5628             | 58.00                                                  | +25.31                                     | 673.20                                                | 0.03                                     | 673.23                                       |
| 5629             | 49.09                                                  | +16.40                                     | 664.29                                                | 0.03                                     | 664.32                                       |
| 5630             | 45.10                                                  | +12.41                                     | 660.30                                                | 0.03                                     | 660.33                                       |

BOSWIL Nr. 56 - Zusammenstellung der Messpunktdaten, die dem Computer eingegeben werden

| Messstation | Koordinaten     | Höhenangabe<br>müM | $g_{b+k}$<br>in mgal |
|-------------|-----------------|--------------------|----------------------|
| 5601 *      | 665280/238295 * | 579.01 *           | 635.76 *             |
| 5602 *      | 665380/238410 * | 558.91 *           | 639.95 *             |
| 5603 *      | 665460/238530 * | 521.87 *           | 647.80 *             |
| 5604        | 665610/238610   | 487.10             | 654.97               |
| 5605        | 665740/238870   | 471.26             | 659.05               |
| 5606        | 666040/239070   | 467.27             | 660.30               |
| 5607        | 666255/239185   | 454.36             | 662.92               |
| 5608        | 666480/239370   | 447.42             | 664.59               |
| 5609        | 666740/239490   | 441.12             | 665.30               |
| 6510        | 666980/239630   | 437.44             | 665.90               |
| 5611        | 667180/239730   | 436.75             | 666.14               |
| 5612        | 667375/239820   | 435.47             | 666.01               |
| 5613        | 667570/239935   | 434.63             | 665.93               |
| 5614        | 667760/240070   | 434.50             | 666.15               |
| 5615        | 667990/240185   | 434.53             | 666.08               |
| 5616        | 668270/240390   | 439.90             | 664.89               |
| 5617        | 668485/240490   | 449.99             | 662.79               |
| 5618        | 668800/240745   | 463.42             | 660.19               |
| 5619        | 669080/240850   | 457.34             | 661.17               |
| 5620        | 669230/240920   | 430.86             | 666.20               |
| 5621        | 669470/241000   | 431.15             | 666.47               |
| 5622        | 669680/241115   | 388.35             | 675.24               |
| 5623        | 669950/241250   | 380.79             | 676.32               |
| 5624        | 670250/241430   | 379.23             | 676.31               |
| 5625        | 670470/241560   | 378.94             | 676.56               |
| 5626        | 670840/241675   | 382.79             | 676.17               |
| 5627        | 670945/241775   | 389.65             | 675.44               |
| 5628        | 671140/241930   | 408.61             | 673.23               |
| 5629        | 671400/242090   | 454.68             | 664.32               |
| 5630        | 671570/242165   | 475.83             | 660.33               |

\* Beispiel Lochkarten vgl. nächste Seite

**FORTRAN  
RZ ETH  
ZÜRICH**

FORTRAN  
RZ ETH  
ZÜRICH


FORTRAN  
RZ ETH  
ZÜRICH

Die Bouguer-Anomalien wurden am Institut für Geophysik ETHZ analog der Arbeit "Die neue Schwere-Karte der Schweiz (Bouguer-Anomalien von Klingelé und Olivier(1980) berechnet. Dazu wurden die gleichen Basisstationen benützt, so dass die Daten kompatibel sind.

# Profil BOSWIL Nr. 56 - Schlussergebnisse

| Mess-Station | Koordinaten    | müM    | $g_{b+k}$<br>-980000<br>in mgal | Topo-<br>graphie-<br>korrek-<br>tur | Bouguer-<br>Anomalie<br>in mgal | Residual-<br>Anomalie<br>in mgal |
|--------------|----------------|--------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| 5601         | 238295.665280. | 579.01 | 635.760                         | .800                                | -83.133                         | - 0.7                            |
| 5602         | 238410.665380. | 558.91 | 639.950                         | .930                                | -82.959                         | - 0.6                            |
| 5603         | 238530.665460. | 521.87 | 647.800                         | .970                                | -82.592                         | - 0.4                            |
| 5604         | 238610.665610. | 437.10 | 654.970                         | .880                                | -82.503                         | - 0.3                            |
| 5605         | 238870.665740. | 471.26 | 659.050                         | .760                                | -81.917                         | 0.0                              |
| 5606         | 239070.666040. | 467.27 | 660.300                         | .390                                | -82.016                         | 0.0                              |
| 5607         | 239185.666255. | 454.36 | 662.920                         | .250                                | -82.197                         | - 0.2                            |
| 5608         | 239370.666480. | 447.42 | 664.590                         | .150                                | -82.173                         | - 0.1                            |
| 5609         | 239490.666740. | 441.12 | 665.300                         | .110                                | -82.859                         | - 0.8                            |
| 5610         | 239630.666980. | 437.44 | 665.900                         | .060                                | -83.181                         | - 1.0                            |
| 5611         | 239730.667180. | 436.75 | 666.140                         | .040                                | -83.190                         | - 1.1                            |
| 5612         | 239820.667375. | 435.47 | 666.010                         | .030                                | -83.675                         | - 1.5                            |
| 5613         | 239935.667570. | 434.63 | 665.930                         | .020                                | -84.038                         | - 1.8                            |
| 5614         | 240070.667760. | 434.50 | 666.150                         | .030                                | -83.956                         | - 1.8                            |
| 5615         | 240185.667990. | 434.53 | 666.080                         | .040                                | -84.116                         | - 1.9                            |
| 5616         | 240390.668270. | 439.90 | 664.890                         | .080                                | -84.384                         | - 2.1                            |
| 5617         | 240490.668485. | 449.99 | 662.790                         | .080                                | -84.561                         | - 2.3                            |
| 5618         | 240745.668800. | 463.42 | 660.190                         | .150                                | -84.636                         | - 2.3                            |
| 5619         | 240850.669080. | 457.34 | 661.170                         | .280                                | -84.813                         | - 2.5                            |
| 5620         | 240920.669230. | 430.86 | 666.200                         | .230                                | -85.163                         | - 2.8                            |
| 5621         | 241000.669470. | 431.15 | 666.470                         | .320                                | -84.806                         | - 2.4                            |
| 5622         | 241115.669680. | 388.35 | 675.240                         | .350                                | -84.539                         | - 2.1                            |
| 5623         | 241250.669950. | 380.79 | 676.320                         | .150                                | -85.240                         | - 2.7                            |
| 5624         | 241430.670250. | 379.23 | 676.310                         | .130                                | -85.716                         | - 3.2                            |
| 5625         | 241560.670470. | 373.94 | 676.560                         | .160                                | -85.590                         | - 3.0                            |
| 5626         | 241675.670840. | 382.79 | 676.170                         | .320                                | -85.143                         | - 2.6                            |
| 5627         | 241775.670945. | 389.65 | 675.440                         | .410                                | -84.511                         | - 1.9                            |
| 5628         | 241930.671140. | 408.61 | 673.230                         | .530                                | -82.943                         | - 0.3                            |
| 5629         | 242090.671400. | 454.68 | 664.320                         | .780                                | -82.675                         | 0.0                              |
| 5630         | 242165.671570. | 475.83 | 660.330                         | .600                                | -82.674                         | 0.0                              |

Bestimmung der negativen Schwereanomalien in der Profilachse (Residualanomalien)



#### 4.4.6 Ergebnisse der Gravimetriemessungen

##### Profil Eschenbach Nr. 63


| Mess-Station | Koordinaten    | müM    | $g_{b+k}$<br>-980000<br>in mgal | Topo-<br>graphie-<br>korrek-<br>tur | Bouguer-<br>Anomalie<br>in mgal | Residual-<br>Anomalie<br>in mgal |
|--------------|----------------|--------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| 6301         | 218870.667135. | 425.85 | 633.100                         | .107-103.857                        |                                 | 0.0                              |
| 6302         | 218590.666960. | 439.10 | 630.050                         | .107-104.165                        |                                 | - 0.1                            |
| 6303         | 218240.667270. | 418.62 | 633.120                         | .096-104.649                        |                                 | 0.0                              |
| 6304         | 217955.667480. | 418.39 | 631.930                         | .032-105.676                        |                                 | - 0.5                            |
| 6305         | 217535.667445. | 418.70 | 630.780                         | .021-106.412                        |                                 | - 0.7                            |
| 6306         | 217325.667550. | 418.81 | 630.340                         | .021-106.627                        |                                 | - 0.6                            |
| 6307         | 216940.667605. | 420.06 | 629.130                         | .021-107.263                        |                                 | - 0.6                            |
| 6308         | 216885.667380. | 419.19 | 628.920                         | .032-107.555                        |                                 | - 0.6                            |
| 6309         | 216860.668200. | 419.43 | 628.820                         | .043-107.557                        |                                 | - 0.3                            |
| 6310         | 216675.668390. | 420.28 | 628.080                         | .107-107.897                        |                                 | - 0.1                            |
| 6311         | 216390.668570. | 445.29 | 622.480                         | .224-108.390                        |                                 | 0.0                              |

Testprofil Rifferswil (mit Dichte  $2,67 \text{ g/cm}^3$  gerechnet) mit  
"Nummerierung" von West nach Ost


|      |               |       |        |         |       |
|------|---------------|-------|--------|---------|-------|
| 6225 | 227200.672230 | 417.0 | 646.12 | - 97.29 | 0.0   |
| 6224 | 227280.672530 | 411.9 | 646.93 | - 97.56 | 0.0   |
| 6223 | 227240.672880 | 398.2 | 649.23 | - 97.88 | - 0.2 |
| 6222 | 227240.673200 | 395.4 | 649.12 | - 98.56 | - 0.7 |
| 6221 | 227250.673420 | 395.6 | 648.62 | - 99.04 | - 1.0 |
| 6220 | 227430.673660 | 396.6 | 647.87 | - 99.77 | - 1.8 |
| 6219 | 227500.673970 | 396.9 | 647.15 | -100.49 | - 2.2 |
| 6218 | 227540.674240 | 396.7 | 647.29 | -100.42 | - 2.0 |
| 6226 | 227680.674510 | 396.8 | 647.81 | -100.00 | - 1.5 |
| 6217 | 227775.674700 | 398.9 | 648.35 | - 99.13 | - 0.4 |
| 6216 | 227920.675170 | 409.0 | 646.68 | - 98.96 | - 0.1 |
| 6215 | 228180.676080 | 431.9 | 642.07 | - 99.29 | 0.0   |
| 6214 | 228530.676450 | 436.3 | 641.90 | - 99.06 | + 0.1 |
| 6213 | 228900.676720 | 436.8 | 642.22 | - 98.95 | + 0.1 |
| 6212 | 229180.676880 | 438.3 | 642.31 | - 98.78 | + 0.1 |
| 6211 | 229510.677130 | 446.6 | 640.63 | - 98.96 | - 0.1 |
| 6210 | 229615.677450 | 450.1 | 639.83 | - 99.33 | - 0.6 |
| 6209 | 229980.677717 | 459.6 | 637.46 | -100.16 | - 1.5 |
| 6208 | 230400.677870 | 436.0 | 642.50 | - 99.91 | - 1.4 |
| 6207 | 230720.678190 | 456.6 | 638.51 | -100.19 | - 1.8 |
| 6206 | 231175.678640 | 479.1 | 635.55 | - 99.11 | - 1.0 |
| 6205 | 231530.678750 | 496.3 | 633.78 | - 98.04 | 0.0   |
| 6204 | 231710.679110 | 504.3 | 632.38 | - 98.01 | - 0.1 |
| 6203 | 232125.679320 | 527.7 | 628.20 | - 98.09 | - 0.3 |
| 6202 | 232610.679570 | 559.4 | 623.01 | - 97.59 | 0.0   |
| 6201 | 232950.679900 | 589.4 | 617.08 | - 97.98 | - 0.4 |

# Profil Rifferswil Nr. 62

## Bestimmung der negativen Schwereanomalie



Profil 1:50'000 / 1:5'000



Profil Mühlau Nr. 54

| Mess-<br>Station | Koordinaten    | müM    | $g_{b+k}$<br>-980000<br>in mgal | Topo-<br>graphie-<br>korrek-<br>tur | Bouguer-<br>Anomalie<br>in mgal | Residual-<br>Anomalie<br>in mgal |
|------------------|----------------|--------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| 5401             | 231045.671730. | 443.82 | 647.290                         | .288                                | -96.310                         | 0.0                              |
| 5402             | 231370.671820. | 408.08 | 654.710                         | .577                                | -95.668                         | + 0.3                            |
| 5403             | 231425.672110. | 392.17 | 657.090                         | .214                                | -96.710                         | - 0.3                            |
| 5404             | 231470.672420. | 389.25 | 656.310                         | .096                                | -98.228                         | - 1.9                            |
| 5405             | 231540.672755. | 389.06 | 655.310                         | .043                                | -99.382                         | - 2.9                            |
| 5406             | 231835.673075. | 389.00 | 655.510                         | .021                                | -99.480                         | - 3.1                            |
| 5407             | 232060.673310. | 388.32 | 656.260                         | .021                                | -99.053                         | - 2.7                            |
| 5408             | 232285.673490. | 388.15 | 657.280                         | .032                                | -98.247                         | - 2.0                            |
| 5409             | 232560.673700. | 387.73 | 657.600                         | .043                                | -98.229                         | - 2.1                            |
| 5410             | 232800.673820. | 387.53 | 658.290                         | .075                                | -97.746                         | - 1.8                            |
| 5411             | 232910.674190. | 411.59 | 654.340                         | .224                                | -97.068                         | - 1.0                            |
| 5412             | 232945.674435. | 428.93 | 651.470                         | .139                                | -96.754                         | - 0.5                            |
| 5413             | 233210.674760. | 441.86 | 649.530                         | .139                                | -96.435                         | - 0.3                            |
| 5414             | 233320.675000. | 462.70 | 645.280                         | .160                                | -96.763                         | - 0.5                            |
| 5415             | 233390.675220. | 458.34 | 646.330                         | .107                                | -96.645                         | - 0.4                            |
| 5416             | 233550.675525. | 434.55 | 651.120                         | .117                                | -96.498                         | - 0.2                            |
| 5417             | 233640.675825. | 436.88 | 650.860                         | .107                                | -96.382                         | + 0.2                            |
| 5418             | 233670.676125. | 448.20 | 648.510                         | .139                                | -96.546                         | 0.0                              |
| 5420             | 234045.676635. | 478.90 | 642.520                         | .256                                | -96.847                         | - 0.3                            |
| 5421             | 234155.676780. | 486.92 | 641.000                         | .278                                | -96.896                         | - 0.3                            |
| 5422             | 234220.676965. | 504.09 | 637.600                         | .288                                | -97.034                         | - 0.4                            |

Profil Muri Nr. 55

|      |                |        |         |      |         |       |
|------|----------------|--------|---------|------|---------|-------|
| 5501 | 235450.667210. | 570.15 | 630.760 | .577 | -91.840 | - 0.5 |
| 5502 | 235890.667630. | 498.74 | 645.710 | .630 | -90.956 | 0.0   |
| 5503 | 235990.667845. | 486.90 | 648.360 | .363 | -90.946 | + 0.1 |
| 5504 | 236090.668060. | 492.15 | 647.120 | .374 | -91.269 | - 0.5 |
| 5505 | 236230.668220. | 464.16 | 652.930 | .331 | -90.973 | - 0.3 |
| 5506 | 236470.668455. | 458.30 | 654.120 | .139 | -91.330 | - 0.7 |
| 5507 | 236615.668780. | 462.69 | 653.160 | .096 | -91.657 | - 1.1 |
| 5508 | 236760.669015. | 463.07 | 652.750 | .128 | -92.097 | - 1.6 |
| 5509 | 236870.669260. | 464.33 | 652.020 | .224 | -92.606 | - 2.1 |
| 5510 | 237130.669510. | 443.45 | 656.280 | .203 | -92.598 | - 2.3 |
| 5511 | 237310.669740. | 415.49 | 662.080 | .182 | -92.312 | - 2.1 |
| 5512 | 237510.669895. | 402.05 | 664.870 | .214 | -92.208 | - 2.2 |
| 5513 | 237770.670145. | 388.31 | 667.520 | .117 | -92.489 | - 2.6 |
| 5514 | 238075.670425. | 382.95 | 668.530 | .096 | -92.775 | - 3.1 |
| 5515 | 238230.670730. | 381.36 | 668.690 | .043 | -93.114 | - 3.6 |
| 5516 | 238475.670960. | 381.39 | 668.740 | .032 | -93.273 | - 3.8 |
| 5517 | 238660.671150. | 381.95 | 668.870 | .043 | -93.180 | - 3.9 |
| 5518 | 238710.671590. | 387.52 | 668.780 | .075 | -92.208 | - 2.8 |
| 5519 | 238830.671780. | 390.96 | 669.720 | .085 | -90.694 | - 1.3 |
| 5520 | 238890.672230. | 397.55 | 669.430 | .235 | -89.623 | 0.0   |
| 5521 | 238985.672500. | 404.28 | 668.250 | .491 | -89.342 | + 0.2 |
| 5522 | 239130.672640. | 405.84 | 667.910 | .566 | -89.428 | + 0.1 |
| 5523 | 239530.672780. | 425.44 | 664.600 | .534 | -89.365 | - 0.1 |
| 5524 | 239610.672980. | 454.14 | 659.060 | .662 | -89.377 | - 0.2 |
| 5525 | 239670.673330. | 472.24 | 654.980 | .417 | -90.269 | - 0.8 |

Profil Küssnacht Nr. 50


| Mess-<br>Station | Koordinaten    | müM    | $g_{b+k}$<br>-980000<br>in mgal | Topo-<br>graphie-<br>korrek-<br>tur | Bouguer-<br>Anomalie<br>in mgal | Residual-<br>Anomalie<br>in mgal |
|------------------|----------------|--------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| 5002             | 216280.676490. | 512.73 | 601.260                         | 1.036-114.937                       |                                 | 0.0                              |
| 5003             | 216110.676460. | 508.55 | 601.600                         | 1.538-114.680                       |                                 | - 0.1                            |
| 5004             | 215820.676500. | 438.29 | 613.730                         | .876-115.848                        |                                 | - 0.5                            |
| 5005             | 215590.676380. | 447.20 | 611.470                         | .726-116.352                        |                                 | - 0.8                            |
| 5006             | 215410.676365. | 450.48 | 610.060                         | .801-116.836                        |                                 | - 1.0                            |
| 5007             | 215150.676355. | 452.32 | 608.270                         | 1.089-117.646                       |                                 | - 1.6                            |
| 5008             | 214880.676360. | 467.33 | 603.700                         | 1.581-118.595                       |                                 | - 2.3                            |
| 5009             | 214590.676230. | 467.83 | 602.900                         | 1.933-118.591                       |                                 | - 2.0                            |
| 5010             | 214240.676160. | 489.41 | 597.840                         | 1.752-119.408                       |                                 | - 2.5                            |
| 5011             | 213930.676180. | 501.78 | 594.820                         | 2.200-119.315                       |                                 | - 2.1                            |
| 5012             | 213700.676210. | 517.47 | 591.760                         | 2.691-118.689                       |                                 | - 1.3                            |
| 5013             | 213480.675900. | 479.51 | 599.080                         | 2.873-118.083                       |                                 | - 0.6                            |
| 5014             | 213055.675880. | 523.77 | 590.420                         | 3.567-117.392                       |                                 | + 0.2                            |
| 5081             | 215890.676790. | 448.53 | 611.310                         | 1.196-116.038                       |                                 |                                  |
| 5082             | 216230.677180. | 474.52 | 607.410                         | .641-115.996                        |                                 |                                  |
| 5083             | 216300.677360. | 469.82 | 608.120                         | .716-116.141                        |                                 |                                  |

Profil Immensee Nr. 51


|      |                |        |         |               |  |       |
|------|----------------|--------|---------|---------------|--|-------|
| 5101 | 220565.677740. | 443.07 | 624.340 | .886-109.317  |  | 0.0   |
| 5102 | 220410.677620. | 443.23 | 624.220 | .662-109.493  |  | 0.0   |
| 5103 | 220275.677565. | 442.50 | 624.080 | .555-109.758  |  | 0.0   |
| 5104 | 220010.677630. | 430.98 | 625.370 | .555-110.365  |  | - 0.2 |
| 5105 | 219835.677620. | 427.32 | 625.690 | .449-110.656  |  | - 0.2 |
| 5106 | 219680.677670. | 427.32 | 625.250 | .459-110.933  |  | - 0.3 |
| 5107 | 219415.677660. | 430.27 | 624.050 | .481-111.302  |  | - 0.3 |
| 5108 | 219265.677660. | 433.28 | 623.100 | .417-111.572  |  | - 0.4 |
| 5109 | 218985.677735. | 421.56 | 624.550 | .406-112.023  |  | - 0.5 |
| 5110 | 218880.677745. | 419.73 | 624.900 | .406-111.891  |  | - 0.2 |
| 5111 | 218750.677780. | 420.83 | 624.630 | .513-111.706  |  | 0.0   |
| 5112 | 218555.677760. | 449.82 | 617.790 | .844-112.593  |  | - 0.3 |
| 5113 | 218355.677730. | 465.44 | 614.480 | .940-112.662  |  | - 0.2 |
| 5114 | 217535.677540. | 519.26 | 602.340 | 1.260-113.473 |  | - 0.1 |
| 5115 | 217390.677480. | 487.21 | 608.570 | .972-113.422  |  | 0.0   |
| 5116 | 217200.677590. | 482.15 | 609.040 | .972-113.674  |  | 0.0   |
| 5117 | 217020.677635. | 453.98 | 613.910 | .897-113.912  |  | 0.0   |
| 5118 | 216830.677730. | 421.26 | 619.530 | .897-114.116  |  | 0.0   |
| 5119 | 216570.677720. | 427.75 | 616.780 | .951-115.297  |  | - 1.0 |
| 5120 | 216490.677810. | 430.15 | 615.500 | 1.164-115.803 |  | - 1.4 |
| 5121 | 216260.677885. | 423.25 | 615.670 | 1.613-116.114 |  | - 1.5 |
| 5122 | 216115.678035. | 423.93 | 614.220 | 2.136-116.631 |  | - 1.7 |
| 5123 | 215930.678130. | 424.87 | 613.200 | 2.862-116.442 |  | - 1.3 |
| 5124 | 215595.678365. | 433.56 | 610.110 | 3.834-116.353 |  | - 0.9 |
| 5125 | 215330.678735. | 445.21 | 606.880 | 3.984-116.717 |  | - 0.8 |
| 5126 | 214970.678900. | 461.25 | 601.920 | 6.461-115.743 |  | + 0.3 |

# **Profil Immensee Nr. 51**

Bestimmung der negativen Schwereanomalie



## **Profil 1:50'000/1:5000**



Profil Sursee Nr. 60

| Mess-Station | Koordinaten    | müM    | $g_{b+k}$<br>-980000<br>in mgal | Topo-<br>graphie-<br>korrek-<br>tur | Bouguer-<br>Anomalie<br>in mgal | Residual-<br>Anomalie<br>in mgal |
|--------------|----------------|--------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| 6001         | 223610.649840. | 569.56 | 616.820                         | .566                                | -96.531                         | - 1.0                            |
| 6002         | 223695.649930. | 558.32 | 619.500                         | .342                                | -96.313                         | - 0.9                            |
| 6003         | 223890.650160. | 539.10 | 623.240                         | .363                                | -96.381                         | - 0.9                            |
| 6004         | 224125.650300. | 507.36 | 630.300                         | .160                                | -95.762                         | - 0.5                            |
| 6005         | 224280.650480. | 505.81 | 630.690                         | .075                                | -95.866                         | - 0.6                            |
| 6006         | 224410.650690. | 506.87 | 630.640                         | .043                                | -95.845                         | - 0.7                            |
| 6007         | 224545.650900. | 498.82 | 632.050                         | .043                                | -96.052                         | - 0.9                            |
| 6008         | 224745.651080. | 505.18 | 630.380                         | .053                                | -96.669                         | - 1.6                            |
| 6009         | 224925.651270. | 506.10 | 629.980                         | .043                                | -97.032                         | - 2.0                            |
| 6010         | 225050.651420. | 504.81 | 630.160                         | .075                                | -97.162                         | - 2.1                            |
| 6011         | 225250.651670. | 505.56 | 630.210                         | .128                                | -97.071                         | - 2.1                            |
| 6012         | 225355.652010. | 511.49 | 629.490                         | .203                                | -96.654                         | - 1.6                            |
| 6013         | 225455.652270. | 516.83 | 629.070                         | .299                                | -96.030                         | - 0.9                            |
| 6014         | 225590.652530. | 526.34 | 628.060                         | .491                                | -95.154                         | - 0.1                            |
| 6015         | 225715.652735. | 543.40 | 624.690                         | .737                                | -95.115                         | 0.0                              |
| 6016         | 225755.653025. | 556.75 | 621.610                         | 1.324                               | -95.081                         | 0.0                              |
| 6017         | 226335.653500. | 663.81 | 601.040                         | .534                                | -96.205                         | - 1.3                            |
| 6018         | 226785.654110. | 652.91 | 603.320                         | .449                                | -96.531                         | - 1.8                            |
| 6019         | 227200.654620. | 693.29 | 596.050                         | .171                                | -96.548                         | - 1.9                            |
| 6020         | 227620.654970. | 685.98 | 597.910                         | .150                                | -96.500                         | - 2.0                            |
| 6021         | 227900.655610. | 707.52 | 594.560                         | .182                                | -95.825                         | - 1.3                            |
| 6022         | 227860.656040. | 727.15 | 590.400                         | .246                                | -96.005                         | - 1.1                            |
| 6023         | 228125.656410. | 699.45 | 596.530                         | .224                                | -95.577                         | - 0.8                            |
| 6024         | 228360.656930. | 645.58 | 607.660                         | .224                                | -95.130                         | - 0.3                            |
| 6025         | 228395.657340. | 655.91 | 605.250                         | .160                                | -95.616                         | - 0.6                            |
| 6026         | 228430.657790. | 659.48 | 604.510                         | .214                                | -95.608                         | - 0.4                            |
| 6027         | 228530.658035. | 667.98 | 602.760                         | .352                                | -95.637                         | - 0.4                            |
| 6028         | 228680.658650. | 741.17 | 587.870                         | .641                                | -95.847                         | - 0.4                            |
| 6081         | 225950.651190. | 498.62 | 632.430                         | .150                                | -96.735                         | - 2.2                            |
| 6082         | 226620.650455. | 492.71 | 634.940                         | .096                                | -95.969                         | - 2.3                            |
| 6083         | 227220.649930. | 489.85 | 636.940                         | .096                                | -95.029                         | - 2.1                            |
| 6084         | 227940.649380. | 486.99 | 639.170                         | .096                                | -93.948                         | - 1.9                            |
| 6085         | 228410.649280. | 486.55 | 640.160                         | .139                                | -93.370                         | - 1.6                            |

Profil Büron Nr. 61

|      |                |        |         |       |         |       |
|------|----------------|--------|---------|-------|---------|-------|
| 6101 | 228525.646980. | 586.97 | 622.550 | .374  | -91.757 | - 1.5 |
| 6102 | 228570.647200. | 595.26 | 620.780 | .438  | -91.883 | - 1.4 |
| 6103 | 228590.647362. | 585.30 | 622.900 | .427  | -91.719 | - 1.2 |
| 6104 | 228610.647485. | 577.22 | 624.480 | .523  | -91.620 | - 1.1 |
| 6105 | 228640.647645. | 552.19 | 629.590 | .684  | -91.184 | - 0.6 |
| 6106 | 228685.647920. | 498.62 | 640.650 | .481  | -90.579 | 0.0   |
| 6107 | 228720.648105. | 490.99 | 641.890 | .278  | -91.005 | - 0.3 |
| 6108 | 228770.648345. | 488.20 | 642.060 | .171  | -91.484 | - 0.7 |
| 6109 | 228810.648535. | 486.62 | 642.060 | .139  | -91.830 | - 1.0 |
| 6110 | 228860.648700. | 486.39 | 641.750 | .139  | -92.215 | - 1.3 |
| 6111 | 228910.648975. | 486.40 | 641.510 | .160  | -92.439 | - 1.5 |
| 6112 | 228970.649130. | 488.04 | 641.050 | .203  | -92.595 | - 1.6 |
| 6113 | 229035.649330. | 492.40 | 640.190 | .278  | -92.590 | - 1.5 |
| 6114 | 229075.649550. | 497.93 | 641.030 | .417  | -90.586 | -     |
| 6115 | 229208.649750. | 510.30 | 637.490 | 1.015 | -91.283 | - 0.1 |

#### 4.5 Talprofile und Blockdiagramme

##### Talprofile

Entlang der Täler, d.h. quer zum Mittelland erstellte ich total 10 Längsprofile und ungefähr senkrecht zu den Haupttälern total 20 Querprofile.

Für eine umfassendere Detailinformation erhielten alle Profile eine zehnfache Ueberhöhung. Alle Profile wurden in den gleichen Massstäben 1: 25.000/1: 2.500 gezeichnet und anschliessend 4-fach auf die Massstäbe 1: 100.000/ 1: 10.000 verkleinert. Damit haben alle Profile gleiche und leicht lesbare Massstäbe.

Für eine gute Höhenorientierung markierte ich überall die 500 müM Höhenlinie.

Profile, die ungefähr von West nach Ost verlaufen, sind horizontal gezeichnet, die Tal-Längsprofile, die ungefähr Süd-Nord verlaufen dagegen vertikal mit Norden oben am Kartenblatt.

Die Längsprofile sind ungefähr in die Talachse gelegt. Um diese Darstellungen aussagekräftig zu gestalten, sind die rechten, östlichen Hügelkulissen möglichst massstabgetreu eingetragen.

Bei den Profilen des Suhren-, Wynyen-, See-, Bünz- und Reusstales sind die Kulissen beider Talseiten markiert. Dabei wurde eine spiegelbildliche Darstellung der Profile und Kulissen gewählt, mit Meereshöhe als Spiegelachse.

Bei den Querprofilen sind keine Kulissen gezeichnet. Einzige Ausnahme bildet Profil E-E am Jurafuss, wo die nördlich gelegene Jurakette als Kulisse eingetragen ist.

Spezielle wesentliche Informationen sind gemäss der auf der nächsten Seite gezeichneten Legende in den Profilen, resp. in den Kulissen markiert. Vor allem sind die wichtigen Eisstände, Moränenwälle und der anstehende Fels angegeben. Die in die Profile massstäblich übertragenen Bohrungen sind in den Längsprofilen fortlaufend nummeriert. Die erste Ziffer bezeichnet die Profil-, die zweite die Bohrnummer.

# Legende zu den Längs- und Querprofilen


Alle Profile in den gleichen Massstäben

1: 100'000 / 1: 10'000 — 10-fach überhöht

500 — 500 500 müM. Höhenmarkierungslinie

 Profilverlauf, Terrainhöhe

 Profilverlauf mit anstehendem Fels

 Fels  Fels angedeutet

 Schnittpunkt zweier Profile

 Profil entlang Fluss

 markante Richtungsänderung des Profils

 Hügelkulisse  See

„Aeugst“ Dorf, in Profilachse ; „Jonen“ Dorf ausserhalb Profil

..... Eisstände im 1. Würmmaximum

— — — — — Moränenzüge (resp. Eisstände) im Würmmaximum

— . — . — . Moränenzüge (resp. Eisstände) im Schlierenstadium

— — — — — Moränenzüge (resp. Eisstände) im Zürichstadium

— x x — x x Moränenzüge (resp. Eisstände) im Hurdenstadium

 Bohrung in Lockergestein

 Bohrung durch Moräne

 Bohrung projiziert

 Felsbohrung

 Pollenanalysen (Material aus Bohrkern)

 Verrucanobohrkern

6301 Gravimetriepunkt (erste zwei Ziffern → Profilnummer  
0 letzte zwei Ziffern → Punktnummer)

 ungefähre Felsverlauf, aus Gravimetrie bestimmt

} Bohrmeter stimmen mit  
Höhenmassstab überein

Bohrmeter fiktiv





Aus der Situation 1 : 200.000  
ist die genaue Lage der Profile  
ersichtlich. Kartenausschnitt  
1 : 200.000, reproduziert mit  
Bewilligung der Eidgenössischen  
Landestopographie, vom  
28. Juni 1982




## Blockdiagramme

Besonders interessante Gebiete erfasste ich in Blockdiagrammen, alle 2,5fach überhöht. Blickrichtung ist bei allen Diagrammen aus Südosten. Als Verzerrungswinkel wählte ich  $45^\circ$ , als Verzerrungsfaktor  $\frac{1}{2}$  (Längen der N-S Richtung gegenüber E-W Richtung).

Moränenhügel erhielten die gleichen Symbole wie in den Profilen. Ebenen sind grau grundiert, Gewässer blau gehalten, Terrainhöhenlinien mit 50 m Aequidistanz braun. Als wichtigste Information ist in rot der approximative Felsverlauf ins Blockdiagramm hineinprojiziert. Anstehender Fels ist rot gestrichelt, Felsisohypsen haben ebenfalls 50 m Aequidistanz. Die Talachse im Fels ist markant strichpunktiert angegeben.

Aus der Situation 1 : 200.000 ist die Lage der Blockdiagramme ersichtlich.



## Abschnitt 2 - GEOMORPHOLOGISCHE TALBESCHRIEBE

Zum Verständnis der nachfolgenden Kapitel benötigt man folgendes Kartenmaterial 1 : 25.000: 1069 Frick, 1070 Baden, 1089 Aarau, 1090 Wohlen, 1108 Murgenthal, 1109 Schöftland, 1110 Hitzkirch, 1111 Albis, 1128 Langenthal, 1129 Sursee, 1130 Hochdorf, 1131 Zug, 1149 Wolhusen, 1150 Luzern und 1151 Rigi.


Bei der Auswertung der Bohrresultate richtete ich mein Hauptaugenmerk nicht auf die Quartärgeologie und die Hydrogeologie, sondern auf die Geomorphologie. Dabei interessierte mich vor allem der Felsverlauf in den einzelnen Talabschnitten.

Daneben untersuchte ich auch die Ablagerungen in den Tälern und versuchte sie zeitlich einzuordnen. An den Talflanken rekonstruierte ich an Hand vorhandener Moränenablagerungen die verschiedenen würmzeitlichen Eisstände. Vor ca. 75.000 yBP, im Mittelwürm (Dauer 75.000 - 25.000 yBP) stiess das Eis kurze Zeit maximal vor, (1. Würmmaximum), ohne dass sich dabei markante Moränenwälle bildeten. Im nachfolgenden Hochwürm (ca. 25.000 - ca. 16.000 yBP) entstanden vor ca. 25.000 yBP die markanten Moränen des Würmmaximums, vor ca. 20.000 yBP die weniger ausgeprägten Moränen des Schlierenstadiums und vor ca. 18.000 yBP bildeten sich die markant ausgeprägten Moränen des Zürichstadiums. Im Spätglazial (ca. 16.000 - 10.000 yBP) zog sich das Eis etappenweise gegen die Alpen zurück. Im Untersuchungsgebiet finden sich noch wenig markante Moränenablagerungen des 1. spätglazialen Rückzugstadiums, (Hurdenstadium, ca. 14.000 yBP).

Die prähochwürmzeitlichen Ablagerungen an den Talflanken werden in dieser Arbeit nicht beschrieben.


Die Lage des anstehenden Felsens, der Felshindernisse, -schwellen und -riegel, sowie vor allem von Moränenzügen, resp. Eisständen in den verschiedenen Stadien sind graphisch aus den Längs- und Querprofilen ersichtlich. Die optische Darstellung vermindert die Fülle von Ortsnamen für Lagebezeichnungen.

### 5. Region Luzern - Schlüsselpunkt für die Mittelland-Quertäler vom Wigger- bis zum Seetal



Der würmeiszeitliche Reussgletscher trennte sich bei Brunnen - durch die Hochflue, den Gersauerstock und die Rigi - in zwei Arme. Der rechte Arm floss über Seewen, Goldau, Richtung Norden (vgl. Kapitel 10.1) und der linke Arm dem heutigen Vierwaldstättersee entlang gegen Westen.


Beim Eisaufbau musste der Reussgletscher nördlich des Urnerseegebietes eine erste "Felsschwelle" (heute unter Wasser) zwischen Axenstein-Gewölbe und der Seelisbergfalte (ca. 340 müM) überfließen.




Wie mächtig das Weggiser- und das Gersauerbecken mit Lockergesteinsmaterial aufgefüllt ist, ist mir noch unbekannt. Nach heutiger Information stellt die Seeuntiefe 1,5 km östlich Gersau, bei Chindli einen Moränenwall des sich zurückziehenden Reussgletschers (Chindli-Stadium) dar.

Der Eisstrom bewegte sich Richtung West gegen Buochs. Der Bürgenberg spaltete den sich aufbauenden Eisstrom. Ein Arm nahm Richtung Weggiserbecken über die heute unter Wasser liegende Felsschwelle (ca. 380 müM) zwischen Unter- und Obernas. Der andere Arm vereinigte sich südwestlich des Bürgenberges mit dem Engelberggletscher und dem Brüniglappen des Aaregletschers. Die Fliessrichtung dieser drei Eisarme veränderte sich in Richtung Norden.

Beim Eisaufbau fand im Kreuztrichter eine mächtige Konfluenz der oben aufgeführten Gletscherarme statt. Beim weiteren Vorücken stellte sich ihnen im Norden ein markanter Felsriegel in Form der gefalteten, resp. steilgestellten Molassezüge entgegen.



Es resultierten drei Haupteisströme. Im Osten floss ein rechter Arm über den Küssnachersee Richtung Immensee, wobei es zu einer Konfluenz mit dem "Zugerseearm" (Seewen-Goldau) kam. (vgl. Kapitel 10.1). Der mittlere Arm nahm den Weg über den heutigen Luzernersee, östlich der Biregg und der dritte, linke Arm über Horw, westlich der Biregg nach Norden.



In der Gegend Luzern erreicht der von Ost nach West verlaufende Felsriegel der "gefalteten Molasse" eine minimale Höhe von 450 - 500 müM (vgl. Profil T-T).


Nach Westen gegen den Sonnenberg steigt der Fels rasch auf Höhen bis ca. 800 müM an, sinkt beim Renggloch nochmals auf ca. 550 müM ab, um dann am Blatterberg erneut auf Höhen bis ca. 1000 müM anzusteigen.

Gegen Osten steht Fels am Dietschiberg, Hombrig, Dottenberg und Rooterberg an, wobei er am letzteren eine max. Höhe von 840 müM erreicht.

Auf Grund dieser topographischen Situation floss beim Eisaufbau der mittlere Arm zuerst über den Felsriegel, da er in der Region Luzern die kleinsten Hindernisse antraf.

Der westlichste der drei Arme bewegte sich beim Eisaufbau aus der Region westlich des Chrüztrichters in die Horwerbuch und zwischen dem Pilatus und dem Biregghügel in Richtung Norden.

Gütsch und Sonnenberg spalteten den Arm, so dass ein östlicher Teil via Obergrundquartier sich mit dem Luzernerseearm vereinigte und östlich des Gütsch vorbeifloss. Der westliche Arm stiess ins Kriensertal vor, wobei das Eis nach Obernau vom Blatterberg gestaut wurde. Nachdem sich der Eiskörper zunehmend aufgebaut hatte, erfolgte ein Ueberfliessen dieses Lappens über das Renggloch ins Kleinemmetal.



Nachdem sich die Gletscher bis zum Maximalstand sukzessive aufgebaut hatten, lag die Region unter einer mächtigen Eisdecke. Wie Seitenmoränenwälle am Pilatusnordhang auf Höhe Chrienseregg, die ins Maximalstadium gehören, aufzeigen, reichte das Eis bis über 1000 müM hinauf, sodass die Hügelzüge der gefalteten Molasse ganz von Eis bedeckt waren.

Moränenwallreste, die auf die verschiedenen würmzeitlichen Eisrandlagen bei den verschiedenen Rückzugsstadien hindeuten, sind

in der Region am Nordhang des Pilatus, an den Hügelszügen bis Wolhusen, am Sonnenberg und im nördlichen Abschnitt des in diesem Kapitel untersuchten Gebietes im Rottal erhalten.

Am Südwestrand des Untersuchungsgebietes lässt sich der Maximalstand an Hand von Wallresten von Schwandegg - Chrienseregg-Neualp - Nordhang Schwarzenberg - Dorf Schwarzenberg verfolgen (J. Kopp, 1955). Wallreste zwischen der Chrienseregg und dem Langwasen markieren Rückzugsstadien. Auf der anderen Talseite, am Sonnenberg, lässt sich der Eisstand im Zürichstadium an der Wolfsschlucht (hangparallele Entwässerungsrinne) feststellen.


Die Würm-Moränenwälle am Pilatusnordhang deuten darauf hin, dass die Eisrandlage im Würm-Maximum entlang dieses Hanges in Richtung Wolhusen verläuft (R. Hantke 1968, 1980). Im Kleinemmetal selbst ist eine markante Formänderung bei Schachen feststellbar, indem westlich dieser Ortschaft sich das Tal plötzlich verengt und im Abschnitt Schachen-Werthenstein nicht mehr die glazial geprägte Trogform aufweist. (vgl. Profil Q-Q). Zudem fließt hier die Emme auf Fels. Oestlich von Schachen öffnet sich das Tal und die kleine Emme fließt durch Alluvionen.

Die Oberflächenformen des höher gelegenen Rottales dagegen sind eindeutig glazial geprägt. Moränenwälle quer zum Tal markieren Rückzugsstadien der Gletscher. (vgl. Profil P-P und 2-2). Dabei sind der Wall Rüediswil - Cherhof - Gr. Schübelberg dem Schlierenstadium, und die beiden markanten Wälle bei Moos und beim Hapfig dem Zürichstadium zuzuschreiben. (Die Situation im Würm-Maximum mit den zugehörigen Moränenwällen des unteren Rottales wird in Kapitel 6 erfasst).

Augenfällig ist, dass die südlichen Seitenmoränenwälle der oben beschriebenen Stadien vom Sigigerwald und beim Holzhubel an der Kulmination des Aemmenberges abrupt abbrechen. Die synchronen Moränenwälle an der Südseite des Aemmenberges fehlen. Ob diese Wälle infolge Steilheit dieses Berghanges abgerutscht sind und verschwemmt wurden, (subglaziale Entwässerung) ist fraglich.

Der heutige Informationsstand lässt eine klare Interpretierung der Situation im Kleinemmetal noch nicht zu. Sicher ist, dass die "kleine Emme" zur Zeit des Maximal- und des Schlierenstadiums ihren Weg Richtung Wolhusen, Menznau nach Norden nahm, wobei sie noch Schmelzwässer des Waldemmengletschers (der von Süden her kommend im Maximalstadium bei Wolhusen stirnte), und vom Rottal her diejenigen des Bilbaches und Stäubligbaches (deren unterste Bachtteile klar gegen Wolhusen zu weisen) aufnahm.

Die tiefere Region ausserhalb des Reussdurchbruches durch die gefaltete Molasse einerseits und das Kriensertal andererseits wurden im Hurdenstadium geprägt. Damals stirnte ein Gletscherarm bei Obernau, wobei sich ein natürlicher Stausee bildete, der sich über die Renggschlucht entwässerte (Kopp, 1962). Der andere Gletscherarm reichte noch bis ins Kleinemme- resp. Reusstal hinein. Die Eisrandlage wird durch Moränenwälle im Ryffigwald SW Rothenburg (Höhe ca. 520 müM) dokumentiert. Da die Moränenwälle im Kleinemmetal verschwemmt sind, lässt sich der Hurdenstand in der Region nur an Hand der Littauer Deltaschotter abschätzen. Nachdem sich das Eis weiter zurückzog, entleerte sich der natürliche Gletscherstausee von Littau. Der von Kopp (1962) postulierte alte Kleinemmelauf über Reussbühl-Rothen sollte durch Bohrungen verifiziert werden.



Informativ ist die Bohrung 4/1 666.250/206.960, 435 müM, die in der Talmitte bei Horw den Fels erst auf 149,8m, also auf Kote 285 müM erreichte. Die obersten 6m bilden meist geschichtete siltig sandige Verlandungssedimente. Zwischen 6m und 21,5m deuten geschichtete, fast saubere Sande mit Fein- und Mittelkiesschichten mit vielen organischen Beimengungen auf Deltaablagerungen hin. Zwischen 21,5m und 32,2m wird das Korn feiner und es sind geschichtete tonige Silte vorherrschend. Die Zone zwischen 32,2m und 40,0m zeigt einen ähnlichen Aufbau wie zwischen 6m und 21,5m (Delta-Ablagerungen). Die Zone 40,0m - 46,5m besteht aus einem Kieskörper. Darunter findet man mächtige feinkörnige Seeablagerungen (46,5m - 60,0m feinsandige Silte, 60,0m - 107,0m siltige Feinsande). Zwischen 107,0m und 143,5m wurde eine mittelhart bis hart gelagerte Moräne durchbohrt, unterlagert von einer 6m mächtigen sauberen Kiesschicht. Diese Schotter überlagern direkt den unteren Süsswassermolassefels.

Küttel (schriftliche Mitteilung) folgert auf Grund von Pollenuntersuchungen aus Bohrkernen, dass die Ablagerungen bis auf 107,0m Tiefe holozänes Alter besitzen. Untere Proben deuten auf Ablagerungen im Boreal/Präboreal, also ca. 9000 yBP hin.

Absolute Datenbestimmungen aus Hölzern, die im  $^{14}\text{C}$ -Labor des geographischen Institutes der Universität Zürich durchgeführt wurden, bestätigen Küttels Aussagen. Organische Beimengungen aus dem Bohrkern aus 17m Tiefe sind  $2.485 \pm 75$  yBP, solche aus 36,5m Tiefe  $3.540 \pm 80$  yBP alt.

Bohruntersuchungen beim zentralschweizerischen Technikum erreichten bei max. 32m Tiefe den Fels nicht. Die beiden Informationen aus der Westseite des Areals (665.890/207.362, 446 müM und 665.905/207.255, 445 müM) zeigen beide oben ca. 5m Seebodenlehme, unterlagert von ca. 10m starkem Moränematerial. Darunter folgen ca. 6m Kiese und Sande und bis auf 30m Tiefe sandige Seeablagerungen.

Die beiden gegen die Talmitte zu liegenden Bohrungen 665.965/207.373, 442 müM und 665.963/207.250, 442 müM zeigen ein anderes Bild: 0 m - ca. 14,0 m Seebodenlehme, 14,0 m - ca. 24,0 m Kiese und Sande, darunter bis auf 32 m Tiefe siltige See-Ablagerungen.

4/2 666.190/208.130, 441 müM weist über die ganz Länge von 0 - 17,0 m locker gelagerte feinkörnige Bohrkerne auf. Rammsondierungen bis auf 30 m Tiefe zeigen, dass zwischen 17 m und 30 m mit gleichen Ablagerungen zu rechnen ist. Moräneablagerungen fehlen also.

Im Filterbrunnen Mattenhof 4/3 665.520/208.780, 452 müM existieren zwischen 0 m und 21,0 m zuoberst einige Torflagen, sonst vorwiegend geschichteter Sand mit Silt, dazwischen (5,5 m - 8,0 m) locker gelagerter, siltiger Feinkies. Unter 21,0 m liegt eine ca. 10 m mächtige Kiesschicht mit kantengerundeten Steinen und Blöcken (mit tieferem Grundwasserstockwerk), unterlagert von einer Moräne, die bis zum Bohrende von 33 m reicht.

Im Bereich Eichhof sind neben der Bohrung 4/5 665.290/210.120 455,5 müM noch zahlreiche andere Angaben vorhanden. Einzeln gesehen lassen die Bohrungen in der Ebene wohl einen heterogenen Aufbau erkennen. Zuoberst sind vor allem gegen den Sonnenberghang zu, kiesige Bachschuttablagerungen vom Krienbach, darunter mächtige (bei Bohrung E 15 665.177/210.040, zwischen 5,0 m und 46,5 m), meist sandige und sandig siltige Schwemm- und Verlandungssedimente vorhanden, die vereinzelt von 1 m bis max. 3-4 m mächtigen Kiespartien durchzogen sind. Dann folgt Moräne, die gegen Süden zu abtaucht. Der Fels ist bei all diesen Untersuchungen nur in Sonnenberghangnähe angebohrt.

Die Region Luzerner Allmend, übers Kriensertal bis Obernau ist im Profil T-T abgebildet. Es handelt sich beim Kriensertal um ein übertieftes Trogtal, doch ist bis heute der Felsverlauf im mittleren Teil des Tales noch unbekannt. Im Gebiet Kriens finden sich Einlagerungen von fluvioglazialen Schottern bis auf Tiefen von über 40 m. Ein randglazial entstandener Schotterstrang zieht von Obernau längs des heutigen Krienbachverlaufs. Beim Grossfeld-Amlehn teilt er sich in zwei Stränge auf, wobei der eine Richtung Chupferhammer-Eichhof gegen das Stadtgebiet und der andere gegen Südosten ins Gebiet Grosshof-Rösslimatt-Nidfeld-Mattenhof verläuft.

Zwischen Kriens und Obernau ist eine Bohrung, vgl. Profil T-T, bis auf den Fels abgeteuft (662.880/209.530, 510 müM) Nach 7,5 m kiesigen Flusschottern wurde bis auf 60,4 m mächtige kompakt gelagerte Moräne durchbohrt, unterlagert von Fels.

Auch die Sondierung im Dörfli Obernau 2/1 661.950/209.350, 548 müM zeigt in der ganzen Bohrtiefe von 25 m kompakt gelagerte Moräne.

Das Luzerner Becken des Vierwaldstättersees ist noch nicht speziell erforscht. Eine 62,5 m Bohrung 3/1 667.140/210.630 (436 müM) am Westufer (Neubau der Kantonsschule Luzern) zeigt über die gesamte Bohrlänge vorherrschend Silt mit hoher Plastizität, sodass die Bohrkerne noch aus 50 m Tiefe lagenweise "fast flüssig" herauskamen. Nur in vier Partien sind Sandlinsen von 1,5 - 2 m Stärke angetroffen worden. In der Tiefe von 7,5 - 9 m ist locker gelagerter sandiger Mittel- bis Feinkies, in dem artesisch gespanntes Grundwasser zirkuliert.




In der Neustadt von Luzern, am linken See- resp. Reussufer sind diverse Bohrerergebnisse bis auf grössere Tiefen vorhanden. (Luzern Neubau Bahnhof, Kantonalbank (64 m Bohrung) und Flora 3/3 666.033/211.333 auf 435 müM). Diese Bohrungen beweisen, dass der Fels, der direkt nördlich der Reuss ansteht, sehr steil gegen Süden in unbekannte Tiefe absinkt. Im Lockergestein ist aus allen Angaben eine klare Gliederung möglich. Zuerst findet man junge, sandige Verlandungssedimente, z.T. mit Torf, Bachschuttablagerungen und vereinzelt Holzresten. Diese Schichten reichen bis 10-12 m Tiefe. Darunter folgt eine mehrere Meter mächtige, hellgraue bis gelblich und grünlich durchsetzte Schicht mit siltigen Tonen. Diese nach oben abdichtende weiche Seelehmschicht wird unterlagert von mächtigen monotonen Folgen von feingeschichteten tonigen Silten und siltigen Feinsanden, die bei der Kantonalbank ca. 665.850/211.300 bis zur maximalen Bohrtiefe von 64 m reichen.

Küttel (1983) hat mittels Pollenanalysen aus Material der Bohrung 1002 beim Ostportal des Bahnhofs Luzern in der mittleren weichen Seelehmschicht, die in dieser Bohrung von 11.60 bis 14.20 m Tiefe reicht, einen Hiatus nachgewiesen. Oberhalb ca. 13 m weist die Pollenflora auf einen Übergang Präboreal - Boreal (ca. 9000 yBP) hin, während tiefer als 14 m Älteste Dryas (älter als 13.000 yBP) feststellbar ist.

Ähnliche Daten aus Pollenanalysen wurden bei Bohrungen bis auf Fels auf der andern Seeseite, in der Husermatte Luzern 667.500/211.900, gefunden. Die Bohrung zeigt bis 21,0 m meist feingeschichtete tonige sandige Silte, von 21,0 bis 23,4 m etwas härter gelagerte Feinsande, von 23,4 bis 26,4 m nochmals geschichtete tonige Silte, ab 26,4 m bis zum Fels auf 26,6 m eine Grundmoräne mit eckigen Kieskörnern. Bis 10,5 m wurden Pollen aus postglazialer Warmzeit festgestellt, während Proben unterhalb 10,8 m Pollen aus der Ältesten Dryas führten. Also auch hier eine Sedimentlücke, die einige Tausend Jahre umfasst. (Küttel, schriftl. Mitteilung).

Interessant sind die Bohrerergebnisse, die beim Bau der N2 Senti- brücke über die Reuss gefunden wurden. Am linken Reussufer sind bei Bohrung 3/5 665.220/211.740, 434,5 müM unter einer 9,5 m mächtigen siltig sandigen Kiesschicht, ca. 8m geschichtete tonige Silte (Seebodenlehme) durchbohrt worden. Unterhalb 17,8 m bis auf 59,5 m liegen Moränen und verschwemmte Moränen. Erst unterhalb 59,5 m, also auf Kote 375 müM stösst man auf die obere Meeresmolasse. Auch die drei im Fluss ausgeführten Bohrungen zeigen einen analogen Schichtaufbau mit locker gelagerten Alluvionen oben, einer mittleren Schicht mit sandig siltigen Seeablagerungen und darunter mächtigen Moränen, resp. verschwemmten Moränen, die bis unter 60 m unter Terrain reichen sollen. Da nordöstlich und südwestlich nahe diesen Bohrungen der Fels ansteht, deutet dies auf eine canyonartige Schlucht hin, wobei der Durchbruch mit Moränematerial verstopft wurde.

Weitere Untersuchungen im Gebiet des Reussdurchbruchs zeigen, (z.B. 3/6 664.600/212.390, 436 müM) dass nach einigen Metern Lockergestein bereits Fels folgt. Direkt über dem Fels ist immer eine 1 -4 m mächtige, kompakte Moräne vorhanden. Die Bohrung B24 664.710/212.360, 445 müM, im Gebiet Ibach gegen das Friedental zu zeigt 3,8 m sandiger Silt, (z.T. Auffüllung) 3,8 - 8,6 m Kies mit Steinen, darunter bis 13,2 m Sand und ab 13,2 - 17,7 m festgelagerte Moräne mit einem Erratiker. Unterhalb 17,7 m folgt der Fels.



Nördlich der gefalteten, resp. steilgestellten Molassezügen erstreckt sich parallel zu diesen Hügeln das Kleinemme-Reusstal von Wolhusen-Schachen-Malters-Littau-Emmenbrücke-Emmen. Das Reusstal biegt bei Gisikon gegen Norden zu ab.

Der rechte Teil des Talprofils 1-1 folgt ab Wolhusen der kleinen Emme, resp. der Reuss. Dargestellt sind in Kulissenform die nördlich der Profilachse auftretenden Hügelzüge.

Die quer zum Kleinemmetal verlaufenden Profile Q, R und 2 (wobei 2 das Tal schief schneidet und es deshalb breiter erscheinen lässt) verdeutlichen den Wechsel der Talform in diesem Abschnitt.

Im Kleinemmetal, zwischen Schachen-Littau und im ganzen Rottal sind nur wenige Bohraufschlüsse bis auf den Fels vorhanden. Mit dem heutigen Informationsstand sind deshalb nur hypothetische Rückschlüsse auf die Geomorphologie möglich. Das Gebiet sollte noch detaillierter bearbeitet werden.

Die Bohraufschlüsse in der Talachse zwischen Wolhusen und Schachen (1/17 648.380/211.930 - 1/16 648.781/211.634 und 1/15 650.627/211.414, 574 müM) zeigen alle nach wenigen Metern Kies (max. 5,0m) sofort Fels.

Anders die Bohrinformationen aus der Gegend östlich Schachen: Bei 1/14 656 250/210.020, 496 müM findet nach 17,1m Kies mit Blöcken ein plötzlicher Wechsel zu grauem, geschichtetem, tonigem Silt (Seebodenablagerungen) statt. Der Filterbrunnen der Gemeinde Malters 1/13 656.750/210.150, 489 müM, zeigt über die ganzen 16,2m Bohrtiefe Kies mit Blöcken, wobei die oberen 9,0m als locker, die darunter liegenden als hart gelagert beschrieben sind.

Die Nummer 1/12 = 2/2 659.460/210.680, 476 müM, bei Blatten ist die einzige Bohrung in der Talachse bis auf den Fels. Nach 2,0m siltigen Oberflächenschichten zeigen sich bis 13,0m Kiese mit Blöcken, darunter eine mächtige, geschichtete, weiche (d.h. nicht vorbelastete) siltig tonige Seeablagerung bis in eine Tiefe von 75,5 m. Nach einem halben Meter steifer Moräne folgt auf 76,0m der Fels.

Die Bohrungen 1/11 660.380/210.850, 469 müM. und 1/10 661.140/211.100, 465 müM weisen analoge Abfolgen auf. In 1/11 folgt der Übergang Kies-Lehm bei 11,6m, in 1/10 bei 11,3m.


Ab Littau steigt in der Talachse der Fels an, was in den Bohrungen 1/9 661.320/211.270, 460 müM bis 1/4 663.500/214.000 435 müM bei Emmenbrücke dokumentiert ist. Unterhalb einigen Metern Kies liegt 1 -2m Moräne, dann Fels.

Früher ist die kleine Emme bei Emmenbrücke via Herdschwand-Gersag-Mooshüsli dem Emmenfeld zugeströmt. G. Boesch-Ineichen hat in seiner Broschüre "Zur Lothar-Urkunde vom 25. Juli 840 - die Königsfreien von Emmen Luzern" urkundlich nachgewiesen, dass im 8. Jahrhundert eine Korrektur der Emme in die Reuss bewerkstelligt wurde.

Die tiefere Region nordöstlich des Reussdurchbruches wurde ebenfalls hauptsächlich z.Z. des Hurdenstadiums geprägt. Da die Moränenwälle im Reusstal verschwemmt sind, lässt sich die damalige ungefähre Eisrandlage nur an Hand der Moränenwälle an den Hangpartien rekonstruieren. Der Gletscher hatte etwa die Ausdehnung Rothenburg - Ober Utigen - nördlich von Inwil - Dietwil - Oberrüti - Hünenberg - Honau - Gisikon - Hasliwald - entlang dem Hundsrücken. Damals floss ein Teil der Schmelzwässer über das Rontal ab.

Profil S-S

S-S



Im Gebiet Emmefeld-Haslifeld sind in der Talmitte keine Informationen aus Bohrungen bis auf den Fels vorhanden.

Aus den drei vorhandenen Bohrungen in der Talachse resultieren folgende Ergebnisse:

1/3 666.000/215.480, 426 müM: nach zwei Metern Verlandungssedimenten aus sandigem Silt folgen bis Bohrende auf 15 m Kiese mit Blöcken. Ebenfalls ist in 1/2 666.140/215.800, 425 müM über die ganzen 15 m Bohrtiefe Kies. Die 20-m-Bohrung 1/1 666.380/216.200, 423 müM zeigt hauptsächlich kiesigen Aufbau, doch ist die Lokalität mit kiesigen Sandlinsen durchsetzt.


In einer Baugrube bei Koordinate 666.770/215.500 fand man in ca. 8 m Tiefe im Kies einen Eichenast. Im  $^{14}\text{C}$ -Labor der Universität Zürich bestimmte man das Alter auf  $4.490 \pm 80$  yBP.

Auf der rechten Talseite der Reussebene sind 4 Bohrungen bis auf den Fels abgeteuft worden.

Die Bohrung bei 667.00/215.900, 423 müM lokalisiert in den obersten 8 m Kiese, zwischen 8m und 16m kiesige Grobsande. Die zwischen 16m - 23m vorhandenen geschichteten tonig bis feinsandigen Silte lassen auf Seeablagerungen schliessen. Zwischen 23m und 29,8m, vor Felsbeginn, ist Moräne durchbohrt worden.

5/2 667.660/216.650, 421 müM trifft bei 35,7m auf Fels. Die obersten 16,5m sind Grobkiese, durchsetzt mit Sandlinsen. (7,0m - 9,5m und 11,5m - 12,5m) Zwischen 16,5m und 31,8m sind wiederum siltige Seebodenablagerungen, die von 31,8m - 35,7m von einer kompakten Moräne unterlagert sind.

Die drei Bohrungen im Schiltwald nahe der Reuss (auf der Tal-  
seite) zeigen eine einfache Abfolge von Kies-Moräne-Fels, wo-  
bei die Moränenmächtigkeit zwischen 4m-8m ausmacht und der  
Fels bei 16m - 21m Tiefe folgt.




Das Gravimetrieprofil Eschenbach 63, das zwischen oberem und unterem Schiltwald das Reusstal durchquert, illustriert, dass das Tal in dem Abschnitt nur ca. mit 50 m Lockergestein aufgefüllt ist. Auf beiden Talseiten steht der Fels an.

Im Vergleich zu den andern Tälern ist das Reusstal in dem Abschnitt wenig übertieft.

Im Rontal zwischen Rotsee und Root sind mir nur wenige Sondier-  
ergebnisse bekannt. Eine Bohrung 670.600/216.950, 420 müM bei  
Dierikon, ca. in der Talachse gelegen, zeigt bis 4,0m Feinsand,  
von 4,0m - 15,0m Grobkies, von 15,0m - 18,0m Lehm, gefolgt von  
Fels. Es scheint, dass die Rontal-Rinne untief ist.

## 6. Westliche Randzone der würmeiszeitlichen Vergletscherung des Luzerner Alpenvorlandes und deren Abflussrinnen



Kartenausschnitt  
1:200.000,  
reproduziert mit Bewilligung der Eidg.  
Landestopographie, vom 28. Juni 1982

Das hier beschriebene Gebiet umfasst die Gegend um Wolhusen, die Region nördlich, bzw. nordöstlich des Napfberglandes, das Rottal, das Westgebiet des Wauwilermooses, sowie das Luthern-Wiggertal.

Zum besseren Verständnis der morphogenetischen Zusammenhänge sind im intramoränen Bereich zusätzliche Informationen einzuholen. So bestehen im ganzen Wauwilermoos und im Gross- teil des Rottales und im Gebiet um den Soppensee Informationslücken.

Doch sind vor allem in den letzten Jahren einige interessante Bohrungen abgeteuft worden, wobei die informativsten nachfolgend beschrieben sind.

(vgl. Tallängsprofile auf nächster Seite)

Im Gebiet der Querprofile O-O bis Q-Q (Wolhusen, Ruswil, Buttisholz) sind folgende Bohrerergebnisse vorhanden:

In der Nähe des Moränenwalles bei Neumühle (Zürichstadium), östlich Ruswil sind 6 Bohrinformationen bekannt (2 nördliche Bohrungen nicht bis auf Fels, 4 südliche auf Fels, Tiefe je ca. 24,0m, vgl. untenstehende Beschriebe 2/3 und 2/4). Da diese Bohrungen an den Talflanken liegen, kann über die maximale "Felstiefe" noch keine genaue Aussage erfolgen. Da aber andererseits an der nahe gelegenen Sonnmatt, an der Strasse nach Ruswil Fels ansteht, scheint hier das Rottal nicht stark über-tieft. Beim Filterbrunnen 2/3 652.510/214.220, 633 müM ist nach 3m Grobkies eine obere Moräne, die bis 9,0m Tiefe reicht, vorhanden. Darunter folgen bis 22,5m Tiefe Flussschotter, dann bis 24,6m hart gelagerte Moräne. Unterhalb 24,6m ist Fels.


## Norden

## Norden

509

804

M. Ü. H.




## Süden

### Profil 2-2

**Norden**

*Nebikon* <sup>3</sup>



## Ausserdorf

## Grosswangen


## Süden

### Profil 2-2

## Norden


50

700



Suden  
Fortsetzung

Bei der hangwärts gelegenen Bohrung 2/4 652.389/214.250, 631 müM fehlt die obere Moräne; die Flussschotter reichen bis 19,5m, die Moräne bis 23,0m, darunter liegt Fels.



Südwestlich von Ruswil untersuchte man für den Standort der ARA den Untergrund (650.840/214.220, 612 müM) und erhielt als Ergebnis in den oberen 13m weich bis halbfest gelagerte Silte mit reichlich Kies und Steinen, unterlagert von einer mächtigen Moräne bis zum Bohrende auf 23,0m.

Bilbach abwärts ist bei Bilmüli Fels im Bach anstehend. Südwestlich davon, oberhalb auf dem Hügel sind Informationen über den Untergrund beim Bau der Kompressorenstation der

Transitgas 649.655/212.600, 642 müM, eingeholt worden. Das Bohrgut zeigte moränenartigen Charakter, zwischengelagert von geschichtetem Silt (gletscherne Seesedimente), bis 20m Endtiefe.

Im engen Talabschnitt zwischen Werthenstein und Wolhusen steht an beiden Talhängen Fels an. Teils fliesst die kleine Emme auf Fels.

In Wolhusen bei 1/18 648.280/212.500, 592 müM, am Hang nördlich der Kirche liegt bis auf 7,1m Silt, der als "Gehänge-Lehm" taxiert wird. Darunter folgt bis 16,5m ein Terrassenschotter unbekannten Alters. Bis auf eine Tiefe von 23,5m wurde Bohrgut mit schichtweise "moränenartigem Habitus" gefunden, unterlagert vom Fels. Etwas hangaufwärts, bei 648.250/212.620, 606 müM, ist ebenfalls nach 8,4m Gehängelehm bis auf 21,5m Terrassenschotter angetroffen worden.


Im Talboden beim Grundwasserpumpwerk Bergboden 1/19 647.980/212.700, 588 müM, sind die oberen 18m kiesiger "Wiggerschotter", darunter bis zum Fels auf 20,5m hart gelagerte Moräne.

In Unterschlächten 1/20 647.520/212.900, 614 müM, kam der Fels erst bei 41,5m Bohrtiefe zum Vorschein. Leider ist die Bohrung schon älter und die Informationen etwas fraglich. Von 0 - 33,5m könnte es sich um eine obere Moräne, von 40,0m - 41,5m um eine untere Moräne handeln, wobei dazwischen locker gelagerte Kies-schotter erbohrt wurden. Nur wenig nördlich dieser Bohrung steht am Hang bei 647.550/213.050 der Fels an.

Bohrinformationen vom Neubau des Kreisspitals Wolhusen zeigen, dass auf der Anhöhe im Sadel (ca. 648.320/213.050, ca. 648müM) nach einigen Metern Oberflächenschichten kompakt gelagerte Moräne erscheint. (Bohrtiefe max. 20m)

Auf der andern Talseite befindet sich bei 647.200/212.400 eine kleine Kiesgrube. Beim Ausbeuten fand sich zuoberst eine ca. 5m mächtige geschichtete Lage aus Sand, Feinsand und Silt. Darunter folgten regelmässig gelagerte Kies-Sande.

Profil O-O




In Menznau ist in der Talachse bei 1/22 645.825/214.415, 595 müM, zuoberst 2,0m zersetzter Torf. Dann sind bis 10,0m "breiige" geschichtete siltige, bis 12,0m locker gelagerte sandige Seesedimente angebohrt worden. Darunter folgt locker gelagert Kies bis 15,0m, unterlagert von einer hart gelagerten Wechselfolge von Flussschottern (Kiese) mit moräneartigen lehmigen Zwischenschichten bis zum Fels,

der in Tiefe von 38,0m folgt.

Ausserhalb des Profils, beim Weiler Rötelsberg 645.000/216.420, 612 müM. sind informative Bohrresultate gefunden worden. Bei Endtiefe von 39 m wurde der Fels noch nicht erreicht. Dabei sind in den obersten 8m lockere, oft geschichtete Sande, darunter bis 23,4m lockere graublaue geschichtete tonige Silte vorhanden. Bis auf 34,0m folgt eine Wechsellagerung von halbfesten siltigen Sanden zu mittelhart gelagerten kiesigen Sanden. In den untersten 5m wurde mittelhart gelagerter siltiger Sand mit Kies mit Zwischenlagen von hart gelagertem siltigem Kies mit Steinen (wahrscheinlich Moräne) angetroffen.

Profil N-N




Im Profil N-N ist durch die Bohrung südlich Grosswangen-Hueben, ca. 646.280/218.880, ca. 570 müM. dokumentiert, dass im "inneren" Maximalstadium das Eis am Felsausläufer des Grosswanger Wellbrig anstand. Bis 7,1m sind feinkörnige Sedimente, darunter bis zum Fels, der unter 20,0m einsetzt, eine fest gelagerte Moräne.

Im Tal der Seewag bei Daiwil 1/25 643.690/216.380, 582 müM, erbohrte man den Fels erst auf 51m Tiefe. Die obersten 7m werden von siltigen Seesedimenten, die holozäne Pollenflora aufweisen (Küttel, schriftl. Mitteilung), gebildet, gefolgt von einer 5m mächtigen unregelmässigen Abfolge von kiesig bis sandigen Delta-Ablagerungen. Von 12,0m - 44,0m kam ein mächtiger Flussschotter zum Vorschein. Darunter folgt eine obere Moräne (44,0m - 46,0m), bis 49,0m ein weiterer Flussschotter mit z.T. verkitteten Kiespartien, darunter eine zweite Moränenschicht bis auf 51,0m Tiefe (Fels).

Im Haupttal der Seewag sind zwei Bohrinformationen bis zum Fels vorhanden. Bei 1/26 643.610/217.910, ca. 556 müM sind die obersten 7m feinkörnig ausgebildet, darunter folgen bis auf 29,0m Kiese, gefolgt bis auf 33,0m von einer sehr hart

gelagerten Moräne; unter 33,0m Fels. Bei 1/27 643.790/218.190 ca. 552 müM ist die Abfolge etwas komplizierter. Die obersten 4,5m bilden feinkörnige Verlandungssedimente, von 4,5m - 7,0m folgt ein oberer Flussschotterkomplex. Die sandigen Seesedimente zwischen 7,0m und 10,5m datierte Küttel (1983) auf Grund von pollenanalytischen Untersuchungen ins ausgehende Spätwürm, ins Bölling ca. 13.000 yBP. Bis zu 13,0m wird das Korn etwas gröber zu einem sauberen Sand, mit vereinzelt Kieskörnern, was auf Deltaablagerung schliessen lässt. Zwischen 13,0m - 18,0m findet man eine obere Moräne, unterlagert von Kiesen bis auf 24,5m Tiefe. Bis auf 33,5m folgen geschichtete Silte, die auf Seeablagerungen hinweisen und deren Alter auf Grund der Pollenflora als Mittelwürm datiert ist (ca. 25.000 - 50.000 yBP). Darunter wurde bis zur Felstiefe auf 36,9m eine untere hart gelagerte Grundmoräne erbohrt.



Im Gebiet Querprofil M-M sind im Rottal zwei Informationen vorhanden. 2/7 644.560/221.765, 520 müM, zeigt nach 2,5m siltigen und sandigen Ablagerungen von 2,5m - 9,0m Kiese, von 9,0m - 20,5m sandige, oft geschichtete Seesedimente, unterlagert von einer Moräne bis Bohrende auf 35,0m.

2/8 644.710/222.395, 519 müM, zeigt eine

analoge Schichtabfolge mit ebenfalls (ab 10,8m) feinkörnigen, geschichteten Seeablagerungen bis Bohrende auf 20,0m.


Im Raume Willisau sind in der Achse des Wiggertals keine Bohrungen bis auf Fels vorhanden.

Zwischen Willisau und Alberswil und zwischen Hohwald und Willbrig, bei 1/31 642.550/220.970, ca. 531 müM, bilden die obersten 3,2m siltige Seesedimente. (Küttel (1983) deutet auf Grund der Pollenflora die Basis dieser Seesedimentschicht ins Bölling ca. 12.500 yBP. Unter diesem feinkörnigen Schichtpaket folgen 12m mächtige Flussschotter, die zuoberst rotbraun verfärbt sind, sodass auf einen Hiatus zwischen dem Silt und dem Schotter sowie eine dazwischengeschaltete Bodenbildungsphase geschlossen werden kann. Zwischen 15,5m und 17,5m ist Moräne, darunter Fels angetroffen worden.

Eine ähnliche Sedimentfolge zeigt auch die etwas westlich von Profil 1-1 gelegene Bohrung 641.040/221.430, bei Gettnau. Bis 6,0m Tiefe finden sich feingeschichtete Silte, unterlagert bis 14,0m von Kiesen, bis 19,0m von Sanden, bis 26,0m von Kiesen, bis 27,0m von Moräne, darunter Fels. Die obersten 6,0m zeigen spätwürm-holozäne Pollenflora, deren Basis wiederum bis ins Bölling ca. 13.000 yBP zurückreicht. Auch hier kann auf Grund von Bodenbildungsanzeichen im obersten Kiesteil und der Pollenflora im obersten Schotterpaket (Mittelwürm, ca. 25.000 - 50.000 yBP) auf einen Hiatus zwischen den feinkörnigen Flachwasserablagerungen und den Schottern geschlossen werden.

Nördlich Ettiswil ist bei 1/32 643.240/222.950, ca. 510 müM, in einer Tiefe von 55,0m der Fels nicht erreicht. Nach 2m feinkörnigen Ueberschwemmungssedimenten folgen bis 7,0m Flussschotter, darunter bis 37,0m sandige, teils siltige, oft feingeschichtete Seeablagerungen. Zwischen 37,0m und 55,0m folgt eine mächtige Moräne, die evt. durch eine ca. 1m starke Zwischenschicht zweigeteilt ist.

Auch die Bohrinformation bei Alberswil 642.830/222.500, ca. 519 müM, zeigt eine z.T. verschwemmte Moräne über dem Fels. 0 - 3,0m sind Ueberschwemmungssedimente, 3,0m - 12,0m Flussschotter, 12,0m - 19,0m geschichtete feinkörnige Seesedimente, 19,0m - 26,8m Moräne, darunter Fels.






1/33 zwischen Hoostris und Schötz 642.450/223.880, 506 müM, zeigt bis zum Fels auf 20,2m nach einer Kies-schicht bis 6,0m Tiefe, zwei Moränen (6,0m - 11,8m) resp. (16,0m - 20,2m), zwischengelagert von geschichteten Sandpartien.

2/9 beim Rondurchbruch durch die Moräne 642.670/225.040, 501 müM, fand man zuoberst 4,0m Verlandungs-sedimente mit organischen Beimengungen, zwischen 4,0m und 12,0m feingeschichtete siltige Seeablagerungen, darunter bis zum Fels auf 46,8m eine mächtige Moräne.

Bei 2/10 642.000/225.340, 501 müM, in der Nähe des Zusammenflusses Ron-Wigger stiess man in den ersten 10,0m auf Kies, darunter auf hartgelagerten Sand bis 20,0m, gefolgt von "knetbarem" tonigem Silt bis 29,5m Tiefe. Nach einer 0,5m starken Moräne folgt Fels.

Beim Durchgang zwischen Wellbrig und Santenberg sind etliche untiefe, sehr heterogene Bohraufschlüsse vorhanden, die meist



sandigen Charakter aufweisen, in denen aber immer wieder Moränen nachgewiesen wurden.

Im Gebiet westlich des Wellbrig bis Schötz, Gläng und im nördlich davon gelegenen Wiggertal über Nebikon, westlich Dagmersellen, Reiden, Zofingen, Oftringen wird das Bild einfacher, indem (in der Talachse) der Fels in ca. 25m Tiefe angetroffen wird. Die Lockergesteinsauffüllungen setzen sich meist aus locker gelagerten Kiesen (Niederterrassenschottern), teilweise durchsetzt mit Moränenlagen und älteren (verkiteten) Schottern zusammen.

Bei Untersuchungen Wasserversorgung Nebikon sind südlich dieser Ortschaft, ca. 640.400/225.900, ca. 496müM, unter den Niederterrassenschottern 3m - 4m Moräne aufgezeigt worden. Der Fels folgt zwischen 20,0m - 23,0m Tiefe.

Die Schottermächtigkeit über dem Fels beträgt bei 2/14 640.423/228.376, 478 müM, 13,2m, bei 2/15 640.760/229.200, 474 müM, 13,6m und bei 2/16 640.651/229.603, 472 müM, 10,6m.

Unterhalb Dagmersellen sind in 2/17 640.550/230.400, 468 müM, im oberen Teil der total 20m starken Niederterrassenschotter verlehnte, moränenartige Lagen eingeschlossen (evt. prähochwürmzeitliche Schotter).

Noch unterhalb von Reiden 2/19 639.210/233.940, 448 müM, ist sowohl in den drei Sondierungen, wie auch in der Grundwasserfassung Pritschmatten in den durchschnittlich 22m Niederterrassenschottern, je zwischen ca. 9m - 14,0m eine hart gelagerte Moräne unbekannten Alters eingeschaltet (1. Maximalvorstoss des Hürnbachlappens übers Uffikermos oder Uebergang Niederterrassenschotter - ältere Schotter?).

Bei 2/20 638.350/235.970, 435 müM, ist 23,8m Schotter, bei 2/21 638.000/236.550, 433 müM, ist 22,3m Schotter, bei 2/22 637.236/239.268, 424 müM, ist 28,0m Schotter, und bei 2/23 635.960/239.680, 410 müM, ist 26,0m Schotter, je bis zum Fels.

Unterhalb Oftringen-Aarburg im Einflussbereich des Rhone-Aaregletschers fand eine Vermischung von Aare- und Reusschottern statt.

In dieser Region konnte die Hauptproblemstellung, den Verlauf des Felsuntergrundes zu eruieren, mit den z.Z. zur Verfügung stehenden Informationen nur teilweise geklärt werden. Vor allem im intramoränen Bereich des Wauwilermooses und des unteren Rottales können noch keine klaren Schlüsse über unterirdische Talwege gezogen werden.

Trotzdem hat das genaue Studium der vorhandenen Daten Auskünfte über Eisstände, Akkumulations- und Erosionstätigkeiten gebracht, die hier kurz zusammengefasst werden.

Beim Eisaufbau kam es in der Gegend Gugleren-Hetzligen zu einer Konfluenz von Rottaleis und einem Seitenarm des Suhrentallappens, der über die Senke bei Buttisholz ins Rottal einfloss.

Gleichzeitig stiess auch Eis über das heutige Kleinemmetal gegen Westen vor, wobei die nördliche Randkette des Pilatusgebietes die Begrenzung bestimmten (vgl. Kapitel 5).

Zur Zeit des 1. Maximalvorstosses im Mittelwürm (ca. 75.000 yBP) reichte das Eis im Süd-Südwesten des Untersuchungsgebietes bis an die Nordhänge des Pilatus und drang ins Rümli- und Fischenbachtal (bis an die Bramegg) und an die Napfaufläufer vor. Dabei bildeten die Molassehügel Aemmenberg, Chraienbüel, Geissberg, Schwandberg und im Westen der Willisauer Wellbrig, Hohwald, Willbrig, Hinter Buttenberg, Dachsenberg Hindernisse, zwischen denen das Gletschereis durchdrang. Im Raum Wolhusen kam es dabei zu einer Konfluenz von Waldemme-Eis mit dem "Kleinemme-Eis", wie die Moränenstände beim Schwandenhof-Vorder Aemseren, resp. Egg-hof-Obermoos-Aernihof südlich Wolhusen verdeutlichen. Dabei ist über Wolhusen, über Seeburg-Tuetenseeli, über Blochwil-Rötelberg und vor allem auch über das Ostergau Eis ins Tal der Seewag eingedrungen. Ein grosser Eisstrom floss damals entlang dem Wellbrig und Hohwald gegen Norden und vereinigte sich mit dem Eisstrom der vom Suhrental über das Wauwilermoos nach Westen vordrang. Das Eis breitete sich nach Westen fingerförmig aus und drang über Alberswil nach Willisau, resp. Gettnau vor und über Schötz und Egolzwil gegen Westen und Nordwesten ins heutige Luthern-Wiggertal vor. Nördlich des Santenberges floss zudem noch Eis vom Suhrental über das Uffikermoos bis ins Wiggertal. (vgl. Kapitel 7).

Verschiedene Indizien weisen darauf hin, dass dieser 1. maximale Eisvorstoss nur von kurzer Dauer war.

Da einzelne Gletscherarme das Tal der Seewag und das Luthertal kreuzten und an die westlichen Hügelzüge anstiessen, bildeten sich an verschiedenen Stellen natürliche Stauseen. Die Ur-Wigger wurde nach Westen abgedrängt und fand einen Abflussweg zwischen Willisauer-Willbrig und Buttenberg über Gettnau-Niederwil nach Norden.

Die Eisrandlagen sind nicht überall genau bekannt, weil tiefer liegende Moränenwälle in Stauseeablagerungen oder vor allem in Flussschottern "ertrunken" sind. Das ganze beschriebene Gebiet stellt ein typisches Randgebiet eines grossen Gletschers dar.

Die markanten Moränenwälle des Maximalstadiums (ca. 25.000 yBP) verdeutlichen, dass die Gletscher zu jener Zeit länger stationierten. Die Eisrandlagen lassen sich aus den Längs- und Querprofilen deutlich herauslesen. Zum Maximalstadium gehören die markanten Wälle über Egolzwil, Hoostris, Ausserdorf, die das Wauwilermoos abgrenzen, die Wälle zwischen Hohwald-Wellbrig und Staldenberg-Blumenberg bei Gishubel und bei Grosswangen-Hueben, die Moränen bei Blochwil und am Geissberg, sowie im Südwesten die Moränenzüge über Dachsigwald, Chriesbaumen, Hohrüti, Wiprächtigen, hinüber zum Schächbüelwald. Westlich Werthenstein vereinigte sich der letztbeschriebene Gletscherast mit Eis, das über das heutige Kleinemmetal bis in die Gegend von Wolhusen vorrückte.

Beim Rückzug des Gletschers zu innern Staffeln des Maximalstadiums und vor allem zu den Rückzugsstadien muss sich die "Ur-Kleinemme" (randglaziale Entwässerung) bei ihrem Lauf von Werthenstein nach Wolhusen noch mehr in den Molassefels eingetieft haben. Bei Wolhusen nahm die "Ur-Kleinemme" noch Schmelzwasser des Waldemmegletschers auf, um von da weg als "Ur-Wigger" gegen Norden zu fliessen. Diese "Ur-Wigger" durchfloss dabei einige temporäre Stauseen, so dass es zu einer komplexen Akkumulations- und Erosionssituation führte.

Die Rückzugsstadien im Uffikermooos und Wauwilermooos sind in Kapitel 7 beschrieben.

Im Schlierenstadium trennte sich der Eisarm, der vom Suhrental nach Buttisholz vorstiess, vom Rottalarm. Im Rottal lag Gletschereis im Ruediswilermooos. Der Bilbach floss dabei noch nördlich von Ober und Unter Höchweid in die "Ur-Kleinemme", die auch damals nach Richtung Westen floss. Wo damals im Kleinemmetal das Eis stirnte, kann nicht mehr dokumentiert werden, da die Moränen wegerodiert sind.


Die Endmoränen des Zürichstadiums lassen sich nur noch im oberen Rottal feststellen, wo sie bei Moos und bei Hapfig markante Wälle bilden (vgl. Kapitel 5). Wie weit gegen Westen das Eis im Kleinemmetal noch stand, ist infolge der Informationslücke im Gebiet Aennigen, Schachen bis Langnau noch unbekannt. Ich vermute, dass auch zu der Zeit noch eine Entwässerung in Richtung Wolhusen stattfand. Erst beim sukzessiven Abschmelzen des Eises bis zum Hurdenstadium bildete sich im Kleinemmetal zuerst ein Stausee, der sich, sobald der Weg gegen Osten frei wurde, in diese Richtung entleerte.

## 7. Das Suhrental, incl. Wauwilermoos, Uffikermoos und die Region Sursee bis Rickenbach

Nachdem die wachsenden Gletscher die Molasseschwelle am Schlüsselpunkt Luzern überflossen hatten, stiessen sie beim weiteren Vorrücken im Norden auf die Felshindernisse der Südost- und Süd-Enden von Aemmenberg, Ruswilerberg, Erlösen und Lindenberg, sowie auf die nördlich des Reusstales gelegenen Felsschwellen zu den benachbarten Mittelland-Quertälern des Rottales, des Suhren-, Wynen- und Seetales. In der Senke von Neuenkirch-Rippertschwand liegt das Anstehende auf ca. 550 müM und gab da dem Gletscher den Weg ins Suhrental frei.


Die westlichen Molassehügel Homberg 838 müM, Ruswilerberg 846 müM, und der im Osten gelegene (im Süden noch zusammenhängende, sich nachher durch das obere Wynental aufteilende) Molassekomplex Bloosenberg-Erlösen bilden die seitlichen Eingangsabgrenzungen. Aus der Höhenkarte der Felsoberfläche des Anstehenden ist optisch deutlich sichtbar, dass grosse zusammenhängende Gebiete von Fels an den talparallelen Molassehügeln nur unterhalb den innersten Moränenzügen des Zürichstadiums, resp. oberhalb der Moränenzüge des Maximalstadiums, anstehen.

Da im ganzen intramoränen Teil des Suhrentals nur eine einzige Bohrung den Fels erreichte und diese Auskunft erst noch fraglich ist, (3/16 Spülbohrung, die nur 50 cm Fels anbohrte, was für einen sicheren Rückschluss zu wenig ist) entschloss ich mich, zwei Gravimetrieprofile zu legen.




Kartenausschnitt 1:200.000, reproduziert mit Bewilligung der Eidgenössischen Landestopographie, vom 28. Juni 1982






Kulisse Westseite 3'-3" Profil 3-3 Kulisse Ostseite




Im Taleingang auf der Höhe Rippertschwand-Neuenkirch, einer typischen Drumlin- und Rundhöckerlandschaft, sind von der östlich der Profilachse gelegenen Autobahn viele Informationen vorhanden. Sie zeigen alle nach wenigen Metern Moränematerial (2,0m - max. 10,0m) Fels. Oft wurde auch Fels direkt erbohrt.




Am Sempachersee-Anfang sind am Ufer, nahe des anstehenden Molassefelsens, am Fuss des Ruswilerberges für die Wasserversorgung Neuenkirch einige Rotarybohrungen ausgeführt worden. Es zeigt sich, dass der Fels steil absinkt. Die Bohrungen am Hang-

fuss 656.250/218.650, 509müM, ergeben nach 14,5m kiesigen Sanden bis auf 24,5m z.T. verkittete Kies-Sande, was auf Moräne schliessen lässt. Bei der Bohrung am Ufer 656.550/218.730, 508 müM, erfasste man oben Torf, dann bis ca. 8,0m Sand, darunter bis Bohrende von 24,5m tonigen Silt.



Das Profil O-O traversiert den Hang östlich des Sempachersees schief. Dadurch wird ein innerer Moränenzug des Zürichstadiums in Seenähe am Eichberg, ein äusserer, höherer jedoch erst am Rotbach gegen Hildisrieden hinauf, gekreuzt. In diesem Querprofil erscheinen daher diese beiden Seitenmoränen zu stark "höhenversetzt".




Aus den zahlreichen Bohrprofilen am Nordostufer des Sempachersees lassen sich mehrere kleine Einzelwälle innerhalb des Zürichstadiums verfolgen. Die Bohrergebnisse zeigen eine einfache Abfolge, indem unterhalb von Moräne direkt Fels folgt. Die Moränenmächtigkeit beträgt westlich Eich, 655.190/222.685 538 müM, knapp 17,2m, bei 654.824/222.831 525,5 müM, 22,2m, bei 653.830/223.800 527 müM, 28,3m, bei

653.779/223.753 513 müM, gar 34,2m, wogegen bei 653.427/224.213 513 müM, wieder nur 21,7m Moräne angetroffen wurde. Aus diesen Informationen ist zu schliessen, dass ein Moränenzug über Chalacher-Buechmatt in den Sempachersee hinein verläuft (innere Staffel des Zürichstadiums).

Einige interessante Bohrinformationen veranlassten mich, quer zum Tal am See-Ende ein Gravimetrieprofil zu legen.

Nordwestlich Schenkon wurde für die N2 bei 652.276/225.015 506 müM eine Bohrung auf 15m durchgeführt, die später noch auf 36,0m abgeteuft wurde. Nach 6,5m Torf, Seekreide und hellgrauem tonigem Silt folgte bis auf 10,4m Moräne, darunter bis 36,0m Kiese und Sande, wahrscheinlich eiszeitliche Deltaablagerungen, oder Vorstossschotter.

Von den fünf Bohrungen Bezirksspital Sursee, die ab der Mariazeller-Stirnmoräne abgeteuft wurden, ist hier die tiefste beschrieben: 3/1 651.480/224.420 517,5 müM ; die obersten 17,0m bildet eine hart gelagerte Moräne, dann folgt bis 27,9m ver-schwemmte Moräne, darunter grau geschichtete siltige Sandlagen (Seeablagerungen) bis 43,0m Tiefe, dann eine tiefere, sehr hart gelagerte Moräne bis zum Bohrende auf 45,0m.



Das Gravimetrieprofil 60-Sursee zeigt, dass diese tiefen Bohrungen nur den obersten Teil eines bei Sursee mächtigen Troges von ca. 150m Tiefe durchstießen.

Kleine Interpretierungsschwierigkeiten (Fehlerquelle) entstanden, weil am Profilende auf der linken Talseite nicht Fels ansteht. Nur 6015 und 6016 auf der rechten Talseite sind tatsächlich Felsstationen. Die Messungen dritter Priorität gegen Beromünster verhalfen zu einer sinnvollen Interpretierung, da südlich vom Profilpunkt 6028, auf 730 müM Fels ansteht und beim Erstellen des Filterbrunnens Schlösslimatte, bei Beromünster, im Jahr 1959, in der Nähe der Messstation 6024 bei 656.700/228.270 667 müM, in 13,6m Tiefe Fels angetroffen wurde. So liess sich die Regionalanomalie über die Profilpunkte 6016 und 6028 verifizieren. Der Hügel auf der linken Profilseite lässt sich in Verbindung bringen mit dem im Gutachten für die N2 (Büro von Moos, 1972) beschriebenen äussersten Moränenwall von Sursee, der im Surseerwald ins Tal einbiegt.

Als informativ haben sich die gravimetrischen Messresultate aus der östlichen Profilfortsetzung (Messstationen dritter Priorität) erwiesen. Die Reliefverhältnisse nördlich Tann am Bonenberg und Höchweidwald verursachten eine Abspaltung des Suhrentaleises, indem ein rechter Seitenast nach Richtung Rickenbach abgedrängt wurde. (maximaler Eisstand auf der Krete bei Haumässer auf 820 müM). Die Felsschwelle zwischen Grüt und Tann steigt nur auf ca. 570 müM an, die minimale Terrainhöhe jedoch beträgt ca. 640 müM. Zur Zeit des Schlierenstadiums war die seitliche Eisrandlage gerade etwa auf der Höhe Tann, Chommlen, Grüt, sodass nach dem Eisabschmelzen der Moränenabschluss wie ein Damm wirkte, der das Moos gegen das Suhrental abdichtete. Das Gebiet Moos gegen Gunzwil ist bis 100 m mit Lockermaterial unbekannten Alters und Zusammensetzung aufgefüllt.

Im 1. Maximalstand des Würm reichte der Gletscherlappen über Rickenbach. Der Bogeten bildete dabei ein Reliefhindernis. Dabei stiess Gletschereis bis an den Südhang des Stierenberges vor und drang ins Sagenbachtal ein. Schon Mühlberg (1910) erkannte richtig, dass der Maximaleisstand im Würm auf Höhe Buttenberg lag. Bohrungen in der Kiesgrube Buttenberg 653.280/230.230 790 müM zeigen bis auf Bohrende 26,4m moränenartigen Habitus.

In der Zeit des 1. Maximalstadiums kam es zu einem beachtlichen Eiszusammenfluss zwischen diesem Suhrentallappen mit Eisströmen im Wynental (vgl. Kapitel 8). Eine Tiefbohrung im Gmeinwald im Wynental (vgl. Kapitel 8) deutet auf eine Fortsetzung der Rinne vom Moos in Richtung Gunzwil gegen das Wynental zu, hin.

Die Stirnmoräne von Rickenbach bildet einen inneren Wall des Maximalstandes. Eine Bohrung auf der Seitenmoräne von Grütholz 654.110/228.480 753,5 müM zeigt Moräne bis zum Fels auf 42,1m Tiefe.

Die Schmelzbäche dieses Gletscherarms zur Zeit des Maximalstandes entwässerten grösstenteils übers Sagenbachtal ins Wynental.

Der oberste Hangteil des Blasenberges bildet eine Mittelmoräne zwischen dem oben umschriebenen Seitenlappen und dem Lappen des oberen Wynentales.

Ein innerster Wall des Maximalstandes ist über Kagiswil-Lochetten zu verfolgen, mit einem Gletschertor bei Gunzwil.

Auf der andern Suhrentalseite floss im Maximalstand Eis von der Nordostseite des Ruswilerberges und Gustibergwaldes an diversen Stellen ins Rottal hinüber (Buttisholz, Höhe Sigerswil).

Bei Sursee kam es durch den Molassezug Santenberg-Stockacher, bei dem an verschiedenen Stellen (bis nach St. Erhard) Fels aufgeschlossen ist, zu einer Abspaltung des Suhrentaleises nach Westen ins Wauwilermoos. Die Schwellenhöhe, die der Ron-Seitenlappen beim Eintritt ins Wauwilermoos überfliessen musste, ist nicht genau bekannt. Die Maximalstände dieses Rontallappens sind im Kapitel 6 beschrieben. Der nördliche maximale Eisstand am Santenberg bog damals im Cholirütiwald-Chätzigens ins Hürnbachtal ab. Leider ist vom ganzen Wauwilermoos keine Tiefeninformation vorhanden. Die beiden Stirnmoränen bei Seewagen und Hitzligen (Schlierenstadium) sind im Süden offen. Der äussere Moränenwall stösst im Norden bei der Strasse auf ca. 525 müM an Fels und lässt sich über Seerächen ins Uffikermoos (Stand bei Buchs) verfolgen. Der Innere zieht über St. Erhard nach Norden nach Knutwil.

Im Suhrental sind nördlich Sursee bis in grössere Tiefen sandige Ablagerungen vorherrschend, durchzogen (vor allem auf der Nordostseite des Tales) von kiesigen Partien. 3/11 651.300/225.500 500 müM zeigt ab 2,5m Oberflächenablagerungen bis 8,7m sehr hart gelagerte Moräne, im Liegenden bis 13,7m eine Kiesschicht, darunter bis Bohrende auf 35,2m Feinsande.

Bei 3/12 651.121/225.678 498müM folgt unter 8,0m Kies bereits Sand bis Bohrende 20,0m und bei 3/13 650.784/225.948 495 müM, ebenfalls nach 8,0m Kies bis 25,0m häufig geschichteter Sand, (Seeablagerungen).

Bei 649.819/225.634 492 müM fehlt der Kies. Bis 11,4m wurden zuerst sandige Deltaablagerungen durchbohrt, im Liegenden eine Moräne (bis Bohrende 20,0m).


Bei Untersuchungen für die Suhrenkorrektur wurden von Galgenmüli über Sackmatt nach Schauberen in den 15m Bohraufschlüssen durchwegs feinkörnige, teils geschichtete Seeablagerungen gefunden.

Auch auf der andern Talseite, in der Gegend Zollhus 650.880/226.800 496 müM brachten die Bohrkerne bis 14,7m Endtiefe nur Sand (mit nur einem Meter Kies zwischen 7,0m und 8,0m Tiefe).

Die lockere Lagerung dieser oberflächennahen, geschichteten, feinkörnigen Sedimente zwischen Triengen und Sursee und die Ortsbezeichnungen Sursee, Geuensee weisen darauf hin, dass die Verlandung eines "Sursees" (ein Pendant zum Hallwilersee) erst in historischer Zeit erfolgte.

Im weiteren sind nur Aufschlüsse am Hang, die Moränen und Fels aufzeigen, vorhanden.

Interessant ist noch die Bohrung bei St. Erhard, 648.544/226.242 512 müM, die nach 4,4m Moräne den Fels aufschloss. Sie beweist, dass innerhalb der Knutwilermoräne (Schlierenstadium) der Fels oberflächennah folgt.



Einer mündlichen Aussage von Herrn Arnold (Verwalter des Mineralbades Knutwil) zufolge, fand man im 20m tiefen Schacht (Mineralwasserprospektion) beim Bad Knutwil 647.900/229.250 492 müM, über praktisch die ganze Schachttiefe nur Lehm und im untersten Teil Moräne mit grossen Steinen. Dies weist darauf hin, dass der Fels auf der linken Talseite rasch absinkt.


Auf der rechten Talseite steht der Fels bei der Kantonsstrasse bei Büron an.

Die gesamten Informationen benutzte ich zur Verarbeitung eines Blockdiagrammes über die Region Koordinaten 647.000 bis 656.000 und 223.000 bis 230.00 (vgl. nächste Seite).

Im Hürnbachtal reichte der Gletscher im 1. Würmmaximum bis über Dagmersellen (vgl. Kapitel 6). Zwei innere Wälle des Würm-Maximums bei Reckenbüel und Stutzfeld sind auch durch Bohrungen dokumentiert. Bei 642.333/228.588 501,5 müM ist nach 3,7m siltiger Deckschicht Moräne bis Bohrende auf 15,1m, bei 642.999/228.699 506 müM Moräne über die ganze Bohrlänge von 15,6m sondiert worden. Bohrungen auf den Fels (zwischen dem Maximalstand bei Dagmersellen und dem Schlierenstadium bei Buchs) östlich von Uffikon zeigten bis auf grössere Tiefe nur feinkörnige Ablagerungen. Bei 644.420/228.700 498 müM sind bis 11,5m Torf und Seekreide, darunter mächtige tonige Silte (Seebodenlehme) bis 41,0m, und bis Bohrende auf 45,0m Sand, (in dem artesisch gespanntes Grundwasser zirkuliert) nachgewiesen.

Bei 644.381/228.746 500 müM fand man die feinkörnigen Ablagerungen bis 35,0m Tiefe, darunter bis 38,0m Sand, bis 39,0m eine dünne, aber fest gelagerte Moräne und zuletzt Fels. Küttel (1983) hat diese Bohrung pollenanalytisch untersucht und in rund 9m Tiefe Beginn Bölling (ca. 13.000 yBP), darunter Älteste Dryas (älter als ca. 13.000 yBP) festgestellt. Nicht gefunden wurden Sequenzen, die als Mittelwürm- oder Frühwürm-Interstadiale gedeutet werden könnten. Er schliesst daraus, dass die Stirnmoräne im Maximalstadium im Hochwürm, d.h. vor rund 25.000 yBP gebildet wurde.

# Blockdiagramm Suhrental 2.5 fach überhöht



Die mehrlagigen, gestaffelten Moränenwälle an der Ostflanke des Chrüzberges, die markant vom Suhrental ins Uffikermoos einbiegen, gehören oben zum Maximal-, unten zum Schlierenstadium. Infolge der Mehrlagigkeit werden wahrscheinlich (noch nicht durch Bohrungen dokumentierte) mächtige Abfolgen von Moränen und evt. Schottern vorhanden sein. Beim maximalen Eisstand entwässerten sich die Schmelzbäche über das Uerketal.


Auf der andern Suhrentalseite sind die Eisstände des 1. Würm-maximums auf der Höhe oberhalb Wetzwil und Schlierbach. Der Gletscher stand am Höchstweidwald und Buttenberg und entwässerte übers Sagenbachtal, resp. von der Höhe Schiltwald übers Rue-derchetal.

Beidseitig des Tales lassen sich die inneren Moränenzüge des Maximalstadiums gut bis nach Staffelbach verfolgen. Die Stirn-moränenwälle südlich Staffelbach markieren die Maximalstadien im Suhrental.

Zwischen den Stirnmoränen von Staffelbach und jener von Wilihof-Triengen (Schlierenstadium) biegen noch einige Seitenmoränen leicht zum Tal zu ein, (Winikon, Reitnau, Attelwil) die kleinere Pendelbewegungen des Gletschers dokumentieren.

Bei Triengen, ausserhalb der Moräne, 648.220/232.020 513 müM ist viel Kies vorhanden, (randglaziale Entwässerung). Bis 17,0m erbohrte man Kies, bis 18,5m eine Moräne, bis 23,5m Kies, bis 30,0m eine sandige Seeablagerung, bis 32,3m nochmals kiesige Schotter, unterlagert bis Bohrende auf 34,0m von Moräne.

In der Talachse sind einige tiefe Bohrungen vorhanden.




Eine für die Wasserver-sorgung Reitnau 3/15 646.750/233.015 482 müM abgeteufte loom-Bohrung zeigte bis 9,0m Sand, von 9,0m - 47,2m geschichtete Silte, von 47,2m - 54,2m Sande mit Kies (mit wenig artesisch gespanntem Was-ser), von 54,2m - 72,5m geschichteter toniger Silt (Seeablagerung), von 72,5m bis 81,3m eine Moräne, unterlagert von 2,0m saube-rem Grobsand (wasserfüh-rend, darunter von 83,3m bis 100,0m eine mächtige Moräne. Als ich von die-

ser Kernbohrung hörte, holte ich beim Geologen und bei der Ge-meinde die Bewilligung für Bohrkernentnahme für Pollenanalysen ein. Als alle Bestätigungen vorlagen, mussten wir mit Bedauern feststellen, dass das gesamte Bohrgut bereits in der Mülldepo-nie lag. Es sind dadurch mögliche wertvolle chronostratigraphi-sche Resultate verloren gegangen.

3/16 646.900/234.200 478 müM, eine Rotarybohrung zeigt feinkörnige Ablagerungen bis 81,0m, dann 0,5m fraglichen Fels.


Die intramoränen Bohrungen südlich Staffelbach zeigen, wie Moränen gegen die Stirn zu ansteigen. 3/17 646.350/235.550 476 müM brachte zuoberst 18,0m siltige Seeablagerungen, bis 24,0m eine Moräne, darunter eine wechselnde Abfolge von meist sandigen, (sogar teils geschichtet) kiesigen Ablagerungen, die als verschwemmtes Moränematerial taxiert wurden, bis Endbohrtiefe von 72,0m.



Die 58,0m tiefe Bohrung 3/18 646.250/236.025 475 müM brachte bereits nach 8,0m Seebodenlehen die hart gelagerte Moräne (bis 24,5m), darunter bis 42,0m verschwemmtes Moränematerial, unterlagert bis 54,0m von Kiesen und bis Bohrende kompakter, toniger Silt, unbekannten Alters.

Die an der Oberfläche vorhandenen Seebodenlehme dieser Aufschlüsse zeigen, dass auch an der Stirn moräne von Staffelbach ein See gestaut war, der sich bei der Mühle einen Abfluss geschaffen hat.

Extramorän folgt der markante Wechsel auf Niederterrassenschotter. Diese werden in diversen Gruben abgebaut.





Die Schottermächtigkeit über dem Fels beträgt bei:  
3/20 646.530/237.450 ca. 475 müM  
55,6m

3/21 645.810/238.260 461 müM  
32,2m

3/22 645.800/238.600 460 müM  
46,8m

auf der Höhe Holziken bei  
3/25 645.960/241.800 439 müM  
39,8m

3/26 645.880/242.460 434 müM  
37,2m.



Wie die Profile G-G und F-F aufzeigen, verändert sich die Situation in der Gegend Muhen, Oberentfelden, Suhr nicht.

Bei Suhr vermischen sich Suhren- und Wynen-Niederterrassenschotter und nach dem Durchgang zwischen Gönert und Oberholz vereinigen sie sich mit Aareschottern.

## 8. Das Wynental, inkl. der Transfluenz bei Reinach aus dem Seetal

0-0

0-0





Kartenausschnitt 1:200.000, reproduziert mit Bewilligung der Eidgenössischen Landestopographie, vom 28. Juni 1982

Ein mächtiger "Pfeiler" nördlich Luzern, zwischen Rothenburg und Hildisrieden, in Form eines Hügelzuges aus oberer Süsswassermolasse, versperrte dem sich aufbauenden Eis lange den Weg ins Wynental. In der Zwischenzeit war Eis bereits ins westliche Suhren-, resp. östliche Seetal eingeflossen.

Da die Moränenzüge bei Hildisrieden Zürichstadium markieren, ergibt sich, dass zu dieser Zeit das Michelsamt (Beromünster) schon eisfrei war, evt. abgesehen von Toteis im Zungenbecken von Neudorf-Beromünster.


Aus den Längensprofilen 4-4 in dem die östliche und 4'-4' in dem die westliche Kulisse gezeichnet ist, ersieht man, dass das Tal ab Gormund bis Beromünster leicht, zwischen Beromünster und Menziken steiler, zwischen Reinach und Oberkulm sanft und nachher gleichmässig gegen Suhr zu absinkt.





4'-4' Profile 4-4


Kulisse Ostseite



Im ganzen oberen Wynental sind nur sehr wenig Bohrinformationen vorhanden. Bei Neudorf quert ein Wall des Zürichstadiums das oberste Wynental. Ein Bohraufschluss ausserhalb dieser Moräne stammt vom Filterbrunnen Paradiesli 4/8 658.310/226.150 661 müM. Nach 2,0m Lehm folgt bis 7,7m Kies (Flussschotter), bis 17,2m sandige Seesedimente, darunter bis zur

Brunnenbasis auf 18,2m Moräne.

Im Wiholz in der Nähe des Flugplatzes Beromünster bei 657.620/226.900 651 müM erbohrte man den Fels auf 47,5m Tiefe. Bis 18,5m fand man meist sandigen Bachschutt aus verschwemmter Moräne, darunter bis zum Fels eine hart bis sehr hart gelagerte Moräne.




Auch vom Raum Beromünster existieren nur wenig Bohrunterlagen.

Bei der Erstellung des Filterbrunnens im Jahre 1947, beim Durchbruch der Wyna durch die Stirnmoräne von Beromünster (Schlierenstadium?), 656.940/227.740 646 müM, fand man bis 4,0m tonigen Silt, bis 15,0m siltigen Kiessand, darunter eine harte, undurchlässige Schicht (Moräne?) bis 16,0m.

Im Filterbrunnen aus dem Jahr 1959, 656.700/228.270 667 müM wurde von 0m - 5,0m siltiges Material und bis 12,2m Kies entnommen. Darunter ist man auf Moräne bis 13,6m gestossen, gefolgt von Fels.

Die geophysikalischen Messungen dritter Priorität deuten darauf hin, dass bei Beromünster der Fels in geringer Tiefe folgt. Die Felsschwelle (von etlichen Metern Lockergestein bedeckt) störte ein hindernisloses Abfliessen des Eises gegen Norden.

Im Wynental nördlich Beromünster dagegen sind tiefe Bohrsondierungen vorhanden, die ein besseres Verständnis der Region ermöglichen.



Eine Bohrung am Wallende beim Gmeinwald, 4/12 656.010/231.450 603 müM, die ins Längenprofil hinein projiziert wurde, zeigt bis 51,0m Tiefe Moräne, bis 61,0m Kies, bis 72,0m Schichten von Silt und Kies, darunter bis 79,0m locker gelagerte Kies-Sande, bis 90,0m verschwemmte Moräne mit Sandzwischenlagen und dann (513 müM) den Fels.

Diese Bohrung verdeutlicht, dass eine Rinne, die vom Moos ins Wynental hinüberzieht, wahrscheinlich ist (genaue Lage und Form heute noch unbekannt).

Auch in der Kiesgrube 656.200/231.400 ist Moräne, darunter Flussschotter zu erkennen.

Vom Raum Menziken-Reinach sind aus den vielen Unterlagen die wichtigsten zitiert:


Bei 4/9 656.920/230.850 591 müM, in der Talachse, fand man bis 5,0m Moräne, bis 11,0m eine sandige Zwischenlage, bis 26,0m eine mittlere Moräne, bis 35,5m Sand, bis 40,0m Kies, bis 48,5m eine dritte Moräne, unterlagert von Fels.

Auch bei 4/10 657.000/231.220 569 müM lokalisierte man den Fels erst in 30,0m Tiefe und es wurden drei voneinander durch Sand und Kies getrennte Moränen durchfahren.

Bei Usserdorf zieht ein Moränewall gegen die Wyna zu. Im Zusammenhang mit einem Projekt Seetalbahnverlegung wurde direkt auf dem Wall, bei 657.910/231.872 634 müM nach 5,0m siltigem Gehängelehm bis 16,2m Moräne durchbohrt, unterlagert von Fels.

Nördlich von 4/11 wurden bei 4/13 656.800/231.810 559 müM nur noch zwei Moränen bis zum Fels erbohrt. Man fand die Schichtabfolge: 0m - 12,0m Kies, 12,0m - 28,0m fest gelagerte Moräne, 28,0m - 34,0m Kies, 34,0m bis zum Fels in 38,0m die untere Moräne.


Auch 4/16 656.720/232.640 546 müM zeigt bis 19,5m eine obere Moräne, bis 33,0m feinsandig bis siltige Seeablagerungen, darunter bis zum Fels auf 42,0m eine untere Moräne.



Das Bohrprofil 4/19 bei Leimbach, 655.740/235.200 516 müM, zeigt, dass der Fels nochmals übertieft ist, indem er erst in 86,0m Tiefe auf Kote 430 müM folgt. Zuerst wurde bei der Bohrung 4,5m Torf, bis 8,0m Kies, bis 58,0m toniger Silt, darunter Moräne bis zum Fels gefunden.

Für die Zetzwiler Wasserversorgung wurde beim Erstellen des Filterbrunnens bei 652.740/237.780 493,5 müM, 1,2km nordwestlich des Zetzwiler-Walles, bis 18,0m Moräne, bis 33,5m Kiese mit grossen Steinen und darunter ein abrupter Wechsel zu Seebodenlehm bis auf Endtiefe von 40,0m gefunden.

I-I




Andere Ergebnisse aus Rotarybohrungen in dieser Umgebung zeigen den Fels erst auf grosser Tiefe; so z.B. 4/21 653.130/237.630 495,55 müM: teils sehr hart gelagerte Kiese (Moräne?) bis auf 29,0m, darunter bis auf ca. 90,0m graue siltige Seeablagerungen, unterlagert von härterem Material bis zum Fels auf 96,4m.


Auch 4/23 652.590/238.380 495 müM gibt ein ähnliches Bild, indem bis auf 36,0m Tiefe Kiese, teils verkittet (Moräne?), mächtige, weiche Lehmpartien bis ca. 74,0m, hart gelagerter Lehm mit Steinen (Moräne?) bis 84,6m und darunter Fels folgen.

Auch die wenigen Aussagen vom im Jahr 1949 erstellten Filterbrunnen Oberkulm 4/25 651.700/238.850 479 müM sind informativ. Leider fehlt die Angabe für das erbohrte Material bis 29,0m, doch entnahm man von 29,0m - 31,0m Kies locker gelagert, von 31,0m - 33,5m Kies hart gelagert mit Steinen (Moräne?), darunter bis zum Fuss des Brunnens auf 39,0m blaugrauen Lehm.

H-H



G-G




In der Gegend zwischen Oberkulm und Gränichen fand ich keine Unterlagen.

Das Tal ist bei Gränichen mit typischen Niederterrassenschottern aufgefüllt, wie 4/30 649.500/246.150 405,5 müM beweist. (1,0m lehmige Deckschicht, Niederterrassenschotter bis 30,2m, unterlagert von Fels).

Profil F-F


F-F

Aus den Profilen F-F und E-E ist die Situation beim Zusammenfluss Wyna-Suhre und nördlich davon ersichtlich.



Profil E-E

E-E



4/32 648.390/248.445 382 müM bei Buchs beinhaltet bis 31,8m meist sauberen Kies, (mit einer Sandlinse zwischen 17,5m - 20,1m), darunter Sand mit Kies, fest gelagert bis zum Fels auf 35,5m.

Bei Aarau steht in der Altstadt Fels an. Oestlich der Stadt findet man unter Schottern Moräne (Riss). Als Beispiel sei 4/34 647.450/249.420 382 müM erwähnt, bei dem unter 19,5m mächtigen Kiesen bis zum Fels auf 29,6m eine z.T. hart gelagerte Moräne angetroffen wurde.

Gesamthaft gesehen ist die Region zwischen Beromünster und Zetzwil im Wynental sehr interessant und soll hier noch detaillierter umschrieben werden.

Die rechte Wynentalseite wird von den Molassehügeln Erlösen und Homberg, die Linke vom Blasenbergs und Stierenberg begrenzt.

Auf der rechten Talseite fällt die nördliche Fortsetzung der Erlösen gegen Reinach ab. Nach der "tiefen" Talverbindung Seetal-Wynental, zwischen Beinwil und Reinach (ca. 560 müM) stellt

sich eine Relieferhöhung vom Homberg bis auf die Höhe von 709 müM ein.

Anders sieht es in diesem Abschnitt auf der linken Talseite aus. Nördlich des Blosenberges (802 müM) gibt es einen Uebergang vom Suhren- ins Wynental (Gunzwil). Weiter gegen Norden bildet der Stierenberg die linksseitige Flanke (vgl. Kulissen der Tallängsprofile).

Im 1. Maximalstadium lagen die Erlosen, wie der Blosenberg unter Eis. Am Blosenberg kam es zu einer Nahtstelle zwischen dem Wynentalast und dem Seitenlappen des Suhrentalarmes. Auf der Stierenbergostseite reichte das Eis bis max. 750 müM, auf der andern Talseite am Hombergsüdhang bis auf ca. 700 müM. Verlängert man wynentalabwärts, ein mit den Nachbartälern vergleichbares "normales" Eisgefälle berücksichtigend, die Eisrandlage, so stirnte der Gletscher im 1. Maximalstadium in der Region Oberkulm. Wie in den Nachbartälern hat dieser kurzfristige 1. Maximalvorstoss keine markanten Moränenwälle hinterlassen.

Auf diese Weise lassen sich die grossen Findlinge in Kiesgruben talabwärts von Zetzwil (die nicht fluviatil transportiert wurden) und die Bohrerergebnisse 4/21 bis 4/23, die ein zugeschottertes Zungenbecken verdeutlichen, erklären.

Beim Eisaufbau bis zum Maximalstand kam es im Gebiet Beromünster bis Reinach zu Eiskonfluenzen aus verschiedenen Richtungen. Zum Eisstrom von Süden her aus dem oberen Wynental gesellte sich der Seitenarm des Suhrentallappens, der übers Moos nach Nordosten floss (vgl. Kapitel 7). Vom Seetal her floss zuerst Eis über Beinwil, beim Maximalstand auch über den nördlichen Erlosenausläufer ins Wynental.

Dies führte zu einer komplexen Situation in dieser Region. Die detaillierte Gletscherentwicklung und die einzelnen Abflussverhältnisse in den verschiedenen Rückzugsstadien sind noch nicht vollständig geklärt.

Im Maximalstadium stirnte das Eis bei Zetzwil. Dabei bildeten sich die markanten Moränenwälle, die man auf der rechten Talseite über den Südhang ins Seetal (Seetalseitenarm, der ins Wynental eindrang und sich ausbreitete) und auf der linken Seite über Gontenschwil, den Osthang des Stierenberges über Burg und jenseits des Rickenbaches über die Gmeinweid in Richtung Gunzwil verfolgen kann. Es wird auf Grund der Moränenlagen deutlich, dass damals dem Wynentaleis noch beträchtlich Eis vom Suhrental-Mooslappen (bei Niederwil und Gunzwil) zufluss, dessen Ablagerungen den Wynalauf gegen Osten zwangen. Erst in der Zeit zwischen Maximal- und Schlierenstadium kam es zur Trennung der beiden Eisströme.

Zwischen Menziken und Reinach quert ein in der Mitte offener Moränenwall das Tal. Auf der westlichen Talseite endet der Wall beim Erreichen des Talgrundes zwischen Eichbüel und Pfeffikon. Auf der östlichen Talseite lässt er sich über Weiermatt verfolgen.

Ein innerer Wall bei Usserdorf ist in der Mitte ebenfalls offen. Er kann auf der linken Talseite über Aemmet, auf der rechten Seite gegen die Erlosen weiterverfolgt werden. Es handelt sich dabei um Rückzugsstaffeln, die zwischen Maximal- und Schlierenstadium gebildet wurden.

## 9. Das Seetal



Der Seetallappen des Reussgletschers ist der östlichste Arm, (ein ganzes Tal einnehmend), der sich über den Schlüsselpunkt der Region Luzern aufbaute. Er ist zudem der Mächtigste.

Beim Vordringen nach Norden fand das Eis nach Ueberqueren der Barriere bei Luzern, an der Felsschwelle zwischen Erlosen und Lindenberg den niedrigsten Eingang aller bereits beschriebenen Täler, indem der tiefste Felsübergang zwischen Eschenbach und Ballwil unter 500 müM liegt.

Die morphologische Situation lässt sich im Seetal einfach beschreiben. Auf beiden Talseiten verlaufen parallel zur Achse Molasse-rücken, an denen die Seitenmoränen deutlich erkennbar sind. Lücken in diesen Molasse-rücken ermöglichten dem Seetallappen an zwei Stellen ein seitliches Abfliessen, nämlich bei Beinwil zwischen Erlosen und Homberg ins Wynental (vgl. Kapitel 8) und bei Fahrwangen-Sarmenstorf zwischen Lindenberg und Tannwald in Richtung Bünztal (vgl. Kapitel 10.2).

Wie weit der Seetalarm im 1. Maximalstadium nach Norden vorstiess, ist nicht genau bekannt. Auf jeden Fall stirnte der Gletscher damals südlich Schafisheim. Zu der Zeit war die Erlosen unter Eis, der Lindenberg jedoch Nunataker.

Die Stirnmoränenwälle im Seetal lassen sich eindeutig zuordnen: Maximalstadium bei Seon, Schlierenstadium bei Boniswil-Seengen und Zürichstadium bei Hitzkirch. Vom Herrenberg (südlich Ermensee) via Grosshübel verläuft ein äusserer, in der Mitte offener Wall südlich an Hitzkirch vorbei. Reste eines inneren Walles finden sich bei der Ruine Grünenberg.

Das Längsprofil auf der übernächsten Seite zeigt an Hand der in den Kulissen eingezeichneten Seitenmoränen die Eisstände in den

drei Stadien. Dabei wird aus der Lage der ungestörten Abfolge der Seitenmoränen am Erlosen und Lindenberg deutlich, dass je-

dem Stadium mehrere Einzelwälle zuzuordnen sind. Vor allem die inneren Staffeln des Zürichstadiums lassen sich auf beiden Talseiten gut verfolgen.

Im Maximalstadium waren Erlösen und Lindenberg Nunataker.

Wie der Kartenausschnitt mit den eingetragenen Bohrerergebnissen "Reusstal bei Emmen, inkl. Gegend Eschenbach" (vgl. Seite 22) illustriert, ist in der Drumlinlandschaft bei Eschenbach der Untergrund detailliert abgetastet worden. Die Bohrerergebnisse von 5/3, 5/4 und 5/5 (und einiger weiterer der Umgebung) sind aus der Karte ersichtlich. Der Aufschluss 5/6 bei Ballwil 665.585/222.640 504 müM zeigt ein ähnliches Bild (wie bei Eschenbach), nur dass der Schotter zwischen den beiden Moränen weniger mächtig ist (0m - 10,0m Moräne, 10,0m - 15,5m Schotter, 15,5m - 17,0m Moräne, darunter Fels). Eine Rotationskernbohrung bei 666.320/223.250 512 müM enthält zuerst 16,5m Moräne, z.T. hart gelagerte Schotter bis 39,0m, gefolgt von Moräne bis 40,5m, dann Fels.


Eine alte Bohrung, 5/7 664.835/223.340 ca. 500 müM brachte eine ähnliche Abfolge Moräne - Kies - Moräne bis zum Fels auf 32,0m.


Zwischen Hochdorf und Unteräbersol sind 1964 mehrere tiefere Untersuchungen bis zum Fels erfolgt. Die Ergebnisse sind alle ungefähr analog, indem oben einige Meter Sand, dann eine ca. 10 - 15m starke Moräne folgen. Darunter fand man bei den Bohrungen in der Nähe Hochdorf nochmals eine ca. 10m mächtige Kiesschicht, die gegen Unteräbersol zu ständig an Mächtigkeit abnimmt. Bei allen Aufschlüssen ist eine 1m - 3m starke Moräne, gefolgt von Fels vorhanden. Die Lockergesteinsmächtigkeit nimmt von 39,0m bei Hochdorf laufend ab und beträgt bei Unteräbersol nur noch 20,0m.


Die Entstehungszeit der Eschenbacherschotter ist an Hand der Bohrungen nicht ersichtlich und kann auf diesem Wege somit nicht eruiert werden. Die Mächtigkeit der oberen Moräne lässt vermuten, dass dieselben (bei Rückzugsstaffeln) im Zürichstadium gebildet wurden, sodass die darunter liegenden Schotter älter sind (Vorstössschotter?). S. Müller (1981) postuliert das Vorhandensein einer grossen Toteismasse am Nordhang des Rooterberges zur Zeit der Bildung des Ballwiler-Eschenbacher-Schotterkomplexes und datiert das Alter der Schotter in die Zeit des Frühwürm.

Westlich Hochdorf, gegen den Baldeggersee zu verändert sich die Schichtabfolge markant. Bei 5/8 664.035/224.075 470 müM werden die obersten 27,0m mit meist siltigen (oft Seekreide), teils auch sandigen weichen Lagen gebildet. Zwischen 27,0m und 29,6m folgt Moräne, unterlagert von Fels.

Der markante Wechsel der Schichtabfolge zwischen 5/7 und 5/8 lässt sich folgendermassen erklären: Beim Gletscherrückzug schmolz das Eis an der Felsschwelle (Höhe 480 müM) zwischen Ballwil und Hochdorf durch, wobei das im Baldeggersee liegende Eis als Toteismasse abgetrennt wurde.










Im Zwiischenseengebiet sind einige interessante Bohrungen abgeteufelt worden. An der Hauptstrasse bei Gelfingen 662.195/230.005 467 müM kernte man zuerst bis 9,0m siltige, z.T. torfige Verlandungs- und Seesedimente, bis 18,3m heterogen aufgebaute Bachschutt- und Deltaablagerungen, bis 25,7m eine obere Moräne, bis 29,4m feingeschichtete Sande, unterlagert von einer mächtigen Moräne bis zum Fels, der auf 56,4m folgt. Kützel (schriftl. Mitteilung) hat mit Hilfe von Pollenuntersuchungen die Zone zwischen 8,0m und 9,5m ins Holozän datiert, Bölling wurde nicht lokalisiert, doch fand er in der tieferen Bohrung Anzeichen von Aeltester Dryas (älter als ca. 13.000 yBP). Die Proben der siltigen Feinsandzone zwischen 25,7m und 29,4m waren pollenarm mit Sekundärpollen. Aehnlich wie bei Uffikon (vgl. Kapitel 7) ist kein Mittelwürm- oder Frühwürm Interstadial ersichtlich.

Die Stirnmoräne des Zürichstadiums wurde bei 662.080/230.702 485,5 müM direkt angebohrt. Dabei war die Moränenstärke 32,5m, unterlagert bis Bohrende auf 39,0m von Schottern.


Ausserhalb des Stirnmoränenkranzes ergibt 5/12 661.495/231.075 476 müM Schotter bis 21,8m, Moräne bis 23,0m, untere Schotter bis 28,5m, eine untere Moräne bis 39,0m, einen dritten Schotterkomplex bis 47,7m, darunter bis 59,7m geschichtete sandige Deltaablagerungen und bis Bohrende auf 62,0m harte siltige Seesedimente.




Wie die 203m-Bohrung 5/13 660.490/231.840 460 müM bei Ermensee,

bei der man noch nicht auf Fels stiess, beweist, ist das Seetal stark übertieft. Es wurden bis 25,0m gletschernah abgelagertes Schottermaterial und bis 32,0m eine sandige Deltaablagerung aus den Kernen entnommen. Die darunter liegenden Sedimente sondierte man mit der Rotarymethode, so dass nicht allzu detaillierte Schlüsse über diesen Bohrabschnitt gezogen werden können. Von 32,0m - 115,0m folgten hellbraungraue weiche Silte und lockere Sande mit steifen Zwischenlagen (meist Seesedimente), von 115,0m - 138,0m eine hart gelagerte Moräne, von 138,0 - 182,0m hart gelagerte Kiese z.T. mit Sandpartien durchzogen, von 182,0m - 203,0m (Bohrende) hart gelagerte Sande. Lorenz schreibt (im hydrogeologischen Bericht Büro Mengis und Schmidt, 1975) die hart gelagerten unteren Sedimente der Risseiszeit zu. Es lässt sich aus den Bohrerergebnissen folgern, dass die Uebertiefung des Seetales (und analog sicher auch bei anderen Tälern) präwürmzeitlich bewerkstelligt wurde und dass beim Vorstoss des Würmgletschers in diesem Talabschnitt nicht alle alten Sedimente ausgeräumt wurden.

Die Bohrung am Erlösenhang oberhalb Ermensee 659.669/231.772 489,5 müM brachte unterhalb 6,0m Gehängelehm und Rutschmasse Moräne bis zum Fels auf 15,0m Tiefe. Der Fels muss also sehr steil gegen das Tal zu absinken.




Hier je eine Bohrung aus Serien bei Fahrwangen und Sarmenstorf, im Bereich der Transfluenz ins Bünztal:



660.860/239.255 533 müM bei Fahrwangen: Bis 12,0m sauberer Kies, bis 18,0m lehmiger Sand mit Steinen (Moräne?), bis 24,0m Sand, bis 28,3m festgelagerte Moräne, bis 39,0m festgelagerter Sand mit Steinen, oft moräneartig, darunter Fels.

660.980/241.050 ca. 512 müM bei Sarmenstorf: bis 4,5m Kies, bis 22,0m toniger Silt mit Sand, Kies und Steinen (meist Moräne?), bis 27,9m Feinsand und Silt, meist geschichtet, bis 31,9m Lehm mit Sand, Kies und Steinen (Moräne?), darunter bis Bohrende auf 35,0m geschichteter Silt.




Im mittleren Seetal fehlen bis heute Informationen bis zum Fels. Vor allem im Abschnitt zwischen Hallwilersee und Maximalstadium wurde nur oberflächennah sondiert.

5/16 657.960/  
241.170 449 müM  
informiert, dass  
bei Seengen bis

in Tiefen von ca. 27,0m weiche, geschichtete Seeablagerungen, zuoberst mit Torf und Seekreide vorhanden sind.

Bei 5/18 657.140/242.840 458 müM sind bis 3,8m junge Bachschuttablagerungen, bis 8,5m eine obere Kiesschicht, bis 20,0m eine festgelagerte Moräne, bis 27,0m eine untere Kiesschicht, bis Bohrende auf 35,0m feinsandige Seeablagerungen vorhanden.

G-G




An der Aussenseite des Maximalstadiums (im Uebergangskegel) bei Seon 5/19 654.300/245.600 440 müM ist mit einer Bohrung auf 100,2m der Fels nicht erreicht. Bis 12,0m fand man Moräne, bis 97,0m kiesige Partien, teils schichtweise verkittet, darunter grauen mageren Lehm bis Bohrende.

Südlich Schafisheim zeugt eine Kiesgrube von mächtigen Niederterrassenschotterablagerungen. Ca. 5m unter der Oberfläche erscheint ein Band mit groben kantigen Blöcken, die man dem 1. Maximalstand zuweisen kann. Darunter befinden sich ca. 50m mächtige ältere würmzeitliche Schotter, unterlagert von harten verkitteten präwürmzeitlichen Schottern.


Bei 5/20 654.393/247.280 429 müM eruierte man über die ganze Bohrlänge bis zum Fels auf 63,0m Tiefe teils verkittete Kiese, oft mit Steinen und Blöcken durchsetzt. Bei 5/21 654.151/247.463 426 müM stellte sich Fels ab 65,8m ein, darüber durchwegs Kies, der teils so stark verkittet war, dass man nur nach Meisselarbeit weiterbohren konnte. Bei 5/22 654.225/247.897 420 müM kam der Uebergang zum Fels unterhalb Schotter (bis 53,0m) und festgelagerten Sanden bei 60,0m Tiefe.

F-F



Bei 5/23 653.970/249.350 400 müM,  
bei 5/24 653.930/249.820 394 müM,  
bei 5/25 654.400/250.370 393 müM und  
bei 5/26 654.235/250.890 376 müM stiess man bei allen Sondierungen nach ca. 40m - 50m Schottern nicht auf Fels, sondern auf siltige Seeablagerungen unbekannter Mächtigkeit.

E-E



Eine 155-m tiefe Bohrung, bei der Fels erst in 145m-Tiefe zum Vorschein kam, auf der westlichen Seite des Seetaleinganges ins Aaretal, bei 651.520/250.070 378 müM verdeutlicht, dass der Fels im Aaretal westlich von Rupperswil steil abfällt. Nur ca. 1 km westlich dieser Bohrung, auch ungefähr in der Talachse liegend, wurde der Fels in nur 16m Bohrtiefe sondiert. (vgl. Profil E-E). Unter ca. 27,0m Niederterrassenschottern wurde eine auf Bodenbildung schliessende Kiesschicht zu Tage ge-

fördert, unterlagert bis ca. 40,0m von älteren Schottern; darunter bis 50,0m Seeablagerung, bis ca. 55,0m ein tieferer Schotter, bis 112,0m präwürmzeitliche Seeablagerung, bis ca. 127,0m Schotter und dann Riss-Moräne bis zum Fels.

Die Abgrenzung einer Rinne oder eines Beckens lässt sich nach dem heutigen Informationsstand nicht genau festlegen. Ältere Gravimetriemessungen im untersten Bünz-Reusstal (vgl. Kapitel 10.2) sind nach Westen nicht bis zum Ausgang des Seetals weitergezogen. Dazu sind mir noch keine Informationen bis zum Fels im Gebiet östlich Lenzburg, bei Niederlenz und Möriken bekannt.

Bei 5/27 653.930/251.670 351 müM, nahe der Aare gelegen, ist in 51,5m Tiefe noch kein Fels vorhanden. Bei 5/28 653.950/251.760 351 müM, an der Aare gelegen, fand man ca. 22,0m Schotter, bis ca. 29,0m präwürmzeitliche Moräne, darunter Kalke des unteren Malm. Auch von Süden her fällt der Fels also steil ins Aaretal ab.

## 10. Der Reusseisvorstoss über das Zugerseegebiet


Zum Verständnis der ganzen Region ist das Studium der vorwürmeiszeitlichen Verhältnisse notwendig. Da ich in meiner Arbeit alle prähochwürmeiszeitlichen Ablagerungen nicht weiter gliederte, werde ich bei den Bohrkernbeschreibungen nicht detailliert darauf eingehen.

In der Risseiszeit griff ein grosser Seitenarm des Linthgletschers ins "Reussgebiet" über. Ein tiefes Tal, aufgefüllt mit mächtigen alten Lockergesteinsablagerungen, zieht vom Zürichsee über Schönenberg - Menzingen nach Inwil b. Baar-Zug. Dies lässt sich beweisen, indem bei tieferen Sondierungen aus der Region (Bohrungen bei Neuheim, Winzenbach, Menzingen) mehrfach Verrucano gefunden wurde.

Zur gleichen Zeit hat sich damals ein östlicher Teil des Reuss-Systems (analog wie in der Würmeiszeit) über das Gebiet des heutigen Zugersees aufgebaut. Dabei fand in der Region Zug eine Konfluenz von Linth- und Reusseis statt. Die vereinigten Eismassen bauten sich - der resultierenden Kraft der beiden Gletscherarme und vorhandener topographischer Reliefvertiefungen folgend - nach Nordwesten ins heutige Reuss- und Bünztal auf. Verrucano-Gesteine, in verschiedenen Bohrungen im Baarerbecken und bei Knonau vorkommend, bekräftigen diese Aussagen.

Zum Teil über 200 m mächtige (im Gebiet Menzingen gar über 300 m), alte, oft verkittete oder steife Lockergesteinsrelikte im Gebiet Menzingen-Neuheim, Lorzetobel, Inwil, Zug, Baarerbecken, Blickensdorf, Uerzlikon, Knonau sind teils durch Bohrungen nachgewiesen worden.

Die Gravimetriemessungen (Gassmann 1962, Pavoni 1962) in der Gegend Menzingen weisen auf die "Menzinger Rinne" hin.



Tiefe Kernbohrungen im Gebiet Winzenbachtal und Menzingen stiessen in diese tieferen Ablagerungen der Menzinger Rinne hinein. Die Tiefbohrung Winzwillen 10/1 687.792/226.997 674 müM durchfuhr nur bis 9,9m (nach wenig Gehängelehm) eine würmeiszeitliche Moräne, wobei ein Verrucano-Bohrkern in 8m Tiefe

bekräftigt, dass die Gegend östlich Menzingen im Würm vom Lintheis bedeckt war (vgl. Abschnitt 10.1, Situation im Würm Maximum). Zwischen 9,9m und 13,8m weist eine Verwitterungsschicht auf Bodenbildung hin. Unterhalb 13,8m wurde präwürmeiszeitliches, meist sehr hart gelagertes Bohrgut, das bis 116,4m moräneartigen Habitus aufwies und von 116,4m bis Bohrende auf 143,6m auf alte Seeablagerungen deutete, gefördert.



Kartenausschnitt 1:200.000,  
reproduziert mit Bewilli-  
gung der Eidgenössischen  
Landestopographie, vom  
28. Juni 1982

Auch bei der 60m-tiefen Sondierung Hasentalweid bei Menzingen 687.150/225.320 814 müM folgten im untersten Bohrabschnitt sehr hart gelagerte Moränen, die prätürmeiszeitlich sein müssen.

Auch die nördlich der Menzinger Rinne gelegene Bohrung, östlich Neuheim, 687.597/228.498 689 müM, die den Fels auf 84,7m erreichte, zeigte zuoberst noch starke türmeiszeitliche Moränen- und Schotterablagerungen bis ca. 50,0m Tiefe, darunter bis zum Fels sehr harte, ältere Sedimente.

Die Bohrung bei Hinterburg 685.670/228.145 656 müM brachte bis 2,0m Moräne, bis 30,0m Schotter mit moräneartigen Einlagerungen. Die tiefer gelegenen Schichten sind frühwürm- oder risseiszeitlich. Sie wurden bis zum Fels bei 55,1m durchfahren.

Oberhalb Zug wurden für die Sanierung der Lorzetobelbrücke und die Sanierung der Kantonsstrasse zwischen Talacher und Nidfuren eine grössere Sondierkampagne durchgeführt. Dabei geben Bohrungen an den Tobelkreten auf Höhen zwischen 600 und 650 müM Aufschluss über die oberen türmeiszeitlichen Ablagerungen, wobei in den unteren Bohrabschnitten die häufig sehr harten Lagerungsdichten auf ältere, gepresste, also überfahrene Sedimente hinweisen. Die im Lorzetobel eindrücklich anstehenden, teils zu Nagelfluh verkitteten Schotter sind prätürmeiszeitlich. (Nach dem Zürichstadium schlug die tiefenerodierende Lorze den Weg ins heutige Lorzetobel ein und legte die alten Lockergesteinsablagerungen frei).


Die an der Tobelbasis ausgeführten Sondierungen (Höhen um 540 müM) drangen, wie die durchwegs harte Lagerungsdichte beweist, in ältere Ablagerungen ein.

Ebenso durchfuhr die Bohrung beim EW-Haus, 684.620/226.080, 538 müM zuerst alte Seesedimente, darunter bis zum Fels in 56,0m Tiefe, (also Kote 480 müM - Nordflanke der Menzinger Rinne) alte Schotter.

Der Nordrand dieser Rinne bildet, wie der anstehende Fels in der Region darlegt, etwa die Linie Höllbach - Baar Grund; (wobei ich annehme, dass die in der geologischen Karte eingezeichneten Felspartien zwischen Grund und Geissbüel, südöstlich Baar, etwas zu weit nach Süden reichen.)

Die südliche Rاندlage der Rinne verläuft ca. über die Linie südlich Brettigen, südlich Menzingen, Allenwinden, Ussergrüt nach Zug. Dabei beinhaltet die an diesem Südrand gelegene Rutschmasse oberhalb Zug, deren Anriss-Stelle oberhalb St. Verena deutlich sichtbar ist, auch ältere Lockergesteinspakete. Die Rutschung selbst, deren Anriss man über die Grenze nördlich Kantonsschule, Lüssirain, Haarnadelkurve der Strasse oberhalb St. Verena, Klinik Liebfrauenhof gegen den See zu verfolgen kann, ist jüngeren Datums.

Die Tiefbohrung Inwil ZG 682.585/225.873 434,5 müM beweist, dass die Menzinger Rinne im Gebiet Zug in eine noch tiefere Rinne - die Blickensdorfer Rinne - die vom Zugersee übers



Baarerbecken, Blickensdorf, Uerzlikon, Knonau, Maschwanden ins Reusstal zu verfolgen ist, einmündet. An Hand der Rotarybohrung kann über die genauere Lockergesteinszusammensetzung nichts Eindeutiges ausgesagt werden. Wahrscheinlich sind mehrere Moränen vorhanden. Im unteren Bohrabchnitt war die Lagerungsdichte gross. Den Fels erreichte man in 119,0m Tiefe, also auf Kote 315 müM.

Bei der zweiten Rotary-Tiefbohrung im Baarerbecken, 680.295/226.760 424 müM, an der Nordflanke dieser Blickensdorfer Rinne gelegen, erreichte man den Fels auf 101,1m, also auf 323 müM. Nach ca. 25,0m feinkörnigem "Bohrgut" ist mehr kiesiges Material gefördert worden.

Die dritte Rotary-Tiefbohrung im Baarerbecken lag in der Rinneachse (vgl. Profil P-P). Sie wurde bei Blickensdorf 8/11, 681.812/228.455 437 müM abgeteuft und erreichte den Fels erst bei 222 m unter Terrain (Felskote 215 müM). Dabei durchbohrte man bis 26,5m feinkörniges Material, gefolgt bis 35,5m von Hartgelagertem (Moräne?). Bis auf 86,0m Tiefe folgte Feinsand und Silt, bis 108,0m Kies, bis 118,0m schlecht gerundeter Kies mit Blöcken (Moräne?), darunter mächtige, meist kiesige Serien, (bei denen Blöcke auf Moränenzwischenlagen deuten) bis zum Fels. Informativ ist ein Verrucanoblock in 217,0m Tiefe.

Die Rinne lässt sich weiterverfolgen an Hand der Resultate der Gravimetriemessungen Gassmann (1962) und verläuft über Uerzlikon - Knonau - Maschwanden. Bei Knonau brachte eine grosse Sondierkampagne detailliertere Auskünfte über die Zusammensetzung des Untergrundes. Der Kartenausschnitt 1: 25.000 auf der nächsten Seite zeigt optisch die erhaltenen Bohrresultate. Es sei die Tiefbohrung 677.020/230.330 448 müM erwähnt, bei der bis 60m gekernt und darunter mit Rotaryverfahren gebohrt wurde. Zuoberst fand man bis 11,0m Moräne (die einem inneren Zürichstadium zuzuordnen ist), bis 30,2m Kies, bis 39,0m sandige Deltaablagerungen, bis 53,9m Kiese, bis 70,0m sandige Deltaablagerungen, bis 119,0m siltige Seeablagerungen, darunter bis zum Fels in 205,0m Tiefe (also auf Kote 243 müM) durchwegs kiesige Abfolgen mit Moränenzwischenlagen.

Aus feinkörnigen Ablagerungen hat Welten an der Universität Bern (1978) Bohrkerne auf Pollen untersucht. Dabei hat er Würm-Interstadiale und Riss-Würm Interglazial diagnostiziert. (vgl. Eintragungen im Kartenausschnitt auf nächster Seite).


Der rechte Teil des Gravimetrieprofils Nr. 62 Rifferswil (vgl. Querprofil O-O) schneidet die Blickensdorfer Rinne leicht schief und zeigt deren Lage und Form.

Alle Informationen habe ich im Blockdiagramm Blickensdorfer Rinne, das über das Gebiet 676.000 bis 684.000 und 225.00 bis 233.000 erstellt wurde, verarbeitet. Aus den Felsisohypsen am rechten Rand des Blockdiagrammes ist der Eingang der Menzinger Rinne in die Blickensdorfer Rinne erkennbar. Es ist ersichtlich, dass innerhalb der Blickensdorfer Rinne noch eine unterirdische Felsschwelle auf ca. 330 m, zwischen Uerzlikon und Knonau, ein Maschwanderbecken von einem Baarerbecken trennt.



# Blockdiagramm Blickendorfer Rinne

2.5 fach überhöht



Prähochwürmzeitliche Ablagerungen sind in den Bohrungen zwischen Maschwanden und Obfelden, in der Kiesgrube Tambrig und in deren Umgebung lokalisiert worden.

In der Sondierung 8/24 673.986/234.180 412 müM, die von der Sohle der Kiesgrube aus abgeteuft wurde, kann der Uebergang von jungen, nicht stark vorbelasteten zu alten vorbelasteten Sedimenten aus der Kernbohrung ersehen werden. An der Kiesgrubenwand sind zuoberst Drumlinablagerungen vorhanden, bis OK Terrain und in der Bohrung noch 2,2m tief Schotter, bis 10,1m ein locker gelagerter Sand, der plötzlich in sehr steife Silte und sehr dicht gelagerte Sande (bis 17,1m), in denen artesisch gespanntes Grundwasser zirkuliert, übergeht. Bis Felsbeginn bei 35,9m eruierte man eine hart gelagerte Moräne. Augenfällig wird der Unterschied beim Vergleich der Ergebnisse mit den Bohrungen in der Reusstalebene. In 673.348/234.205, 387 müM z.B. sind die obersten 2,0m siltig und weich (mit organischen Beimengungen), dann folgen bis 7,2m locker gelagerte Kiese, darunter bis Bohrende der an der Basis der Kiese in der Reusebene oft angetroffene "Reusstallehm", der weich bis breiig umschrieben wurde.



Die Situation zur Würmeiszeit war während dem Eisaufbau einfacher. Der Linthgletscher fand beim Aufbau seitlich zwischen Schönenberg und Hirzel ein zu grosses Hindernis in Form seiner eigenen alten Ablagerungen und nahm Weg Richtung Zürich.

Dem würmzeitlichen Reusstallappen, der über das heutige Zugerseegebiet vorrückte, bot sich als direkter Weg gegen Norden der Raum über Cham - Steinhausen an. Dadurch sind mächtige ältere Lockergesteinsablagerungen - die heute als Relikte vorhanden sind - nicht ausgeräumt worden.

Die nachfolgenden Abschnitte 10.1 und 10.2 behandeln die würmeiszeitlichen Abfolgen der in der Situation 1 : 200.000 dargestellten Region.

### 10.1 Das Zugerseegebiet


Bei Brunnen erfolgte beim Eisaufbau die in Kapitel 5 beschriebene Aufteilung der beiden Reussgletscher-Hauptarme. Der Oestliche bahnte sich einen Weg Richtung heutigem Zugersee. Von Osten her strömte Muotaeis zu. Der Urmiberg wurde zuerst um-, später überflossen. Zur Zeit des Maximalstandes war die Eisoberfläche zwischen Rigi und Rossberg auf einer Höhe von ca. 1050m bis 1100 müM. Dabei kam es zum Ueberfliessen gegen Osten in den Raum Sattel-Rothenthurm und Sattel-Aegerital.





# Blockdiagramm Zugersee

2.5-fach überhöht



übertieft. Dies konnte mit den beiden Gravimetrieprofilen Nr. 51 Immensee und Nr. 50 Küssnacht nachgewiesen werden.

Beim Eisaufbau musste der heutige Seen-Engpass beim Chiemen durchdrungen und später der Chiemen selbst überflossen werden. Rechterseits bildete der Zugerberg Gleithang. Bei zunehmender Eismächtigkeit überfloss der vorstossende Gletscher die Region von Cham - Steinhausen und breitete sich gegen Norden zu aus. Dabei stiess aus dem Bereich "Schlüsselpunkt Luzern" noch ein Eisarm zu, der südlich des Lindenberges vorbeifloss.

Als die Gletscher im Maximalstadium bei Othmarsingen und nördlich Mellingen stirnten, (vgl. Abschnitt 10.2) lag das Eis in der Region Zug ca. 900 müM, am Zugerberg und am Milteldorfer Berg nordöstlich des Aegerisees auf ca. 950 - 1000 müM, am Walchwilerberg und an den Flanken am Südende des Aegerisees auf etwas über 1000 müM.

Dabei kam es bei Sattel zu einem lokalen Eisvorstoss über Rothenthurm nach Nord-Nordosten. Auf Grund der Höhenlagen der Seitenmoränen lässt sich der Stirnmoränenwall zwischen Schlüssel und Bibersteg dem Maximalstadium zuschreiben. Aeussere Wälle bei den Altmatt's sind dem Maximal- bis Schlierenstadium, die inneren Wälle der Altmatt's dem Schlierenstadium zuzuordnen.

Am Aegerisee sind die Eisstände an Hand von Seitenmoränen dokumentiert, die in die Kulisse eingetragen sind (vgl. Profil 9-9).


Der Gottschalkenberg und die Bruusthöchi und deren Ausläufer lenkten das Eis Richtung Nordwesten ab. Im Maximalstadium stiess der Gletscher, flankiert vom Zuger- und Wilerberg, gegen Norden vor. Ein kleiner Lappen überfloss bei Hinterwiden den Pass und drang östlich des Wilerberges noch minim nach Norden vor.

Nördlich des Wilerberges vereinigte sich das Eis mit demjenigen, das westlich des Zugerberges vorbeifloss.




Im Würmmaximum kam es zu der bereits beschriebenen Nahtstelle von ca. Schneitwald über Menzingen zum Albiskamm zwischen Lintheis und Reusseis.

Bei den Eisrückzügen entstanden im Raum Neuheim-Menzigen-Aegeri-Allenwinden komplexe Eisrandbildungen.

Die Lockergesteinsablagerungen am Gubel nordöstlich Neuägeri sind präwürmzeitlich. Die Hügelzüge bei Menzingen um den Lindenbergs gehören zum Maximalstadium. Schlierenstadium ist an der Ostseite des Lorzetobels von ca. Heitersstalden (westlich Gubel) nach Schönbrunn (westlich Menzingen) zu verfolgen, während Reste vom Zürichstadium noch an der Krete des Lorzetobels zu sehen sind. (Hydrogeologischer Bericht Dr. L. Wyssling, 1977).



Profil 9-9



Die Bohrung 9/5 bei Unterägeri 686.580/221.300 725 müM brachte bis Endtiefe auf 93,7m nur Silte und unten Sande, wobei beim Bohren durch die Sande laufend Grundbrüche eintraten, die auf lockere Lagerung schliessen lassen. Küttel (schriftl. Mitteilung) untersuchte die Bohrkerne pollenanalytisch. Er gliederte die obersten 8m dem Holozän zu. Zwischen 8m und 40m Tiefe deuten die Floren auf eine Sedimentation in der jüngeren Dryas (10.000 yBP) bis Bölling (12.000 yBP) und unter 40m stellte er kaltzeitliche Sedimentation fest.

Die Seitenmoränenabfolgen am Zugerberg lassen sich gut verfolgen. Im Maximalstadium entstand auf dem Zugerberg ein kleines Zungenbecken (Tiefe?). Die Wälle über Oberforen-Hinter-Geissboden und Vorder Banholz - Schwändi zeugen davon. Nördlich lässt sich ein Wall über die Bergstation der Zugerbergbahn bis nach Oberstock verfolgen. Dem Schlierenstadium ist der Wall von Obergrüt nach Allenwinden, dem Zürichstadium derjenige von Ussergrüt zuzuschreiben.

Im Hurdenstadium kam es zur Trennung in einzelne Gletscherarme, wobei sich ein Arm Reusstal aufwärts und die andern Richtung Zugersee, bzw. Küssnachterbucht zurückzogen.

Die Drumlinlandschaft von Steinhausen bis Obfelden entstand im Zungenbecken des Zürichstadiums.



Die Reusstalübertiefung in der Gegend um Gisikon ist nicht genau bekannt. Die Bohrung bei Root 671.557/219.100 410 müM blieb nach Durchstossen einer 2,3m mächtigen Siltschicht, gefolgt von Kies bis 11,6m, bei 56,0m Tiefe in weich und locker gelagerten Silten und Sanden (Seebodenlehm) stecken.



Die hangentfernteste Bohrung 672.350/221.250 408 müM aus einer Sondier-Kampagne bei Inwil, deutet auf eine nur kleine Uebertiefung in diesem Reusstalabschnitt hin. Sie brachte bis 1,0m siltige Verlandungssedimente, bis 9,0m Kies, bis 18,2m weiche Seeablagerungen, bis 22,4m Moräne, gefolgt von Fels.


Im Hurdenstadium stirnte der Gletscher bei Cham, bildete die Wallmoränen (von denen nur noch Teile vorhanden sind) bei Steinhausen, Blickensdorf, Baar, Zug.

Südlich der Felsnase vom Meissenberg - St. Karl sind in der Gegend Oberwil in verschiedenen Bohrungen mächtige Schotter (noch unbekannten Alters) sondiert worden. Bei 681.320/222.380 434 müM zeigt eine representative Kernbohrung zuoberst nach künstlicher Auffüllung und kiesigem Bachschutt bis 9,0m eine mächtige Schotterschicht bis 75,5m Tiefe, unterlagert von einer Moräne bis zum Fels auf 77,1m (vgl. Querprofil S-S).

Die jungen Sedimente in der Baarer-Zuger-Ebene setzen sich in der Talachse gegen den See zu aus meist feinkörnigen Ablagerungen bis in grosse Tiefen zusammen, gegen Baar zu überlagert von Lorzeschottern.








Auf der Westseite in der Städtler Allmend, 678.506/227.557 420 müM ist nach 8,4m siltigen Seeablagen eine Moräne bis Bohrende auf 16,0m lokalisiert worden. Bei 678.320/228.460 435 müM sondierte man 4,3m Moräne, bis 20,5m meist sandige, oft geschichtete siltige Seeablagerungen, bis 25,5m Kiese und Sande, bis 27,2m untere Moräne, gefolgt von Fels. Bei Höfen, östlich Steinhausen, 680.210/227.550 426 müM sind 11,7m Moräne, bis 13,6m Kies, bis 20,6m locker gelagerter geschichteter Sand, bis 24,6m Moräne, bis 27,8m locker gelagerter Kies, unterlagert von hart und dicht gelagerten Sanden und Silten vorhanden. Der Fels wurde bei Bohrende von 50,0m noch nicht angetroffen.

Bei Kollermühle 679.312/226.300 417 müM durchfuhr man bis 50,0m Tiefe meist weiche, siltige Seeablagerungen, darunter Abfolgen von härter gelagerten Moränen und siltigen Ablagerungen, bis zum Fels auf 73,6m Tiefe. In Zug findet man in der Ebene am See meist bis in grössere Tiefen reinen Sand. 681.610/224.720 419 müM zeigte bis 27,7m Sand, bis Bohrende auf 31,0m Moräne. Bei 8/5 681.390/225.100 418 müM gab es bis zum Bohrende auf 31,5m nur locker gelagerter Sand mit wenig weichen, siltigen Zwischenlagen. Bei der neuen Kantonschule Zug 682.300/225.700 430 müM ist bis auf 33,5m Sand mit Lagen von geschichteten Silten erbohrt worden.


In Baar ist bei 9/9 682.362/228.678 441 müM bis 4,0m Silt mit organischen Beimengungen, bis 16,5m Lorzeschotter, bis 27,5m weiche geschichtete siltige Seeablagerung durchfahren worden. Unterhalb 27,5m sind bis 41,5m ebenfalls Silte, die aber hart gelagert sind, darunter Moräne bis Bohrende auf 48,3m vorhanden. Nordöstlich von Baar eruierte man bei 683.160/228.460 449 müM bis 8,6m Kiese und Sande, bis 9,2m Moräne, bis 27,5m locker gelagerte Lorzeschotter, darunter eine wenig mächtige Moräne, gefolgt bis Bohrende auf 50,0m von halbfesten (?) geschichteten Seebodenablagerungen.





Zahlreiche Bohrungen im Gebiet Baarerbecken und am Hang gegen Blickensdorf dokumentieren, dass im tieferen Bohrteil "alte" dicht gelagerte Sande, Kiese, Moränen, ect. (also prä-hochwürmzeitliche Ablagerungen) die Aussagen im vorherigen Abschnitt lo untermauern.

## 10.2 Das Reuss- und Bünztal und die östlichen Randgebiete des Reussgletschers

Beim Eisaufbau musste der Arm, der über das heutige Zugerseegebiet vorstieß, bei Cham-Steinhausen nur Höhen von knapp 430 m<sub>ü</sub>M überwinden. Auch der Ast, der über die Region Luzern, entlang dem Süd- und Südostende des Lindenberges vorrückte, musste eine Felsschwelle, die heute von Lockergestein zugeeckt ist, überqueren. Ich vermute, dass die höchste Stelle etwa bei Oberrüti liegen muss, doch ist diese These noch nicht mit Daten belegt. Durch eine Anzahl Bohrungen, die die ganze Talbreite abdecken, ist der Felsverlauf im Dräliker-Boden, (westlich Ober-Hünenberg - vgl. Profil P-P auf übernächster Seite) bekannt. Der Fels ist überall untief angetroffen worden.







m. ü. M.

Kulisse Westseite 6'-6' Profil 6-6 Kulisse Ostseite

Norden



Brugg

Hausen

Olthmarsingen

Wohlen

Heilersberg




Wie der Uebergang bei den Bohrungen 6/2 und 6/3 zu 6/4 zeigt, fällt der Fels gegen Norden zu ab, wobei überall die gleiche Schichtabfolge - sandige Verlandungssedimente - locker gelagerte Flussschotter siltige, geschichtete, meist weich gelagerte Seeablagerungen - Moräne - Fels - erbohrt wurde. Bei 6/2 673.660/225.560 398 müM ist die sandige Schicht bis 1,2m, Kiesschicht bis 7,0m, Lehmschicht bis 14,8m, Moräne bis 16,5m, darunter Fels angetroffen worden.

Q-Q




P-P




O-O

Profil O-O



N-N

Profil N-N



6/3 673.700/225.950 398 müM brachte den Uebergang Kies/Lehm bei 6,8m, Lehm/Moräne bei 12,7m und Moräne/Fels bei 14,0m. Bei 6/4 673.630.226.450 397 müM stellt sich bis 1,8m torfiger Silt ein, bis 9,0m Kies, bereits bis 28,5m geschichteter Silt, bis 38,0m Moräne, darunter Fels (Kote 359 müM).

Das Gravimetrieprofil Nr. 62 Rifferswil belegt, dass die Uebertiefung bei Sins bereits ca. 140m beträgt. (Kote des tiefsten Punktes der Felssohle ca. 250 müM).

In der Gegend nördlich Sins sind die beiden vorher beschriebenen Arme zusammengeflossen und beim weiteren, sukzessiven Eisaufbau weiter nach Norden gestossen.


Gravimetrieprofil Nr. 54 Mühlau verdeutlicht die Situation, nachdem sich die beiden Rinnen vereinigt haben. (vgl. Querprofil N-N, Kote des tiefsten Punktes der Felssohle ca. 150 müM).

Ein Molassekeil, der im Norden bei Meiengrün (nördlich Hägglingen) 590 müM und am Riglisberg, westlich Tägerig 550 müM erreicht, sinkt gegen Süden langsam ab. Er lässt sich an Hand verschiedener Felsaufschlüsse verfolgen, wobei sich der Südlichste östlich Wohlen befindet. Südöstlich von Wohlen - Fischbach "taucht der Keil" ein. Beim Gletscheraufbau hat dieser Molassekeil den Eisstrom in einen Bünz- und Reusstal-Lappen aufgeteilt.

Der "Eingang" ins Bünztal ist aus dem Blockdiagramm Bünz-Reusstal, das von 665.000 bis 673.500 und 237.000 bis 244.000 reicht, ersichtlich.

Im Bünztal ist das Eis im 1. Maximalstadium bis in die Birch nördlich Othmarsingen eingedrungen. Die Moränen des Maximalstadiums befinden sich bei Othmarsingen und Hägglingen. Ein innerer Stand lässt sich an Hand der Moränenwälle bei Dintikon über Dottikon dokumentieren. Beim Eisrückzug stirnte der Gletscherarm (Schlierenstadium) bei Wohlen, was sich durch nicht markante Relikte von Wällen, etwas besser an Hand von Seitenmoränen nördlich Waltenschwil, zeigen lässt. Im Zürichstadium stirnte der Gletscher bei Boswil - Waltenschwil - Bünzen. Bei einer inneren Staffel kam es zur Ausbildung des Moränenzuges östlich Besenbüren - Reitwald - Chapf - Chlauswinkel nach Maiholz, der das Bünztal vom Reusstal trennt.

Im Reusstal stiess das Eis im 1. Maximalstadium bis ins Birrfeld vor. Dabei wurde der Eisstrom durch einen "Molassehügel" bei Rütihof bei Mellingen aufgeteilt. Westlich dieses Hindernisses drang Eis bis in die Gegend Mägenwil - Birretholz - Bleicherhölzli - Buechholz - Lindmühle, östlich davon bis ins Lindenstaldenzelg vor. Noch im Maximalstadium blieb es bei einer kleinen Aufteilung des Reusstallappens, wie die Lage der teils markanten Endmoränen von Wohlenschwil, westlich Büblikon, Gruemet, östlich Rütihof, bei Fislisbach und Niederrohrdorf verdeutlicht. Vor allem auf der Ostseite lässt sich auch ein markanter innerer Wall südlich Niederrohrdorf feststellen. Eine Schmelzwasserrinne verläuft über Fislisbach, Meierhof gegen Baden ins Limmattal. Eine Seitenmoräne zieht am Heitersberg aufwärts.



m. ü. M.

Kulisse Westseite 7'-7' Profil 7-7 Kulisse Ostseite

Norden

Laufrohr


Gebensdorf

Mülligen

Birrhard

Bremgarten


Weilersberg



Der Wall lässt sich über Remetschwil - Bellikon verfolgen. Im Maximalstadium überfloss das Eis den Mutschellen. Das Eis reichte am Pass auf eine Höhe von ca. 600 - 650 müM und es fand eine Transfluenz über Bergdietikon ins Limmattal statt.

Im Schlierenstadium stirnte das Eis bei Stetten. Es lassen sich markante Wälle bei Niederwil, Löli, Stetten, Talhau, Hau, Giren, nach Berikon verfolgen. Dieser Seitenmoränenzug beweist, dass der Mutschellenast im Schlierenstadium keinen Eisnachschieb mehr erhielt, zeigt aber auch, durch das Einbiegen der Wälle bei Arni, dass noch im gleichen Zeitabschnitt Eis gegen Aesch-Birmensdorf zugeflossen ist.

Profil L-L



Dies würde bedingen, dass im 1. Maximalstadium Eis über Birmensdorf hinaus nach Urdorf, evt. gar ins Limmattal vordrang. Da bei Birmensdorf noch Eis vom Süden her zustiess und zudem der Attenberg ein topographisches Hindernis bildete, ist die Situation in der Gegend kompliziert. Wegen Fehlen von Bohrinformationen sollte die These, dass das Eis im Maximalstadium wenig über Blickensdorf stirnte näher untersucht werden. Eine Stirnmoräne bei Urdorf untermauert diese Annahme. Dies würde weiter bedingen, dass die Stirnmoräne bei Wettswil einem innern Wall des Maximalstadiums zugehört.

Profil K-K




Nachfolgend werden zuerst die Sondierergebnisse aus dem Tal zwischen Affoltern a.A. und Wettswil, und dem Reppischtal beschrieben.

Im Zungenbecken von Wettswil-Bonstetten sind mehrere tiefe Sondierungen ausgeführt worden.

Bei 9/18 Bonstetten 677.640/241.380 528 müM förderte man bis auf ca. 55,4m siltige, feingeschichtete Seebodenlehme, (wo-

bei die unteren Partien fest gelagert waren und die Feinschichtung teils sekundär deformiert war), unterlagert bis Bohrende auf 57,5m von Moräne.

## Profil I-I



9/19 südlich Wettswil 677.740/242.900 526 müM zeigte bis 40,6m weiche Seeablagerungen, bis 41,0m moränenartiges Material, bis 52,5m fester gelagerte, siltige Seeablagerung (prähochwürmeiszeitlich?), gefolgt bis Bohrende auf 53,0m von kompakter Moräne.

Auch bei 9/20 677.750.243.350 525 müM waren die obersten 20,0m weiche, siltige Seeablagerungen, bis 31,0m siltige und sandige, härter gelagerte Seeablagerungen, bis Bohrende auf 35,0m Kies.

Bei 9/21 677.539/243.726 525,5 müM waren die Seeablagerungen bis 29,1m vorhanden, zuoberst siltig, ab 11,7m sandig, (wobei es bei der Bohrung im geschichteten, sandigen Teil zu Grundbruch kam), von 29,1m bis 33,6m folgte Moräne.



Bei 9/22 677.334/244.042 525 müM erbohrte man die Moräne unter 18,8m Seebodenlehm.

Zum äusseren Zürichstadium gehört die Stirnmoräne von Hedigen, im inneren Zürichstadium verläuft eine "Stirn-Seitenmoräne" über Affoltern a.A. Bei Bohrungen in Richwil, in Dachslen, bei Eigi und bei Unter Mettmenstetten ist Fels nach wenigen Metern Lockergestein vorhanden. Quer zum Knoeneramt zieht eine Felsschwelle zum Isenberg, sodass dem Gletscher das Einfließen gegen Affoltern nach Norden erschwert war.

Der Felsuntergrund in der Region Mettmenstetten, Türlensee, Hausen a.A., Ebertswil, Kappel a.A., Rifferswil ist wahrscheinlich nicht mächtig von Lockergestein bedeckt. Die Drumlinlandschaft bildete sich zur Zeit des Zürichstadiums. Die Gravimetrieresultate Gassmann (1962) lassen auf ein Zungenbecken zwischen Huser-Allmend und Hausen schliessen, doch fehlen dazu Bohrbeweise für eine mögliche Abgrenzung.

Im engen Reppischtal sind zwei Bohraufschlüsse in der Talachse vorhanden. (Zuden sind einige Bohrungen an den Talhängen ausgeführt worden, die untief auf Fels stiessen.) 10/3 bei Stallikon 679.300/242.420 544 müM zeigte zuoberst heterogenen Silt, Kies, Sand bis 10,5m, bis 14,8m geschichtete, feinkörnige Seeablagerung, bis 23,5m Kies, bis 32,0m Moräne, bis 36,2m Gehängelehm mit Moränematerial, darunter Fels.

Bei 10/4 679.210/243.340 545 müM fand man den Fels erst ab 67,0m. Zuoberst durchbohrte man Gehängelehm, bis 51,5m lehmmige Schotter, bis 67,0m Moräne.



Nachfolgend werden die Bohr- und Gravimetrieergebnisse aus dem Reuss- und Bünztal beschrieben.

Wie früher dargestellt bildet eine Seitenmoräne, im Zürichstadium entstanden, den Abschluss des Bünztales. Seitenmoränen lassen sich an beiden Hängen bis nach Bremgarten, wo sie ins Tal einbiegen, verfolgen. Ein innerer, durchbrochener Wall ist seitlich bei Hermetschwil und im Nueschwald zu erkennen. Auf der rechten Talseite sind die Wälle nur reliktiertartig übriggeblieben.

Auch im Reusstal selbst fand ich in der Talachse keine Sondieraufschlüsse bis zum Fels. Es sind diverse tiefere Bohrungen erstellt, doch fehlen vor allem noch Altersangaben, damit die einzelnen Schichten chronostratigraphisch eingegliedert werden könnten.

Beim Eingang zum Bünztal, d.h. in der ganzen Region zwischen den Querprofilen M, L und K sind nur sehr untiefe Sondierungen bekannt. An den Talflanken bei Brenzenschwil, Muri und Boswil sind Bohraufschlüsse, die unterhalb weniger Metern Schotter und Moräne Fels zeigen, vorhanden. Bei Muri, 668.530/235.860 463 müM sind die obersten 13,0m aus Schotter aufgebaut, darunter liegt eine mächtige Moräne bis 42,5m, unterlagert von Fels. Bei Birri 6/9 669.840/237.060 408 müM, zeigte sich 4,5m Kies, bis 10,0m eine obere Moräne, bis 16,5m Kies, bis 25,2m eine untere Moräne, bis Bohrende auf 30,0m ein unterer Kies (mit gespanntem Grundwasser). Bei 670.020/237.200 401 müM erbohrte man bis 11,5m meist feinkörnige Ablagerungen, bis 16,5m eine kompakte moränenartige Schicht, gefolgt bis 30,5m von Kies, unterlagert bis Bohrende auf 32,2m von einem beigen, hartgelagerten Sand (nicht Sandsteinfels!).

Bei 6/10, auf der Krite der Moräne (innerer Wall des Zürichstadiums), 669.150/237.900 471 müM brachte die Bohrung über die gesamten 20,0m trockene, kompakte Moräne mit Blöcken.

Im Reusstal erbohrte man zwischen den Profilen M, L und K an verschiedenen Stellen im südlichen Teil wenige Meter Kies, die gegen den nördlichen Teil zu an Mächtigkeit verlieren und in der Gegend Rottenschwil-Unterlunkhofen ganz fehlen. Unter dem Kies stellte sich überall Reusstallehm ein.

Bei der Reussbrücke bei Obfelden 7/12 672.780/235.320 385 müM eruierte man 6,8m Kies, gefolgt bis 10,0m von Sand, unterlagert von monotonen geschichteten Abfolgen von Silt (bis Bohrende auf 31,0m). Für Fundationsprobleme untersuchte man die Silte speziell. Die bodenmechanischen Untersuchungen bewiesen, dass diese Silte nicht vorbelastet sind, da sie durchwegs hohen Wassergehalt und niedere Festigkeitswerte aufwiesen.

Ähnliche Ergebnisse brachte auch die Untersuchung bei der Reussbrücke Ottenbach 8/27 672.300/236.930 383,5 müM - bis 8,7m Kies, bis 14,0m Sand, darunter weicher Lehm. (Bohr-ende bei 20,0m).

Interessant scheinen mir zwei Bohrerergebnisse zwischen Jonen und Oberlunkhofen. Die Bohrung 8/29, nahe am Talrand,


671.600/239.960 381 müM, ergab nach 12,0m Sand bis Bohrende auf 50,0m weiche siltige Seeablagerung. Bei der nur wenig entfernten Bohrung, am Hangfuss gelegen, 671.820/239.770, 395 müM, sondierte man bis 4,8m obere Moräne, bis 14,9m Kies, bis 30,3m untere, z.T. verschwemmte Moräne, darunter Fels. Der Fels muss also sehr steil eintauchen.

Die geophysikalischen Messungen der Profile Muri Nr. 55 und Boswil Nr. 56, deren Ergebnisse in den Talquerprofilen L-L und K-K dargestellt sind, bestätigen dies. Da die Zusammensetzungen der Lockergesteinsauffüllungen in diesem Talabschnitt nicht bekannt sind, und deren Dichten deshalb geschätzt werden mussten, resultieren bei den Tiefenangaben sicher gewisse Fehler.

Bei der "Gabelung" der beiden Täler sind mächtige Moränen und Stauschotterablagerungen vorhanden. Bei einer tiefen Bohrung bei Besenbüren 668.640/241.540 453 müM, (von der Moräne des Zürichstadiums aus ausgeführt), förderte man bis 28,0m Moräne, bis 31,6m Silt zu Tage. Zwischen 31,6m und 33,6m erbohrte man einen "humosen Feinkies" und "rostigen Grobkies" (Bodenbildung), sodass die tieferen Ablagerungen älter sind (absolutes Alter?). Man fand darunter Flussschotter (teils verkitteter Kies) bis 58,5m Tiefe, bis Bohrende auf 70,0m feinkörnige Seebodenablagerungen.




Auf der anderen Bünztalseite bei Boswil 666.233/239.790 446 müM durchfuhr man bis ca. 3,0m feinkörnige Oberflächenschichten, gefolgt bis 12,0m von einer Moräne (Zürichstadium), bis 19,0m von feinkörnigen Seeablagerungen, unterlagert bis Bohrende auf 20,0m von Kies. Die Pollenflora aus den Seesedimenten unterhalb der Moräne zeigt interstadiale Verhältnisse an. Für die Altersstellung kommt am ehesten Mittelwürm (ca. 25.000 - 50.000 yBP) in Frage (Küttel, 1983).

I-I




Im Reusstal, im Nüeschwald, fand eine Sondierung 670.320/243.070, 415 müM statt, (von der Moräne eines inneren Walles des Zürichstadiums aus). Die Bohrkern erbrachten bis 24,5m Moräne, darunter bis 40,0m heterogen aufgebaut, Sande und Kiese, bis 54,6m feinkörnige, oft geschichtete See-

ablagerungen, bis 58,0m eine untere Moräne. Nahe dieser Bohrung, innerhalb der Moräne, zeigte sich bei 8/31, 670.125/242.850, 387 müM, über die ganze Bohrlänge von 41,0m nur Silt und Sand, ausserhalb der Moräne, bei Oberdorf, 669.550/244.040, 401 müM, kiesige Ablagerungen über die Bohrlänge bis 20,0m.




# Blockdiagramm Bünz - Reusstal 2.5 fach überhöht



H-H

Profil H-H



In der Region um Bremgarten (in der Ebene) ergaben alle Sondierungen ähnliche Ergebnisse, indem Moränen, zwischen- gelagert von feinkörnigen Ablagerungen bis grössere Tiefen gefunden wurden. Repräsentativ ist die tiefste, in der Gegend abgeteufte Bohrung 7/19 668.614/244.037 372 müM; Nach 7,2m oberster Moräne folgen bis 7,5m geschichtete Silte, bis 11,3m Moräne, bis 38,0m eine heterogen zusammengesetzte Schicht, die auf verschwemmte Moräne hinweist, bis 45,5m Moräne, bis 53,0m kompakte, horizontal geschichtete Seeab- lagerungen unbekannten Alters, bis 62,2m wieder Moräne, bis 73,0m Silte, teils geschichtet, bis Bohrende auf 78,2m nochmals Moräne. Also wirklich ein komplexer Aufbau.

Westlich Bremgarten, am Hang, sind die Abfolgen deutlich verschieden. Bei 667.360/244.500 407 müM folgt nach 10,0m Moräne bis 48,0m Schotter, der z.T. verkittet ist, bis 50,0m Moräne, unterlagert von geschichteten Seeablagerungen unbe- kannten Alters und Tiefe.

Zwischen Reuss- und Bünztal lagern bei 666.078/244.980 428müM (im Hügelgebiet - Lokalität "Hintere Mulde") unterhalb 7,0m Moräne, bis 27,5m meist verkittete Kiese, bis 33,0m verkittete Grobsande, bis 52,3m verkitteter Kies, bis Bohrende bei 53,5m verkitteter Sand.

Nördlich Waltenschwil, am Waldrand bei 665.530/243.720, 468 müM, brachte die Untersuchung der Bohrkern folgende Ergebnisse: 0 - 3,0m Lehm, 3,0m - 9,0m Sand, 9,0 - 17,0m Moräne, 17,0m - 45,6m verkitteter Schotter, 45,6m - 52,8m Moräne, 52,8m - 91,5m kompakter, horizontal geschichteter Lehm, von 91,5m bis Bohrende auf 97,0m Moräne.

Am Dorfrand, bei 665.098/243.365 435 müM folgten nach 11,2m Moräne Kiese bis 20,3m, darunter Sand bis Bohrende auf 40,0m.


6/11 in der Talachse, bei Waltenschwil, 664.640/242.650, 423 müM zeigte bis 8,0m Kies, unterhalb 8,0m Sand und grauer Silt bis Bohrende bei 16,0m.

Talabwärts brachte die 1956 in zwei Etappen abgeteufte Boh- rung 6/12, 663.810/243.400 427 müM bis 8,0m Lehm, bis 24,0m

Sand, bis 27,2m Kies, bis 32,0m Moräne, bis 40,2m Sand,  
bis 60,0m Lehm, bis 66,3m Sand, bis 72,7m hart gelager-  
ter Kies, bis 75,6m hart gelagerter Sand, bis 76,0m Sand-  
steinfels (?).

Bei Wohlen sind eine Vielzahl untiefer Sondierungen vorhanden, die im Dorfteil alle moränenartigen Aufbau des Untergrundes, heterogen, mit Silten, Sanden und Kiesen durchsetzt, aufzeigen. Ein markanter Wechsel findet talabwärts am Nordrand Wohleus statt, wobei hier weiche, feinkörnige Ablagerungen ab OK Terrain vorherrschen (nur bis ca. 20,0m Tiefe sondiert). Ein analoges Bild zeigen die Regionen Allmend, Lee, Gheid, Anglikon.

Ein deutlicher Wechsel der Schichtabfolge ist im Talquerschnitt bei Villmergen festzustellen, indem auf der Westseite der Einfluss der Eistransfluenz aus dem Seetal bemerkbar wird. 659.940/245.610 440 müM, zeigt bis 8,0m Kies.



bis 13,0m Moräne, bis 16,1m Kies, bis zum Fels auf 18,4m Moräne.

66o.265/245.79o 427 müM ergab bis 7,om Lehm und Kies, bis 18,om Kies, bis 31,om Moräne, bis 43,8m Sand (vermutlich geschichtet), darunter bis zum Fels in 51,6m Moräne.

Noch bei 660.580/246.070 422 müM war der Aufbau ähnlich:  
 0 - 18,0m Moräne, 18,0m - 22,0m fest gelagerter Sand, 22,0m -  
 40,0m untere Moräne, 40,0m - 42,0m Sand, 42,0m bis zum Fels  
 auf 57,5m Kies.

Der Wechsel wird deutlich bei 661.100/246.260 411 müM: bis 24,1m weich gelagerter Lehm, unterlagert von einer 1,2m mächtigen Moräne (?), bis 33,5m feinkörnige Sedimente, bis 35,5m Moräne, bis 40,0m geschichteter Sand, bis 42,0m Moräne (?), bis 46,0m Kies.

Bei 6/14 661.440/246.830 408 müM förderte man über die ganze Bohrung bis 25,0m weichen, feingeschichteten Lehm.

Zwischen Dintikon und Dottikon stellten sich bei 6/15, 660.813/247.176 408 müM in der Bohrung bis 55,0m (Bohr-ende) weiche, geschichtete Seebodenlehme ein, oben von siltiger, unten von sandiger Beschaffenheit, wobei im Sand starker Auftrieb im Bohrloch herrschte.

Auf der linken Bünztalseite, bei Dottikon-Hendschiken, sind keine grösseren Moränenablagerungen mehr vorhanden. Die Transfluenzbeeinflussung reichte demzufolge nicht bis in diese Region.

659.245/248.140 416 müM ergibt bis 8,7m Kies, bis 11,0m verschwemmte Moräne, bis Bohrende auf 58,0m feinkörnige Seebodenlehme (keine Angaben über Lagerungsdichte).


Der Beschrieb einer alten Bohrung aus dem Jahre 1949 bei 659.840/248.160 409 müM hält folgende Schichtabfolgen fest: torfige Schichten bis 2,0m, Lehm mit Steinen bis 4,2m, Sand bis 11,6m und schliesslich bis Bohrende auf 26,6m fest gelagerter Lehm (?).

6/17 660.130/248.540 418 müM ergab bis Bohrende auf 39,5m eine heterogene Abfolge von Kiesen - Lehmen - Sanden, wobei die feinkörnigen Sedimente fest gelagert sind (Moräne?).

Bei älteren Sondierungen nördlich am Hang von Dottikon, bestand das Bohrgut aus mächtigen Kiesabfolgen. z.B. bei 660.000/249.000 425 müM wurde Kies bis 39,5m, teils mit Partien hohen Lehmgehaltes, bis zum Fels auf 40,7m toniger Lehm durchbohrt. Diese Kiese werden in den Gruben Tannächer abgebaut.

Ein rapider Wechsel stellt sich ein, sobald man ins Moränengebiet des Maximalstadiums im Bünztal eintritt.

F-F




Bei Othmarsingen sind etliche un- tiefe Sondierungen vorhanden, die Jungmoränen durchfuhren. Erst tiefere Bohrungen erreichen härtere Kies-Sande. z.B. brachte 658.240/250.800 397 müM bis 15,0m Moräne. Von 15,0m - 15,5m deutet ein humoser Silt auf Bodenbildung hin. Eine tiefere Moräne mit Blö- ken stellte sich bis 19,2m ein, ge- folgt von einem Band humosen Kies- sandes (frühere Bodenbildung), un- terlagert bis 49,1m (Bohrende) von Kiessanden.

Die unterirdische Felsbarriere zwischen Wohlenschwil - Brunegg - Mägenwil, die das unterste Bünztal vom Reusstal trennt, wird (neben anstehendem Fels an den nahe gelegenen Hängen) auch belegt durch folgende Tatsachen:

Zwei Bohrungen in der Ebene zwischen Mägenwil und Brunegg trafen "untief" Fels an. Bohrung 659.600/252.100 411 müM erbrachte folgendes Resultat: bis 31,6m verschwemmte Moräne,

von 31,6m - 37,0m kompakte Moräne, unterlagert von Fels. Gretener führte (1954) auch in der Gegend Lenzburg, Möriken, Brunegg, Mägenwil, Othmarsingen gravimetrische Messungen durch, die von Gassmann (1962) ausgewertet wurden. Dabei sind negative Anomalien zwischen Othmarsingen und dem Chestenberg bis ca. 1,7 Milligal berechnet worden,



die gegen Brunegg - Mägenwil auf ca. 0,5 mgal abnehmen. Es sollten also zwischen Othmarsingen und Chestenberg mächtige Sedimente über dem Fels liegen. Die vier tieferen Bohrungen ausserhalb des Maximalstadiums bei Othmarsingen bekräftigen das Bild. Leider sind mir im Gebiet Neufeld-Birch keine Sondierergebnisse bekannt.

6/21 658.840/251.620 431,5 müM brachte in den obersten ca. 20,0m Kies (Niederterrassenschotter), von ca. 20,0m - ca. 70,0m teils verkitteten Kies (ältere Schotter), unterlagert bis Bohrende auf 97,0m von feinkörnigen Schichten.

Bei 658.300/251.110 419 müM war ein Uebergang von nicht verkitteten Schottern (Niederterrassenschottern) zu verkitteten (älteren Schottern) bei ca. 14,0m feststellbar. Total wurden Kiese bis 77,0m durchfahren. Zwischen 77,0m und Bohrende auf 83,5m fand man hart gelagerte Sande.

Die Bohrung nördlich Niederlenz, 656.670/250.600 411 müM erbrachte bis ca. 78,0m (unten z.T. verkittete) Kiese, gefolgt von einer harten Moräne bis ca. 83,0m, unterlagert bis Bohrende von Sand, (86,0m).

Die Bohrung an der Bünz bei 656.830/251.085 380 müM ergab Kies bis ca. 50,0m Tiefe, darunter bis Bohrende auf 67,0m Sand.

Der Bünzarm des Reussgletschers glitt in der Region somit über zum Teil mächtige, ältere Sedimente hinweg. Der hochwürmzeitliche Gletscher hatte nicht die Erosionskraft, die-

se alten Sedimente auszuräumen. Deshalb ist heute in der Region ein Uebergang Moräne - alte Schotter, resp. Niederterrassenschotter - alte Schotter feststellbar.

Die Felsübertiefung, die gegen Niederlenz - Wildeggen hinweist, muss prähochwürmzeitlichen Datums sein.

Das Reusstal zwischen Bremgarten und Mellingen ist mächtig mit Lockersteinsablagerungen aufgefüllt. In der Talachse sind keine Bohraufschlüsse bis zum Fels vorhanden.

Die 148,6m tiefe Sondierung zwischen Sulz und Niederwil, 7/21 666.025/248.075 366 müM zeigte fast über die ganze Bohrlänge Sand, wobei bei 21,4m ein Granitblock, bei 41,0m und bei 66,0m je ein ca. 2m starkes Kiesband, zwischen 106,0m und 111,0m eine tiefere Kiesschicht durchbohrt wurde. Die ebenfalls sandige Partie zwischen 118,0m und 137,0m wies durch Vorhandensein von siltig tonigen Beimengungen und fester Lagerungsdichte moränenartigen Charakter auf.

In der Tiefbohrung 8/34 666.540/248.370 362 müM förderte man über die ganze Sondierlänge von 102,5m feinkörnige Ablagerungen, wobei vereinzelt horizontale Schichtung festgestellt wurde.

Ausserhalb der Moränenzüge, an den Talflanken sind oberflächlich Kiesschichten anzutreffen. Auf der linken Talseite, bei Niederwil, bei 664.530/247.820 405,5 müM fand man bis Bohrende auf 15,5m Kies. Auf der rechten Talseite, ausserhalb Talhau, bei 8/35 666.820/249.710 412 müM erbrachte die Sondierung unterhalb 4,0m erdigem Lehm Kies bis 31,0m, unterlagert bis Bohrende auf 36,0m von hart gelagerten feinkörnigen Sedimenten. Bei 8/36 666.730/250.050 407 müM, stellte sich eine einfache Schichtabfolge ein, indem man bis 19,3m eine Moräne, bis 28,0m Kies, bis 40,3m Sand, bis Bohrende auf 76,5m graue, siltige, feingeschichtete Seebodenlehm vorfand. In der Bohrung 8/37 666.530/250.170 402,5 müM traten nach 4,2m siltiger Deckschichten bis 15,7m Moräne, bis 35,0m locker gelagerte Schotter, bis 40,0m fest gelagerter Schotter, bis 42,7m festgelagerter Sand auf.

Zwischen Stetten und Busslingen 8/38 666.100/251.050 403 müM fand man bis 1,7m Kies, bis 5,0m Silt, bis 13,2m Sand, bis Bohrende auf 26,0m Kies.

Eine am Nordende des Moränenzuges Talhau abgeteufte Sondierung 666.050/249.850 410 müM erbrachte bis 12,6m Moräne, bis 22,6m Kies, bis Bohrende auf 25,9m Sand.

Bei Gnadenthal ist bei 7/22 665.170/249.440 360 müM nach 4,6m feinkörnigen Lehm-Sand-Schichten Kies bis 9,8m Tiefe, dann Sand bis 28,0m, dann hart gelagerter Kies-Sand bis 36,5m und Sand bis Bohrende auf 44,0m Tiefe gefunden worden.


In der Gegend Niederwil - Nesselbach - Tägerig sind zuoberst meist ca. 15 - 25m mächtige Kiese vorhanden, die durchzogen mit sandigen Partien und unterlagert von feinkörnigen Sedimenten sind. Die oberflächennahen Kiese werden in verschiedenen Gruben abgebaut.



Eine Veränderung der Schichtabfolge findet nördlich Tägerig statt. 7/26 663.400/251.080 378 müM zeigt Kies bis 14,0m, unterlagert von Sand bis Bohrende auf 25,2m. Bei 7/27 663.100/251.280 361 müM hört die Kiesschicht in 3,1m auf, bis 33,2m folgt grauer Lehm, bis 35,6m verkitteter, sehr hart gelagerter Kies, bis 42,4m (Bohrende) fest gelagerter, grauer Lehm.

7/28 662.450/251.720 350 müM; südlich Mellingen wurde zuoberst heterogener Aufbau mit Silt-Sand-Kies-Partien bis 8,3m Tiefe erkundet, dann zwischen 8,3m und 13,6m ein leh-miger Feinsand mit Steinen und gekritztem Geschiebe (Moräne), zwischen 13,6m und 64,0m nochmals Lehm und zwischen 64,0m und 72,2m (Bohrende) Sand.

Auf der rechten Talseite fand man bei Niederrohrdorf 8/39, 664.600/252.750 421 müM bis 7,0m feinkörnige Sedimente, von 7,0m - 33,0m locker gelagerten Kies (Niederterrassenschotter), von 33,0m - 60,0m teils verkittete Kiese, teils fester gelagerte Sande (ältere Schotter), zwischen 60,0m und 66,5m fester gelagerte sandige Seeablagerungen, zwischen 66,5m und 73,2m ein unterer, älterer Schotter, nach 73,2m bis Bohrende auf 84,3m kompakte, oft horizontal geschichtete Sande und Silte (Seebodenablagerungen).



Im Moränenbereich des Maximalstadiums waren für den Bau des Heiterbergtunnels tiefere Sondierungen notwendig. Vom Hang zum Tal zu fand man folgende Ergebnisse:

665.352/253.945 490 müM : Moräne bis 21,8m, bis 34,9m Kies, bis 40,0m Moräne, unterlagert von Fels.

665.145/253.840 449,5 müM: erreichte nach 22,8m Moräne den Fels, wobei von 11,2m - 14,0m eine erdige, sandige Lehm-schicht eine obere und untere Moräne trennt.

Auf dem Moränehügel Hiltiberg, bei 664.675/253.750 459 müM fand man folgende Bohrkerne: bis 26,5m Moräne, bis 52,1m heterogene Abfolgen von steifen Silten, hart gelagerten Sanden und harten moräneartigen Lehmportien mit Steinen und Blöcken, bis 54,5m kompakter Kies, bis 62,5m fest gelagerte Sande und feingeschichtete Silte (Seebodenablagerungen), unterlagert bis zum Fels auf 64,5m von Moräne.

Bei 8/40 664.325/253.660 423 müM erbohrte man bis 12,2 Moräne, darunter bis Bohrende auf 41,7m kompakt gelagerten Kies.

Auch auf der Stirnmoräne Buechberg führte man eine tiefere Bohrung bei 663.382/253.137 424 müM aus. Unterhalb 16,8m Moräne stellte sich bis Bohrende in 43,0m Tiefe ein verkitteter Kies ein.

Westlich der Station Mellingen, bei 662.716/253.612 380 müM brachte man bei der Bohrung bis 10,0m Moräne, bis 15,0m Sand, bis 22,0m Schotter, bis 32,7m steife siltige Seeablagerungen, bis 40,0m dicht gelagerte Sande, bis zum Fels auf 41,6m Moräne zu Tage. Nördlich dieser Bohrung, bei Rütihof, steht Molassefels an.

Beim Reussknie hat sich der Fluss bis zum Fels eingetieft, so dass hier die südwestliche Grenze eines "Molassehügels" liegen muss.

Direkt nördlich und nordöstlich von Rütihof fand man unter Jungmoräne wiederum Schotter und tiefer Lehm. z.B. 8/42, 663.245/255.250 409 müM: 0 - 12,0m Moräne, 12,0m - 40,0m Schotter, 40,0m - 41,0m (Bohrende) Lehm.

662.760/255.350 409 müM: 0 - 13,5m Moräne, 13,5m - 42,0m Schotter, z.T. moräneartig, 42,0m - 44,0m (Bohrende) Lehm.

Auf der süd-westlichen Seite des Rütihofes, im Schönert und am Reussknie, wo sich die Reuss einen tiefen Einschnitt durch die Jungmoräne und die älteren Schotter gebahnt hat, fand ich keine Sondierunterlagen. Augenfällig sind die vielen Erratiker an den steilen Böschungen zur Reuss.

Untiefe Bohrungen bei Bleicherhölzli ergaben wenige Meter Moräne, darunter Schotter. 7/31 660.805/255.300 399 müM zeigte bis 5,0m Moräne, bis 46,5m zum Teil verkitteter Schotter, bis 53,8m Sand, bis 56,2m steifer Lehm, bis Bohrende auf 58,0m Sand.

Die Tiefbohrung in Birrfeld, nördlich der unterirdischen Felsbarriere zwischen Wohlenschwil - Brunegg - Mägenwil, (die das unterste Bünz- vom untersten Reusstal trennt), 659.550/253.290 407 müM, brachte folgendes Ergebnis:  
 0 - 6,0m Jungmoräne, 6,0m - 18,0m Niederterrassenschotter, 18,0m - 26,4m sandiger Kies mit auffallend stark verwitterten Komponenten (Bodenbildung), 26,4m - 43,6m Sand mit verhärteten Partien, 43,6m - 52,8m Moräne, 52,8m - 88,0m meist zu Nagelfluh verkittete Kiese, 88,0m - 101,0m heterogener Aufbau (Kiese, hart gelagerte Sande, kompakte Lehme), 101,0m - 108,0m Kies, 108,0m - 130,0m (Bohrende) z.T. geschichtete, feinkörnige Ablagerungen.

Diese Bohrergebnisse zeigen etwa den äussersten würmeiszeitlichen maximalen Gletscherstand auf. Darin wird deutlich, dass auch dieser Arm des Reussgletschers in mächtige prähochwürmeiszeitliche Ablagerungen hineinstiess, diese aber nicht ausräumen konnte.


Im extramoränen Bereich muss deshalb ein direkter Kontakt von Niederterrassenschottern zu "alten Schottern" feststellbar sein, der sich nur an Hand eines Wechsels der Lagerungsdichte erkennen lässt. Tatsächlich lassen sich an Hand von Bohrrapporten solche Wechsel belegen.

In der Kiesgrube 6/24 658.850/253.300 407 müM, nördlich Brunegg werden die ca. 17m mächtigen Niederterrassenschotter abgebaut. In einem kiesigen Lehm und in Kiesen in ca. 20m Tiefe zeigen rostige Partien Bodenbildung - die Kiese bis 33,0m Tiefe sind also bereits alte Schotter. Bis 42,0m folgen ältere Seeablagerungen, bis 90,0m Tiefe hart gelagerte, oft verkittete Kiese, bis Aufschlussende auf 95,2m hart gelagerte Moräne.

In einer Bohrung ca. 1 km westlich Birrhard, 659.632/253.775, 404 müM fand man über die gesamte Bohrlänge von 56,0m nur Kies, der in tieferen Partien oft verkittet war.

Etliche Bohrungen im würmextramoränen Bereich zeigen ähnlichen Aufbau.

7/34, südlich Mülligen, 660.630/255.920 391 müM erbohrte man Kies bis 40,2m, unterlagert von kompaktem Lehm bis Bohrende auf 44,0m.



Südlich Birmenstorf, an der neuen Reussbrücke bei 8/47 und 8/48 wurde beim tiefen Einschnitt der Reuss, am Hang und am Flusssufer je eine Bohrung abgeteuft. Die Reuss hat sich an der Stelle durch die "alten Schotter" bis zu einem kompakten Lehm durcherodiert. Die Bohrergebnisse von 8/47 661.860/225.860,

391 müM sind: bis 31,0m kompakt gelagerter Kies, z.T. moränenartig, z.T. zu Nagelfluh verkittet, darunter bis auf Bohrende auf 40,0m festgelagerte Feinsande und Lehme; von 8/48 661.680/255.800 353 müM über die ganze Bohrlänge bis 32,7m kompakter Lehm.

Zwischen Birmenstorf und Mülligen fliesst die Reuss über anstehenden Fels.

Gravimetriemessungen, die Gretener (1954) in der Region ausführte und Gassmann (1962) auswertete, zeigen negative Schwereanomalien bis zu 2,7 Milligal im Birrfeld südlich Birmenstorf, sodass in der Region Lockergesteinsablagerungen von ca. 180m Mächtigkeit vorhanden sind. Die Anomalie weist Richtung Birmenstorf. Es ist daraus zu folgern, dass eine tiefe, canyonartige Schlucht, (die meiner Schätzung nach bis ca. 200m od. mehr unter Terrain verläuft) zwischen


Eiteberg und Eichhölzli von Mülligen-Birmenstorf bis Gebenstorf mit "altem Lockergestein" aufgefüllt ist.

Zwischen Oberburg und Gebenstorf an der Reuss bei 659 481/258 887, 337 müM fand man bis 15,0m Kies, bis 21,4m fest gelagerten Silt, bis 28,0m hart gelagerten Sand (beides alte Seeablagerungen), bis Bohrende auf 30,5m fest gelagerte Moräne (?).


Dass sich dieser (unterirdische) Canyon auch gegen Norden zu weiterverfolgen lässt, beweisen folgende drei Bohraufschlüsse: Nördlich Gebenstorf sondierte man bei 660.232/259.275, 339,5 müM nach 5,0m Lehm, bis 15,0m Kies, bis 17,0m Lehm, dann Fels.

Nahe davon, bei 7/37= 8/50 Bohrung 660.108/259.475 331 müM sah das Resultat anders aus: bis 2,0m Sand, bis 17,0m Kies, bis


Profil C-C



Profil B-B



Profil A-A



18,0m lehmiger Kies (Moräne?), bis 101,0m (Bohrende) oft geschichtete, kompakte Sande in mächtigen Lagen, nur durchzogen mit wenigen Metern kompakter Lehmschichten.

Wieder in der Nähe, auf der andern "Canyonseite", bei Windisch 659.602/259.603 330 müM stiess man wieder nach 18,7m Kies auf Fels.

Zwischen den Jurazügen Reinerberg und Flue ist auch eine aufgefüllte Schlucht ermittelt worden. Beim Juradurchbruch deuten zwei Sondierergebnisse darauf hin. 660.085/262.575, 334 müM brachte bis 21,5m Kies, bis 22,0m Lehm mit Steinen, ab 22,0m Fels; die nur wenig westlich davon abgeteufte Sondierung 7/48 = 8/53 659.952/262.559 333 müM dagegen von 0 - 14,0m Kies, von 14,0 - 20,2m sauberen Sand, von 20,2m - 61,0m Kies, von 61,0m - 64,8m Sand, von 64,8m - Bohrende auf 67,5m fest gelagerte Moräne, in der alpines Material gefunden wurde.

## 11. Zusammenfassung

---

Die Hauptaufgabe dieser Arbeit bestand in der Eruierung der Felslagen in den einzelnen mittelländischen "Reussgletscher"-Tälern. Zudem sollten Zusammenhänge zwischen Erosions- und Akkumulationsvorgängen in der letzten Eiszeit untersucht werden. Die Frage, ob in den einzelnen Tälern unter den hochwürmzeitlichen Ablagerungen ältere Sedimente liegen, war ebenfalls Aufgabenstellung.

Zuerst ermittelte ich die Lagen und Höhen des anstehenden Felsens. Diese Informationen holte ich aus bestehenden geologischen Karten und mit eigenen Feldbegehungen. Als Arbeitskarten zog ich schwarz-weiss Karten M 1 : 25.000 der ganzen Region auf Kartontafeln auf und zeichnete den anstehenden Fels ein. Dabei wurde der Fels nicht wie in der geologischen Karte nach Alter und Gesteinsart gegliedert, sondern einzig nach der Höhe in Metern über Meer. Dazu wurden 50 m Bänder mit je einer Farbe gewählt. Mit dieser Karte treten optisch die Felshindernisse, die das Gletschereis auf dem Weg nach Norden beeinflussten, hervor.

Ich versuchte möglichst genau die Höhe der Felsschwellen bei den Eingängen in die mittelländischen Quertäler zu ermitteln. Stellte ich fest, dass von den Haupteislappen sich Seitenlappen abspalteten, suchte ich auch bei den Ausgängen aus den Haupttälern die Felshöhen zu eruieren.

Um Vergleiche oder evt. Zusammenhänge zwischen den einzelnen Haupttälern oder abgespalteten Nebentälern in Bezug auf Lockergesteinsablagerungen zu erhalten, versuchte ich zuerst einmal, aus chemischen Analysen von Grundwässern Paralleltäten zu finden. Dieser Versuch misslang. In den über tausend Analysen, die bei mir archiviert sind, und deren Resultate ich grossräumig in eine Grundwasserkarte einzeichnete, zeigten sich stark gestreute Werte. Bei den Grundwasserhärten war die Flussinfiltration der hauptverantwortliche Faktor. Die Nitratgehalte variierten mit unterschiedlicher landwirtschaftlicher Nutzung des umliegenden Gebietes. Zudem reichten die Daten für eine solche Analyse nicht aus. Das Datennetz müsste engmaschiger sein.

Um das Problem der Zusammenhänge der Erosions- und Akkumulationsvorgänge anzugehen, mussten die Eisstände im Würm-Maximum und in den einzelnen Rückzugsstadien in den Haupt- und Nebentälern detailliert bekannt sein. Ich zeichnete dazu immer in den gleichen Massstäben etwas über tausend Kilometer Profile, nämlich 10 Tallängsprofile und 20 Querprofile. Mit der Kulissendarstellung der seitlichen Hügelzüge konnten die Informationen über anstehenden Fels und über die einzelnen Eisstände lagerichtig eingezeichnet werden.

Als zweite wichtige Arbeitskarte zog ich normale Landeskarten M.1 : 25.000 auf Sperrholzplatten auf. Aus der Höhenkarte der Felsoberfläche des Anstehenden wurden die Gebiete mit anstehendem Fels mit einer einheitlichen, durchsichtigen, roten Farbe übertragen.

Anschliessend wurden Ergebnisse von über 3000 Bodensondierungen aus der Region (über 63.000 m Lockergesteinsbohrungen) in die Karte eingetragen.

Einige Bohrkerne von Sondierungen, die während den letzten Jahren erstellt wurden, vermittelte ich Herrn Dr. M. Küttel, (Universität Hohenheim), der sie auf Pollen analysierte und geobotanisch deutete. Die daraus ermittelten Altersangaben brachten wertvolle Resultate.

Trotz der Informationsfülle erhielt ich nicht aus allen Regionen genügend Unterlagen, um Auskunft über den Felsverlauf zu erhalten, da viele Bohrungen in den z.T. sehr mächtigen Lockergesteinsauffüllungen stecken blieben. Deshalb entschied ich mich, gravimetrische Untersuchungen durchzuführen. Es war möglich, an zwei sehr interessante gravimetrische Arbeiten (Gretener 1954; Gassmann, Pavoni 1962) anzuschliessen. Ich beschloss, nicht wie in den beiden Arbeiten die Messstationen flächenhaft, sondern profilförmig anzuordnen. Es wurden gesamthaft 9 Profile mit total 204 Messpunkten gravimetrisch aufgenommen. Die Methode hat sich bewährt. Doch sollten in Zukunft noch Kontrollbohrungen diese Gravimetrieresultate "eichen".

Im Text hat sich eine klare Zweiteilung ergeben. Im ersten Teil wurde neben einem kursorischen Abriss der wichtigsten Literatur im Zusammenhang mit dem untersuchten Gebiet auch ein geologischer Ueberblick und vor allem eine detaillierte Beschreibung der Arbeitsmethode gegeben.

Der zweite Teil beinhaltet geomorphologische Talbeschriebe.

Die Talübertiefung in den Haupttälern südlich der "Barriere" der steilgestellten Molasse ist grösser als die nördlich davon. Genaue Daten sind mir nur aus dem Gebiet Zugersee bekannt, wo im Seegebiet zwischen Immensee und Walchwil eine Auskolkung bis ungefähr Meeresspiegel feststeht.

Folgende Höhen der Felskote wurden bei den Eingängen in die einzelnen mittelländischen Täler, resp. in den Tälern selbst ermittelt:

Kleinemmettal: Eingang bei Emmenbrücke ca. 460 müM, tiefster bekannter Punkt bei Blatten ca. 400 müM.

Rottal: Eingang zwischen Hinter Aemmenberg und Brunauerberg auf ca. 650 müM. Im oberen Teil scheint das Tal wenig übertieft, (bei Ruswil Kote ca. 600 müM), im untern Teil sind Felskoten z.Z. noch unbekannt.

Luthern-Wiggertal: Eingang bei Wolhusen auf ca. 570 müM. Das Tal ist nicht übertieft (Wauwilermoos?). Im unteren Talteil sinkt der Fels kontinuierlich bis (bei Oftringen Eingang ins Aaretal) auf ca. 390 müM ab.

Suhrental: Eingang bei Rippertschwand ca. 560 müM. Das Tal ist übertieft, der tiefste bekannte Punkt (bei Sursee) liegt auf ca. 350 müM. Die Höhe beim Eingang ins Wauwilermoos beträgt vermutlich ca. 470 müM, die ins Uffikermoos ca. 490 müM. Im Uffikermoos wurde Fels in ca. 450 müM erbohrt.

Wynental: Der tiefste Eingang ins Wynental befindet sich bei Beinwil (Felshöhe tiefer als 540 müM) vom Seetal her, der Zweittiefste bei Gunzwil, resp. Niederwil vom Suhrental her (Felskote ca. 620 müM) und der Höchste im Süden bei Hildisrieden auf ca. 680 müM. Bei Beromünster befindet sich eine Felsschwelle bei ca. 620 müM. Das mittlere Wynental ist über-tieft. In der Region Zetzwil traf man Fels auf ca. 400 müM.

Seetal: Eingang bei Ballwil auf ca. 490 müM. Das Tal ist stark übertieft. Bei Ermensee traf man auf 260 müM noch keinen Fels. Im untersten Talabschnitt fand man nahe der Talachse bei Staufen den Fels auf 360 müM.

Bünztal: Eingang aus dem Reusstal bei Aristau auf ca. 280 müM. Im Tal selbst ist der Felsverlauf noch nicht bekannt. Es sind an einigen Stellen 100 m Bohrungen vorhanden, die den Fels auf ca. 310 müM nicht erreichten.

Reusstal: Eingang ins Reusstal bei Oberrüti, Fels auf ca. 380 müM, bei Cham-Steinhausen auf ca. 430 müM und bei Blickensdorf-Uerzlikon-Knonau auf ca. 360 müM. Das Reusstal ist stark über-tieft. Bei Jonen im mittleren Talabschnitt folgt Fels erst ab ca. 120 müM. Eine Tiefbohrung bei Sulz blieb auf 210 müM im Lockergestein stecken. Im unteren Talabschnitt im Birrhard findet man in der Talachse Fels erst ab Kote ca. 200 müM, bei Gebenstorf wurde eine canyonartige Abflussrinne, wobei der Fels erst ab Kote ca. 150 müM folgt, lokalisiert.

Der Eingang ins Tal über Hedigen-Wettswil-Bonstetten hat bei Affoltern eine Felshöhe von ca. 500 müM. In der Talachse wurde kein Fels erbohrt und bei Bonstetten liegt er tiefer als 470 müM.

Reppischtal: Der Eingang liegt beim Türlerseer bei unbekannter Felstiefe (sicher tiefer als 620 müM = Seegrund). Bei Stallikon folgt Fels in der Talachse auf 490 müM.

Betrachtet man den Felsverlauf in den Haupttälern, stellt man fest, dass aus den luzernisch-aargauischen Quertälern tiefe Rinnen zum Aaretal hinführen. Je weiter gegen Osten, umso geringere Meereshöhen liegen vor. Da diese Rinnen in Form von engen Juradurchbrüchen eine Fortsetzung gegen Norden zu aufweisen, liegt ein Indiz für eine fluviatile Entstehung dieser "Urtäler", die später vom Gletscher ausgeweitet und teils über-tieft wurden, vor.

In einigen Talabschnitten konnten an Hand von genauen Bohrprotokollen prähochwürmzeitliche Ablagerungen lokalisiert werden.

Es wurde möglich, eine Menzinger-Rinne, die vom Zürichsee über Schönenberg-Menzingen nach Zug zieht, im westlichen Teil genauer abzugrenzen. Auch eine tiefer liegende Blickensdorfer Rinne, die über den Zugersee-Baar-Blickensdorf-Uerzlikon-Knonau ins Reusstal zieht, konnte genauer umschrieben werden. Informativ ist, dass beide Rinnen mit teils alten Schottern aufgefüllt sind und in diesen Schottern an einigen Stellen Linth-Leitgesteine gefunden wurden. Ein Beweis, dass der risszeitliche Linthgletscher ins "Reussgebiet" eindrang, während ihm in der Würmzeit der Eintritt nach Westen durch seine eigenen risszeitlichen Ablagerungen verwehrt wurde.

Die vorhandenen Untersuchungsergebnisse in den unteren Talregionen beweisen, dass die hochwürmzeitlichen Gletscher in diesen Abschnitten längst nicht alle älteren Sedimente ausräumten. An verschiedensten Stellen fand man unter den Jungmoränen oder den Niederterrassenschottern prähochwürm- und präwürmzeitliche "ältere" Schotter, Seeablagerungen, Moränen etc. Bemerkenswert sind die komplexen älteren, oft mehrere hundert Meter mächtigen Ablagerungen in Juranähe in den untersten Teilabschnitten dieser Täler.

Bei allen Reussgletscherhaupttälern konnte festgestellt werden, dass ausserhalb der markanten Endmoränen des Maximalstadiums (=Killwangen Stadium) teils unter Niederterrassenschottern noch würmzeitliche Moränen geringer Mächtigkeit vorhanden sind. Dies deutet auf einen kurzfristigen prähochwürmzeitlichen Eisvorstoss (evt. mehrere ?) hin. Neuere Forschungsergebnisse stellen diesen 1. Maximalvorstoss ins Mittelwürm (ca. 75.000 yBP).

Im Laufe der Arbeit bin ich in einigen Regionen auf interessante, zum Teil noch nicht gelöste Detailprobleme gestossen.

- Im Gebiet Küssnacht-Immensee konnte eine Rinne nachgewiesen werden. Ein Moränenzug des Hurdenstadiums trennt den Zugersee vom Küssnachtersee. Auf der Küssnachterseite, am Rigi-fuss finden sich mächtige Stauschotter, die im Zusammenhang mit dem Küssnachterarm des Reussgletschers akkumuliert wurden, während die analogen Stauschotter des Zugerseearmes bei Oberwil anzutreffen sind.
- In der Region Wolhusen - Kleinemmetal bis Littau und dem Rottal sollten meine Grobbefunde noch verifiziert werden. Vor allem sollte der Felsverlauf im Wauwilermoos, Gebiet Ruswil-Grosswangen - Ettiswil und im Randgebiet zur Seewag eruiert und auf glaziale Uebertiefungen untersucht werden.
- Der Einfluss des östlichen Suhrental-Lappens (über's Moos) im Wynental, die Felsverläufe in der Region Rickenbach-Gunzwil-Beromünster und des mittleren Wynentals, sowie die komplexen Akkumulationsverhältnisse der Region sollten untersucht werden.
- Im östlichen Randgebiet sollte die These, dass im 1. Maximalstadium die Gletscher über Birmensdorf ins Limmattal reichten, verifiziert werden.

Während der ganzen Arbeit wurde mir immer wieder deutlich, wie wichtig genaue Detailinformationen aus Bohraufnahmen für das Verständnis der Zusammenhänge sind. So geben oft genaue Angaben wichtige Hinweise betreffend chronostratigraphischer Abläufe, z.B.: geschichtete tonige Silte - Seeablagerung; weiche, breiige,

lockere Ablagerung - nicht vorbelastet; harte, steife Ablagerung - Vorbelastung; verkittete Schotter - Indiz für ältere, prähochwürmzeitliche Ablagerung; Bodenbildung innerhalb einer Bohrsequenz - Hiatus, etc. Eine mögliche Methode zu chronologischen Aussagen aus ungestörten Bohrkernen sehe ich in bodenmechanischen Untersuchungen aus Seeablagerungen, indem funktionale Zusammenhänge zwischen Plastizität und Konsistenzgrenzen einerseits und Vorbelastung durch Gletscher andererseits erarbeitet würden.

## 12. Anhang

### Literaturverzeichnis

- ANNAHEIM, H., BOEGLI, A. und MOSER, S. (1958): Die Phasengliederung der Eisrandlagen des würmeiszeitlichen Reussgletschers im zentralen Schweizerischen Mittelland. Geogr. Helv., 13/3.
- BAUMBERGER, E. (1925): Die subalpine Molasse von Luzern. Ecl. geol. Helv., Vol. XIX/1.
- BIERI, B. (1981): Als der Rhonegletscher bei uns zu Gast war. Heimatkunde des Wiggertals, Heft 38.
- BOESCH-INEICHEN, G. (1955): Die Königsfreien von Emmen/Luzern. zur Lotharurkunde vom 25. Juli 840. Sonderschrift aus Verfassungs- und Landesgeschichte, Festschrift für Theodor Mayer, Bd. 2.
- BOEGLI, A. (1951): Die Entstehung des Baldeggersees. Heimatkunde aus dem Seetal, 25.Jg.
- BUECHI, U.P., WIENER, G. und HOFMANN, F. (1965): Neue Erkenntnisse im Molassebecken auf Grund von Erdöltiefbohrungen in der Zentral- und Ostschweiz. Ecl. geol. Helv., Vol. 58/1.
- BUETLER, M. (1942): Ueber Strandlinienverschiebungen des Zugersees. Jahrbuch Schweiz. Ges. für Ur- und Frühgeschichte, Bd. 32.
- BUXTORF, A. (1916): Geologische Vierwaldstätterseekarte 1 : 50.000. Schweiz. Geol. Kommission.
- BUXTORF, A. und KOPP, J. (1943): Ueber das Unterstampian der Rigi und über Querbrüche in der Molasse zwischen Vierwaldstättersee und Zugersee. Ecl. geol. Helf., Vol. 36/2.
- DESCOEUDRES, J. (1960): Sondages et injections. Cours d'eau et énergie, 1960, 1-2, Zürich.
- FREI, R. (1912): Geologische Karte des Lorzetobel-Sihlsprunggebietes (Kt. Zug) 1 : 25.000. Schweiz. Geol. Kommission.
- (1912): Monographie des schweizerischen Deckenschotter. Beitr. zur Geol. Karte der Schweiz, neue Folge, Lieferung 37.
  - (1914): Geologische Untersuchungen zwischen Sempachersee und oberem Zürichsee. Beitr. zur Geol. Karte der Schweiz, neue Folge, Lieferung 45/1.
- FREY, O. (1907): Talbildung und glaziale Ablagerungen zwischen Emme und Reuss. Denkschrift, Schweiz. Naturforsch. Gesellschaft, Nr. 41.
- FROELICHER, H. (1933): Geologische Beschreibung der Gegend von Escholz matt im Entlebuch, Kt. Luzern. Beitr. zur Geol. Karte der Schweiz, neue Folge, Lieferung 67.
- GASSER, U. (1966): Sedimentologische Untersuchungen in der äusseren Zone der subalpinen Molasse des Entlebuches. Diss. Univ. Bern.

- GASSMANN, F. (1962): Schweremessungen in der Umgebung von Zürich. Beitr. zur Geologie der Schweiz, Geophysik, Nr. 3.
- GRETENER, P. (1954): Schweremessungen nordwestlich von Zürich und ihre geologische Interpretation. Diss. ETH Zürich.
- GYSEL, G. (1966): Ein neuentdeckter Reusserratiker. Mitt. der Aarg. Natf. Ges., Bd. 27.
- HABICHT, K. (1943): Zur Geologie der subalpinen Molasse zwischen Zugersee und Rheintal. Ecl. geol. Helv., Vol. 36/2.
- (1945): Neuere Beobachtungen in der subalpinen Molasse zwischen Zugersee und st. gallischem Rheintal. Ecl. geol. Helv., Vol. 36/1.
- HANTKE, R. (1958): Die Gletscherstände des Reuss- und Linthsystems zur ausgehenden Würmeiszeit. Ecl. geol. Helv., Vol. 51/1.
- (1959): Zur Altersfrage der Mittelterrassenschotter. Vierteljahresschrift der Natf. Ges. Zürich, Bd. 104.
  - (1961): Zur Quartärgeologie im Grenzbereich zwischen Muota/Reuss- und Linth/Rheinsystem. Geogr. Helv. XVI/4.
  - (1967): Geologische Karte des Kantons Zürich und seiner Nachbargebiete. Vierteljahresschrift der Natf. Ges. Zürich, Bd. 112/2.
  - (1968): Erdgeschichtliche Gliederung des mittleren und jüngeren Eiszeitalters im zentralen Mittelland. Archäologie der Schweiz, Band 1, Schweiz. Ges. für Ur- und Frühgeschichte, Basel.
  - (1978): Eiszeitalter Bd. 1. Ott Verlag, Thun.
  - (1980): Eiszeitalter Bd. 2. Ott Verlag, Thun.
- HEIM, A. (1882): Ueber Bergstürze. Neujaahrsblatt der Natf. Ges. Zürich, Bd. 84.
- (1887): Das Unglück in Zug vom 5. Juli 1887. Ausführlicher Bericht vom Spezialberichterstatte der NZZ, Zürich.
- HUG, J. (1919): Der Bergsturz vom Türlensee. Vierteljahresschrift der Natf. Ges. Zürich, Bd. 64/2.
- JAECKLI, H. (1956): Talgeschichtliche Probleme im aargauischen Reusstal. Geogr. Helv. 11/1.
- (1959): Wurde das Schlierenstadium überfahren? Geogr. Helv. 14/2.
  - (1966): Geologische Karte Bl. 1090 Wohlen 1 : 25.000, mit Erläuterungen. Geol. Atlas der Schweiz, Schweiz. Geol. Kommission.
- JAECKLI, H. und KEMPF, Th. (1972): Erläuterungen zur hydrogeologischen Karte der Schweiz 1 : 100.000, Blatt Bözberg - Beromünster. Schweiz. Geol. Kommission.
- JAECKLI, H. und RYF, W. (1978): Die Grundwasserverhältnisse im unteren aargauischen Aareta. Wasser, Energie, Luft 1978/3/4.
- KAUFMANN, F. J. (1872): Rigi und Molassegebiet der Mittelschweiz. Beitr. zur Geol. Karte Schweiz, 11.
- (1887): Geologische Skizze von Luzern und Umgebung. Beil. Jahresbericht Kantonsschule Luzern (1886/87).
- KELTS, K. (1978): Geological and sedimentary evolution of Lakes Zurich and Zug, Switzerland. Diss ETHZ.

- KLINGELE, E. und OLIVIER, R. (1979): Schwere-Karte der Schweiz, Bouguer-Anomalien 1 : 500.000. Bundesamt für Landestopographie, Wabern.
- (1980): Die neue Schwere-Karte der Schweiz (Bouguer-Anomalien). Kümmerly & Frey, Bern.
- KNAUER, J. (1954): Ueber die zeitliche Einordnung der Moränen der "Zürich-Phase" im Reussgletschergebiet. Geogr. Helv. 9/2.
- KOPP, J. (1937): Die Bergstürze des Rossberges. Ecl. geol. Helv., Vol. 29/2 (1936).
- (1938): Der Einfluss des Krienbaches auf die Gestaltung des Luzernersees und die Hebung des Seespiegels des Vierwaldstättersees. Ecl. geol. Helv., Vol. 31/2.
- (1945): Aus der geologischen Geschichte von Malters und Umgebung, Vortrag gehalten an Jahresversammlung der Natf. Ges. von Luzern.
- (1945): Geologische Karte Blatt 186-189 Beromünster-Eschenbach 1 : 25.000, mit Erläuterungen, Geol. Atlas der Schweiz, Schweiz. Geol. Kommission.
- (1949): Die urzeitlichen Schwankungen des Zugersees im Lichte seiner Strandlinien. Zuger Neujahrsblatt (1949).
- (1950): Seespiegelschwankungen des Zugersees. Mitt. Natf. Ges. Luzern, Nr. 16.
- (1951): Die Gletscherstausee-Ablagerungen von Kriens und Littau. Ecl. geol. Helv., Vol. 44/2.
- (1954): Die Lokalvergletscherung der Rigi. Ecl. geol. Helv., Vol. 46/2 (1953).
- (1961): Zur Diluvialgeologie des Gebietes zwischen Zugersee und Knonauer Amt. Ecl. geol. Helv., Vol 53/2 (1960).
- (1962): Erläuterungen zur Geol. Karte Blatt Luzern. Geol. Atlas der Schweiz, Schweiz. Geol. Kommission.
- (1974): Seespiegelstände des Aegerisees. Zuger Neujahrsblatt (1975).
- KOPP, J., BENDEL, L. und BUXTORF, A. (1955): Geologische Karte Blatt 1150 Luzern 1: 25.000, mit Erläuterungen, Geol. Atlas Schweiz, Schweiz. Geol. Kommission.
- KUETTEL, M. (1982): Veränderungen in der spätglazialen Umwelt von Luzern. Physische Geographie 1.
- (1983): Züge der jungpleistozänen Vegetations- und Landschaftsgeschichte der Zentralschweiz. Habil.-Schrift, Univ. Hohenheim.
- LABHARD, P. (1975): Birmensdorf, die Geschichte eines Talkessels. Eine geologisch-morphologische Studie. Heimatkdl. Verein Birmensdorf.
- LEMCKE, K., BUECHI, U.P. und WIENER, G. (1968): Einige Ergebnisse der Erdölexploration auf der mittelländischen Molasse in der Zentralschweiz. Bulletin Verein Schweiz. Petroleum Geologen, Nr. 35/87.
- LUEDI, W. (1938): Beitrag zur Bildungsgeschichte der Luzerner Allmend. Vierteljahresschrift der Natf. Ges. Zürich, Bd. 83/1-2.
- MOLLET, M. (1921): Geologie der Schafmatt-Schimberg-Kette und ihrer Umgebung (kt. Luzern). Beitr. zur Geol. Karte der Schweiz, neue Folge, Lieferung 47.
- MOSER, S. (1958): Studien zur Geomorphologie des zentralen Aargaus. Geogr.-Ethnolog. Ges. Basel, Bd. X.

- MUEHLBERG, F. (1904): Geologische Karte 1 : 25.000 des unteren Aare-, Reuss- und Limmat-Tales, mit Erläuterungen. Geol. Spezialkarte, 31, Schweiz. Geol. Kommission.
- (1907): Geologische Karte 1 : 25.000 der Umgebung von Aarau. Geol. Spezialkarte.
  - (1910): Geologische Karte 1 : 25.000 der Umgebung des Hallwilersees und des oberen Sur- und Winentales, mit Erläuterungen. Geol. Spezialkarte, 54, Schweiz. Geol. Kommission.
- MUELLER, E.R. (1978): Aufbau und Zerfall des würmeiszeitlichen Linth- und Reussgletschers im Raume zwischen Zürich- und Zugersee. Ecl. geol. Helv., Vol. 71/1.
- MUELLER, P. (1949): Die Geschichte der Moore und Wälder am Pilatus. Ber. Rübel, Nr. 24.
- (1950): Pollenanalytische Untersuchungen in eiszeitlichen Ablagerungen bei Weiherbach (Kt. Luzern). Ber. Rübel (1949).
  - (1961): Die letzte Eiszeit im Suhrental - eine pollenanalytische Studie. Mitt. der Aarg. Natf. Ges., Bd. 26.
- MUELLER, S. (1981): Geomorphologie des Raumes Hochdorf-Ballwil-Eschenbach unter besonderer Berücksichtigung der Eschenbacher Schotter. Diplomarbeit Univ. Zürich.
- NETTLETON, L. (1939): Determination of density for reduction of gravimeter observations, Geophysics, Vol. 4, No. 3.
- NIGGLI, P. (1911): Geologische Karte von Zofingen 1 : 25.000. Geol. Spezialkarte, Schweiz. Geol. Kommission.
- NUSSBAUM, F. (1909): Neu aufgefundene erratische Blöcke im Napfgebiet. Mitt. der Natf. Ges. Bern (1908).
- PAVONI, N. (1957): Geologie der Zürcher Molasse zwischen Albiskamm und Pfannenstiel. Vierteljahresschrift der Natf. Ges. Zürich, Bd 102/5.
- (1962): Geologische Interpretation der lokalen Bouguerschen Schwereanomalien, aus Schweremessungen in der Umgebung von Zürich. in GASSMANN, F.
  - (1975): Recent Crustal Movements, in Niggli E. ed: Internat. Geodyn. Proj., First Rep. Switzerland, July 1975. Schweiz. Natf. Ges.
- PENCK, A., BRUECKNER, E. (1901 - 1909): Die Alpen im Eiszeitalter, 1-3. Leipzig.
- ROCHOW, M. v. (1957): Altersbestimmung eines Torfes aus dem Untergrund des Löwenplatzes in Luzern. Ber. Rübel (1956).
- ROESLI, F. (1965): Das Renggloch als geologisches Phänomen und als Beispiel einer frühen Wildbach-Korrektion. Ecl. geol. Helv., Vol. 58/1.
- SCHWEIZERISCHE Gesellschaft für Bodenmechanik und Fundamentechnik (1968): Richtlinien für die Ausschreibung, Durchführung und Auswertung von Bodensondierungen und Feldversuchen in Lockergestein und Fels.
- SIDLER, W. (1902): Die Quellen des Sihl- und Lorzegebietes im Kanton Zug. Zuger Neujahrsblatt.

- SPECK, J. (1953): Geröllstudien in der subalpinen Molasse am Zugersee, Diss. Univ. Zürich.
- (1953): Die spätbronzezeitliche Siedlung Zug "Sumpf". Ein Beitrag zur Frage der Pfahlbauten. Monogr. Ur- und Frühgeschichte der Schweiz, Nr. 11
- STEINER, J. (1926): Morphologische Untersuchungen im Entlebuch, Diss. Univ. Bern.
- SUTER, H. (1960): Beitrag zur Diluvialgeologie des Knonauer Amtes, Kt. Zürich. Ecl. geol. Helv., Vol. 52/2.
- VEREINIGUNG Schweizerischer Bohrfirmen (1968): Bohrmeisterfibei.
- VON MOOS, A. (1946): Exkursion Nr. 7: Thalwil-Albispas-Affoltern a.A.-Jonen-Bonstetten. Geol. Exkursion Umgebung Zürich. Geol. Gesellschaft Zürich.
- WELTEN, M. (1972): Das Spätglazial im nördlichen Voralpengebiet der Schweiz. Bericht der deutschen Bot. Ges., Bd. 85.
- (1978): Gletscher und Vegetation im Lauf der letzten Hunderttausend Jahre. Schweiz. Natf. Ges., 5-18, 1981.
  - (1982): Pollenanalytische Untersuchungen im Jüngeren Quartär des nördlichen Alpenvorlandes der Schweiz. Beitr. zur Geol. Karte der Schweiz, neue Folge, Lieferung 156.
- ZIMMERMANN, H.W. (1963): Die Eiszeit im westlichen zentralen Mittelland. Mitt. der Natf. Ges. Solothurn, Bd. 21.

## Lebenslauf

Ulrich Felix Läubli, von Gränichen (Kt. Aargau)

Am 30. Juni 1939 wurde ich in Baden, Kt. Aargau, geboren. Nach Besuch der Primarschulen in Luzern absolvierte ich von 1951-1958 die Kantonsschule Luzern, die ich mit der Matura Typus C abschloss.

1958-1962 studierte ich an der ETHZ (Abteilung X) Naturwissenschaften und diplomierte als Ingenieurgeologe, mit einer Diplomarbeit in Geophysik.

Vom Herbst 1962 bis Frühjahr 1964 war ich Praktikant beim Kant. Tiefbauamt Luzern, Abt. Strassenbau und erhielt gleichzeitig einen Lehrauftrag für Geographie an der Kantonsschule Luzern.

Im Frühling 1964 immatrikulierte ich mich an der ETHZ (Abteilung II), und schloss im Sommer 1966 das Studium Bauingenieurwesen nach Normalstudienplan ab.

Im Frühling 1965 verheiratete ich mich mit Barbara Baeriswyl. Unsere Söhne heissen Stephan (1971), Daniel (1974) und Ivo (1976).

Vom Herbst 1966 bis zum Sommer 1968 arbeitete ich als Tiefbauingenieur im Ing. Büro H.B. Fehlmann in Zürich. Anschliessend wechselte ich zu einer Tiefbauunternehmung, der Firma Swissboring AG, Zürich und Volketswil. Ich wurde Leiter der Abteilungen Sondierungen, Filterbrunnen und Verankerungen. Ab Januar 1972 bis August 1975 war ich für Swissboring AG und Holding Rodio AG, Zürich hauptsächlich im Ausland als Berater und Baustelleningenieur eingesetzt. (15 Monate Brasilien, 5 Monate Portugal, 3 Monate Spanien, 5 Monate Oesterreich, etc.).

Im Sommer 1975 wechselte ich meinen Beruf und wurde Mittelschullehrer an der Kantonsschule Luzern. Seit 1976 bin ich fest gewählt und unterrichte Mathematik und Geographie an den Abteilungen Untergymnasium und Realgymnasium.

Im Herbst 1975 immatrikulierte ich mich an der Universität Zürich mit Studienrichtung Geographie. Die Prüfungen im Hauptfach Geographie legte ich im Frühjahr 1983 ab. Die vorliegende Dissertation entstand in den Jahren 1976 - 1983 unter der Leitung von Herrn Prof. Dr. A. Bögli.

Vorlesungen und Praktikas besuchte ich bei folgenden Dozenten:

An der ETHZ, Abt. X:

E. Specker (Mathematik), H. Ulrich (Zoologie), V. Prelog, G. Schwarzenbach (Chemie), F. Laves (Mineralogie), F. Kobold (Vermessungskunde), J.P. Blaser, P. Scherrer (Physik), H. Gutersohn (Geographie), E. Kuhn-Schnyder, H. Rieber (Paläontologie), C. Burri, F. de Quervain, M. Grünenfelder (Petrographie), F. Gassmann, N. Pavoni, L. Rybach, M. Weber (Geophysik), E. Dal Vesco, A. Gansser, R. Hantke, H. Jäckli, W. Leupold, R. Trümpy (Geologie).

An der ETHZ, Abt. II:

P. Läuchli (Angewandte Mathematik), Ch. Wehrli (Mechanik), E. Imhof (Planzeichnen), B. Thürlimann (Baustatik, Massivbau), G. Dubas, F. Stüssi (Stahlbau, Brückenbau), H. Grob (Felsbau, Tunnelbau), M. Rotach (Strassenbau, Verkehrswesen), G. Schnitter (Grundbau), T. Dracos (Hydraulik), F. Balduzzi (Bodenmechanik).

An der Universität Zürich:

F. Bachmann, A. Bögli, H. Boesch, G. Dorigo, A. Dürst, E. Flütsch, G. Furrer, K.J. Graf, Th. Gutermann, H. Inhelder, H. Kishimoto, A. Leemann (Geographie).







